



La fiche de vulgarisation à l'usage des producteurs

LA CULTURE DU SOJA

COMMENT FERTILISER

COMBIEN ?

QUAND ?

COMMENT ?

**Le chaulage
en cas du sol acide**



Utilisez 30 kg de chaux fine et sèche par are tous les deux ans.

Au moins 4 semaines avant le semis.

Epandage homogène à la volée et enfouissement direct

La fumure organique



Laissez les débris végétaux dans le champ.

A la récolte

Compostage ou Enfouissement lors du prochain labour.

Utilisez 100 kg/are = 4 paniers remplis de fumier ou compost.

Avant l'égalisage

Epandage et enfouissement direct.

**L'enrobage avec
du rhizobium**



Utilisez 40 gr de Rhizobium + 3 kg de semences.

Avant le semis

Mélanger le Rhizobium avec des graines de soja légèrement mouillées, sous l'ombre, dans un récipient propre.

Engrais minéraux



1 kg de DAP/are ou de 800g/are de TSP/are.

Au semis

Epandage et enfouissement direct avant le semis.

1 are = 10 m x 10 m

La fiche de vulgarisation à l'usage des producteurs

LES PRINCIPALES MALADIES ET RAVAGEURS DE SOJA

MALADIES	SYMPTOMES	PREVENTION	TRAITEMENT /PRODUITS	DOSES RECOMMANDEES
Bactériose du soja		<ul style="list-style-type: none"> - Utilisez les semences de qualité; - Arracher et jeter les plants atteints dans une fosse; - Faites une bonne rotation : le soja ne doit pas succéder au haricot, au petit pois, au pois cajan, à l'arachide, au niébé ou au soja. 	Pas de traitement	Pas de traitement
La Mosaïque du soja		<ul style="list-style-type: none"> - Faites une bonne rotation : le soja ne doit pas succéder au haricot, au petit pois, au pois cajan, à l'arachide, au niébé ou au soja ; - Faites le binage dès que le soja vient de germer; - Arrachez les plants atteints. 	Pas de traitement	Pas de traitement
Les macules foliaires		<ul style="list-style-type: none"> - Semez le soja dans un endroit pas trop ombragé ; - Respectez la densité de semis; - Faites une bonne rotation : le soja ne doit pas succéder au haricot, au petit pois, au pois cajan, à l'arachide, au niébé ou au soja. 	Fongicide : Dithane M45	20 gr/ 15 litres d'eau par are
La chenille défoliante		<ul style="list-style-type: none"> - Evitez les mauvaises herbes au voisinage du champ; - Respectez les dates de semis. 	Insecticide : Diméthoate	10 ml (2 bouchons de Fanta) dans 10 litres d'eau par are.

1 are = 10 m x 10 m