


[Home](#)

***Entada africana* Guill. & Perrott.**

Leguminosae

Auteur: Le Houérou

Noms communs

Ndende, twatsa

Synonymes

- *Entada sudanica* Schweinf.
- *Entada ubangiensis* De Wild.
- *Entadopsis sudanica* (Schweinf.) Gilbert & Boutique

La description

Petit arbre à faible branche, jusqu'à 7-12 m, avec une couronne ouverte étroite. Écorce fibreuse et crevette gris-marron, rayé transversalement, rouge oblique avec des rayures blanches, brindilles gris-marron, pubescent. Laisse un gros bipinnate de 15 à 45 cm de long, avec 2-9 paires d'épingles avec 8-24 paires de tracts linéaires oblongs 0,9-4,5 x 0,3-1,5 cm. Feuilles glabres. Crème de fleurs, en racèmes de 5 à 10 cm de long. Pods, avec une marge ondulée, 10-30 x 2-5 cm, sombre +/- pubescent, 12-15 graines par gousse, graines à deux ailes, environ 4 000 par kg.

Distribution

Le Sahel du Sud et les savanes soudanaises de l'écozone dans les endroits perturbés, assez communs et grégaires. Tout au long du Sahel en Afrique de l'Est et du Sud.

Gestion des cultures

Sensible aux feux de brousse.

Produits et utilisations

Les feuilles sont de bons fourrages, du bois doux et faciles à utiliser, des fibres Bast utilisées pour les bandes, les cordes, les poubelles. Beaucoup d'utilisations médicinales et fétiches: feuilles; le thé tonique, la cicatrisation des plaies, contient de la rotenone et des tanins, des écorces aborigènes, les racines ont des effets antidote contre divers agents toxiques et des poissons toxiques (ichtyotoxiques).

Les références

Aubréville 1950 ; Berhaut 1975 ; Hutchinson & al. 1958 ; Dalziel 1955 ; Giffard 1974a ; Kerharao & Adam 1974 ; Baumer 1975 ; Weber et al. 1977 ; Geerling 1982/88 ; Von Maydell 1983/86 ; Burkill 1995 .