



学名、异名、中文名、拼音等 检索

主页 卷册索引 学名索引 中文索引 分省名录 经济用途 高级检索 总论 关于本志

eFlora | FOC | FLPH | DCP | iPlant | admin 响应时间: 0.30秒

使君子 Quisqualis indica L.

中国植物志 >> 第53(1)卷 >> 使君子科 Combretaceae >> 使君子属 Quisqualis

1. 使君子 (嘉祐本草)

Quisqualis indica Linn. Sp. Pl. ed. 2, 1: 556. 1762; DC. Prodr. 3: 23. 1828; Forbes et Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. 23: 294. 1887; Exell in Sunyatsenia 1: 89. 1935; 赵爱真, 植物分类学报7: 238. 1958; O. Lecompte in Aubrev. Fl. Camb. Laos Vietn. 10: 26. 1969; 云南植物志1: 85. 1977——Q. sinensis Lindl. in dot. Reg. t. 15. 1844 ——Q. grandiflora Miq. in Journ. Bot. Neerl. 1: 119. 1861.

1a. 使君子 (原变种) 豕求子 (南方草木状), 史君子, 四君子 (新本草纲目) 图版3: 8-9

var. indica

攀援状灌木, 高2-8米; 小枝被棕黄色短柔毛。叶对生或近对生, 叶片膜质, 卵形或椭圆形, 长5-11厘米, 宽2.5-5.5厘米, 先端短渐尖, 基部钝圆, 表面无毛, 背面有时疏被棕色柔毛, 侧脉7或8对; 叶柄长5-8毫米, 无关节, 幼时密生锈色柔毛。顶生穗状花序, 组成伞房花序式; 苞片卵形至线状披针形, 被毛; 萼管长5-9厘米, 被黄色柔毛, 先端具广展、外弯、小形的萼齿5枚; 花瓣5, 长1.8-2.4厘米, 宽4-10毫米, 先端钝圆, 初为白色, 后转淡红色; 雄蕊10, 不突出冠外, 外轮着生于花冠基部, 内轮着生于萼管中部, 花药长约1.5毫米; 子房下位, 胚珠3颗。果卵形, 短尖, 长2.7-4厘米, 径1.2-2.3厘米, 无毛, 具明显的锐棱角5条, 成熟时外果皮脆薄, 呈青黑色或栗色; 种子1颗, 白色, 长2.5厘米, 径约1厘米, 圆柱状纺锤形。花期初夏, 果期秋末。

产四川、贵州至南岭以南各处, 长江中下游以北无野生记录。主产福建、台湾(栽培)、江西南部、湖南、广东、广西、四川、云南、贵州。分布于印度、缅甸至菲律宾。

种子为中药中最有效的驱蛔药之一, 对小儿寄生蛔虫症疗效尤著。

1b. 毛使君子 (变种) 西蜀使君子

var. villosa C. B. Clarke in Hook. f. Fl. Brit. Ind. 2: 459. 1878; 赵爱真, 植物分类学报7: 240. 1958 —— Ouropari? enermis Yamamoto in Trans. Nat. Hist. Soc. Formos. 28: 332. 1938.

与原变种不同处为叶片卵形、两面被绒毛。

产福建、台湾、四川。亚洲热带也有分布。

中国植物志系统位置

被子植物门 Angiospermae
双子叶植物纲 Dicotyledoneae
原始花被亚纲 Archichlamydeae
桃金娘目 Myrtiliflorae
使君子科 Combretaceae
使君子属 Quisqualis



相关类群

小花使君子 Q. caudata

1984 《中国植物志》第53(1)卷 016页 PDF

种列表

使君子 (原变种) Q. indica var. indica
indica
毛使君子 Q. indica var. villosa villosa



扫一扫, 在手机上继续查看



PPBC:27815 张润堂 拍摄于: 安徽省阜阳市阜阳师范学院学院家属院



上一页 1 2 3 4 下一页



版权所有 © 1959-2004 中国科学院《中国植物志》编委会 科学出版社
中国科学院植物研究所（系统与进化植物学国家重点实验室）数字植物项目组
京ICP备13006946号-2 网站统计 我有话要说

中国在线植物志
eflora.cn
http://www.eflora.cn