

# Tabebuia rosea

*Tabebuia rosea* est un arbre de la famille des Bignoniacées.

C'est l'arbre national du Salvador, où il est appelé "Maquilshuat".

Synonymes : Tête Comore, Calice du pape, Lapacho, Pau d'Arco. Le nom espagnol "*Roble de Sabana*", qui signifie «chêne de savane», est largement utilisé au Costa Rica probablement parce qu'il reste souvent dans les zones fortement déboisées, où les gens apprécient ses périodes de floraison intense et à cause de la ressemblance de son bois à celui du chêne.

## Sommaire

### Description

### Répartition

### Utilisation

- ornementale
- médicinale

### Notes et références

### Liens externes

## Description

*Tabebuia rosea* est un arbre à croissance rapide qui pousse jusqu'à 30 m de haut et peut atteindre un diamètre de 1 m à hauteur de poitrine.

La couronne de l'arbre est large, avec une ramification irrégulière et seulement quelques branches épaisses. L'écorce peut être grise à brune et peut être fissurée verticalement.

Les feuilles sont composées et caduques. Chaque feuille a cinq folioles de taille variable, la centrale étant la plus grande.

La floraison survient principalement en janvier et en février et est généralement associée à des périodes sèches; Bien que la floraison a également été observée en août, septembre, avril et mai. Les fleurs sont grandes, de différentes teintes de rose à violet, et apparaissent alors que l'arbre n'a pas, ou très peu, de

## *Tabebuia rosea*



### Classification APG III (2009)

Règne	<i>Plantae</i>
Clade	Angiospermes
Clade	Dicotylédones vraies
Clade	Noyau des Dicotylédones vraies
Clade	Astéridées
Clade	Lamiidées
Ordre	<i>Lamiales</i>
Famille	<i>Bignoniaceae</i>
Genre	<i>Tabebuia</i>

#### Nom binominal

### *Tabebuia rosea*

(Bertol.) Bertero ex A.DC., 1845 <sup>1</sup>



Feuilles et fleurs



Inflorescence

feuilles.

La pollinisation se produit probablement par les insectes, bien que les fleurs soient visitées par beaucoup d'oiseaux tels que les colibris et les orioles.

Les fruits sont des gousses longues et minces et peuvent mesurer jusqu'à 35 cm. Ces gousses apparaissent de février à avril. Après le séchage des fruits déhiscent, les semences anémochoreuses, à membrane translucide ailée sont libérées. Il y a en moyenne 45 000 graines par kg avec jusqu'à 13% d'eau. La germination des graines est extrêmement facile et efficace, atteignant presque 100%.

## Répartition

Cette espèce est présente au sud du Mexique, au Venezuela et en Équateur de 0 à 1 200 m sous des températures allant de 20 ° C à 30 ° C en moyenne, avec des précipitations annuelles supérieures à 500 mm, et sur des sols à pH très variable.

## Utilisation

### ornementale

Cet arbre est souvent vu dans les villes tropicales, où il est souvent planté dans les parcs et les jardins. En saison des pluies, il offre une grande ombre et en saison sèche, des fleurs abondantes sont présentes sur les arbres défoliés.

### médicinale

Les préparations de l'écorce de l'arbre sont consommées pour éliminer les parasites intestinaux et le paludisme. Une décoction d'écorce pourrait soigner l'anémie et la constipation. Une décoction des fleurs, des feuilles et des racines pourrait réduire la fièvre et la douleur, la cause de la transpiration, traiter une inflammation des amygdales et de divers autres troubles<sup>2</sup>.

L'arbre contient du lapachol, un composé organique naturel isolé à partir de diverses autres espèces de *Tabebuia*. Chimiquement, il est un dérivé de la naphthoquinone, liée à la vitamine K. Le lapachol a des effets antipaludiques.

## Notes et références

1. The Plant List, consulté le 10 février 2016
2. Hernan Rodriguez Navas. 2007. La Utilidad de las Plantas Medicinales en Costa Rica. EUNA, Heredia, Costa Rica. 213pp.

## Liens externes

- **(en)** Référence JSTOR Plants (<http://plants.jstor.org>) : *Tabebuia rosea* (<http://plants.jstor.org/search?qttype=names&query=Tabebuia+rosea>) (consulté le 10 février 2016)

Sur les autres projets Wikimedia :

- **(fr)** Référence Catalogue of Life : *Tabebuia rosea* (Bertol.) DC. (<http://www.catalogueoflife.org/col/search/scientific/genus/Tabebuia/species/rosea/match/1>) (consulté le 10 février 2016)
- **(en)** Référence GRIN (<http://www.ars-grin.gov/>) : espèce *Tabebuia rosea* (Bertol.) DC. (<https://npgsw eb.ars-grin.gov/gringlobal/taxonomydetail.aspx?105257>) (consulté le 10 février 2016)
- **(fr+en)** Référence ITIS : *Tabebuia rosea* (Bertol.) DC. (<http://www.cbif.gc.ca/acp/fra/siti/regarder?tsn=182287>) (+ version anglaise ) (consulté le 10 février 2016)
- **(en)** Référence Kew Garden World Checklist (<http://wcsp.science.kew.org/home.do>) : *Tabebuia rosea* (Bertol.) Bertero ex A.DC. (1845) (<http://wcsp.science.kew.org/qsearch.do?page=quickSearch&plantName=Tabebuia+rosea>) (consulté le 10 février 2016)
- **(en)** Référence NCBI : *Tabebuia rosea* ([http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?lin=s&p=has\\_linkout&id=429709](http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?lin=s&p=has_linkout&id=429709)) (consulté le 10 février 2016)
- **(en)** Référence The Plant List : *Tabebuia rosea* (Bertol.) Bertero ex A.DC. (<http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-318853>) (Source: KewGarden WCSP (<http://wcsp.science.kew.org/qsearch.do?page=quickSearch&plantName=Tabebuia+rosea>)) (consulté le 10 février 2016)
- **(en)** Référence Tropicos : *Tabebuia rosea* (Bertol.) DC. (<http://www.tropicos.org/Name/3700648>) (+ liste sous-taxons (<http://www.tropicos.org/NameSubordinateTaxa.aspx?nameid=3700648>)) (consulté le 10 février 2016)
- **(en)** Référence uBio : *Tabebuia rosea* Bertol. (<http://www.ubio.org/browser/details.php?namebankID=4947505>) (consulté le 10 février 2016)

*Tabebuia rosea* ([https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Tabebuia\\_rosea?uselang=fr](https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Tabebuia_rosea?uselang=fr)), sur Wikimedia Commons

*Tabebuia rosea*, sur Wikispecies

---

Ce document provient de « [https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Tabebuia\\_rosea&oldid=159822838](https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Tabebuia_rosea&oldid=159822838) ».

**La dernière modification de cette page a été faite le 3 juin 2019 à 14:45.**

Droit d'auteur : les textes sont disponibles sous licence Creative Commons attribution, partage dans les mêmes conditions ; d'autres conditions peuvent s'appliquer. Voyez les conditions d'utilisation pour plus de détails, ainsi que les crédits graphiques. En cas de réutilisation des textes de cette page, voyez comment citer les auteurs et mentionner la licence.

Wikipedia® est une marque déposée de la Wikimedia Foundation, Inc., organisation de bienfaisance régie par le paragraphe 501(c)(3) du code fiscal des États-Unis.