

Cassia occidentalis Willd.

Syn.: Senna occidentalis (L.) Link

Fabaceae

Noms vernaculaires

Français: faux kinkéliba, casse puante

Botanique

Cet arbrisserau pouvant atteindre deux à trois mètres de haut a des feuilles pétiolées (5 ou 6 paires) pouvant atteindre dix centimètres à la base desquelles se trouve une petite glande. Ses fleurs jaunes donnent des gousses.

| Partie utilisée |
|---|
| Feuilles. |
| |
| Principaux constituants |
| Dérivés anthracéniques, flavonoïdes. |
| |
| Propriétés pharmacologiques |
| Laxatif, anti-inflammatoire, antibactérien et antifongique. |
| |
| Toxicologie |
| L'usage interne est à surveiller. Il ne faut pas utiliser la plante de façon prolongée. |
| |

La plante est abortive par voie interne. Son usage est à déconseiller aux femmes enceintes, aux jeunes enfants et aux personnes âgées.

La plante a une toxicité non négligeable. Elle ne doit pas être consommée par voie interne par les femmes enceintes.

Son usage externe ne pose aucun risque.

Usage thérapeutique, forme pharmaceutique et posologie

Constipation : adulte, décoction de 15 grammes de feuilles par litre d'eau à boire au coucher.

Affection de la peau et des muqueuses, nombreuses mycoses dont teignes et candidoses, allergies cutanées : utiliser une décoction concentrée en bain, en compresses ou en cataplasme de feuilles directement sur la peau