

# Les oiseaux de nos jardins.

**Description** : les oiseaux vus autour de la mangeoire dans un jardin français (Rhône Alpes)

**Notes** : la plupart des photos sont personnelles. Les liens renvoient vers les Wiki concernés.



*Photo personnelle – Mésange Charbonnière male tenant en son bec un fromage une graine de tournesol (ses favorites).*

*En bas à gauche : la mangeoire « ASTERIX », à un seul étage  
En bas à droite : la mangeoire « OBELIX », à deux étages*



## Sommaire

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Pinson des arbres .....       | 3  |
| Pinson du Nord .....          | 4  |
| Mésange Charbonnière .....    | 5  |
| Mésange bleue .....           | 6  |
| Mésange huppée .....          | 7  |
| Mésange à longue queue.....   | 8  |
| Chardonneret élégant.....     | 9  |
| Tarin des aulnes .....        | 10 |
| Verdier .....                 | 11 |
| Gros-bec casse-noyaux.....    | 13 |
| Geai des chênes.....          | 14 |
| Pie.....                      | 15 |
| Pic Epeiche .....             | 16 |
| Palombe (Pigeon Ramier) ..... | 17 |
| Corneille noire .....         | 18 |

## Pinson des arbres

Fringillidae - [http://fr.wikipedia.org/wiki/Pinson\\_des\\_arbres](http://fr.wikipedia.org/wiki/Pinson_des_arbres)

### Alimentation

Le pinson des arbres adulte est principalement granivore, après la saison des nids il forme des bandes avec d'autres granivores, qui s'installent dans les jardins et les parcs à proximité des mangeoires à graines. Mais il se nourrit aussi d'invertébrés tels que les araignées, les chenilles et les insectes, et de temps en temps de petits fruits.

### Comportement

Lorsqu'il se déplace à terre, il marche à pas courts mais rapides.

Le pinson des arbres préférant se nourrir sous les mangeoires que dedans, on le trouve souvent à sautiller sur le sol à récupérer les graines tombées.



### Chant

Le chant du pinson des arbres est une série brève, mais vigoureuse, de notes descendantes s'achevant sur une fioriture finale plus complexe.

### Longévité

Le Pinson des arbres peut vivre 5 ans, parfois jusqu'à 10 ans

*En haut le male, en bas la femelle (photos personnelles)*



## Pinson du Nord

Famille Fringillidae - [http://fr.wikipedia.org/wiki/Pinson\\_du\\_Nord](http://fr.wikipedia.org/wiki/Pinson_du_Nord)

### Description

En plumage internuptial, les plumes de la tête du mâle sont grises et noirâtres piquetées de brun roux. Celles du dos sont noirâtres nettement festonnées de brun roux également. La poitrine et les épaules sont roussâtre pâle. Le bec devient jaunâtre à pointe foncée.

La femelle ressemble au mâle en plumage internuptial mais présente des tons plus pâles et plus ternes.

### Reproduction

Le Pinson du Nord se reproduit en Eurasie septentrionale de la Norvège au détroit de Béring et à Sakhaline. Cette zone relativement étroite s'élargit dans sa partie orientale jusqu'au nord-ouest de la Mongolie.

Cet oiseau est sédentaire dans le sud de la Suède et l'extrême sud-est de la Norvège. Il hiberne en Europe occidentale, en Afrique du Nord-Ouest, au Proche et au Moyen-Orient, en Asie Mineure, dans le Caucase, le nord de l'Inde, l'Himalaya... Les pinsons du nord passent l'hiver plus au sud en Europe et migrent en mars vers le nord, en octobre vers le sud.

### Alimentation


Pendant l'été les insectes constituent leur ressource essentielle.

En automne et en hiver, ils sont surtout granivores. Leur nourriture préférentielle provient alors des faînes de hêtres, dont la teneur oléagineuse leur procure un apport calorique précieux pour la saison froide.

Les semences de conifères leur fournissent également une pitance d'appoint, de même que les baies de certains arbres (sorbiers et sureaux entre autres) et les graines d'un grand nombre de plantes qu'ils glanent principalement à terre. L'hiver venu, ils s'approchent des mangeoires pour profiter des graines de tournesols, ou cherchent leur nourriture dans les champs en friches, les abords des fermes et les jardins.



*Photo personnelle en haut seulement*



## Mésange Charbonnière

Famille Paridae - [http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9sange\\_charbonni%C3%A8re](http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9sange_charbonni%C3%A8re)

### Alimentation

La Mésange charbonnière se nourrit essentiellement d'insectes en été, de graines, de baies et de fruits le reste de l'année.

### Comportement

C'est un oiseau grégaire : en dehors de périodes de nidification, elle vit en groupe avec d'autres mésanges. C'est une visiteuse habituelle des mangeoires en hiver.

### Longévité

Une mésange charbonnière peut atteindre une quinzaine d'années mais l'espérance de vie en milieu naturel n'excède pas souvent quelques années (2 à 3 ans).

### Notes personnelles

*Sans aucun doute le plus agile des oiseaux de nos jardins, mais aussi la plus curieuse.*

*Va dans la mangeoire, dessus, dessous, fait des pirouettes, mange la tête en bas. Particulièrement habile et rapide. Elle choisit une graine puis va en général la déguster sur l'arbre le plus proche.*



*Photos personnelles : ci-dessous : en avant plan, une mésange Charbonnière.*

*(en arrière plan, une mésange bleue)*

## Mésange bleue

Famille Paridae - [http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9sange\\_bleue](http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9sange_bleue)

### Description

Plus petite que la Mésange charbonnière (11,5 cm pour un poids de 9 à 12 g), elle se caractérise par sa calotte, son dos, ses ailes et le dessus de sa queue bleus, ses joues et son front blancs, un bandeau noir sur les yeux, sa poitrine et son ventre jaunes, ce dernier étant parfois marqué d'une très fine ligne noire. Les sexes sont presque indiscernables dans la nature, la femelle étant seulement un peu plus terne que le mâle.

### Répartition géographique et habitat

Cette espèce est présente dans toute l'Europe à l'exception du nord de la Scandinavie. Elle est sédentaire ou migratrice et occupe presque tous les habitats : bois de feuillus, haies, parcs, jardins... Elle vit jusqu'à 1200 mètres en montagne.

### Comportement

Commune, toujours très active et familière, c'est une visiteuse habituelle des mangeoires en hiver. Cette mésange est très acrobate.

### Nidification

Elles entrelacent mousses et brindilles de leur logis avec de la lavande, de la menthe, des immortelles, et d'une demi-douzaine d'autres herbes odorantes, plantes connues pour contenir des composés phénoliques tels le camphre ou l'eucalyptol, et qui possèdent des qualités antiseptiques, insecticides ou fongicides. Pour repérer ces herbes très spéciales, les mésanges sont donc capables de se servir de leur odorat, ce dont on doutait pour de si petits oiseaux.

Les œufs sont couvés par la femelle de 12 à 14 jours. Les oisillons séjournent 18 jours au nid et s'émancipent environ 4 semaines après.

### Protection

La mésange bleue bénéficie d'une protection totale sur le territoire français depuis l'arrêté ministériel du 17 avril 1981 relatif aux oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire. Il est donc interdit de la détruire, la mutiler, la capturer ou l'enlever, de la perturber intentionnellement ou de la naturaliser.

Notes personnelles : c'est aussi une habituée des mangeoires. Très agile, tout comme sa cousine la mésange Charbonnière.



Photo personnelle :

## Mésange huppée

Famille Paridae - [http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9sange\\_hupp%C3%A9e](http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9sange_hupp%C3%A9e)


### Comportement

Comme toutes les vraies mésanges, la Mésange huppée est cavernicole (c'est-à-dire qu'elle construit son nid dans une cavité). Cet oiseau est sédentaire.

Il rejoint parfois d'autres petits groupes de mésanges en automne. Cet oiseau consomme des insectes et des larves. Il se nourrit également de graines de conifères, de hêtre et baies de genévrier en hiver.

### Reproduction

Durant la période des amours au printemps, le mâle redresse sa huppe et chante en inclinant sa tête. Une première couvée en avril puis une deuxième en juin. Nid dans un arbre malade ou mort, ou un ancien gîte d'écureuil. 7 à 10 œufs de 16 mm, couvés de 13 à 15 jours. Les oisillons quittent le nid après 16 à 22 jours.



*Photo personnelle en haut*



## Mésange à longue queue

Famille Aegithalidae - [http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9sange\\_%C3%A0\\_longue\\_queue](http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9sange_%C3%A0_longue_queue)

### Description

C'est un minuscule oiseau avec une très longue queue et des petites ailes rondes, au ventre blanc légèrement rosé, à la tête blanche et grise avec, chez la grande majorité des individus vivant au Benelux, en France et en Suisse, une bande noire du front à la nuque passant au-dessus de l'œil. Comportement

En dehors de la période de nidification, la Mésange à longue queue vit en bandes familiales ou petits groupes d'une dizaine à une trentaine d'oiseaux, volant d'un arbre à l'autre.



### Régime alimentaire

Elle se nourrit essentiellement d'insectes, de quelques graines et de bourgeons à la mauvaise saison. Elle ne dédaigne pas les mangeoires en hiver.

### Reproduction

Huit jeunes à l'envol et deux parents de sous-espèce des Îles Britanniques, *Aegithalos caudatus rosaceus*. Une à deux couvées par an de 6 à 12 œufs blancs, la première entre mi-avril et mi-mai, la seconde en juin. Contrairement aux paridés (les autres mésanges), elle ne construit pas son nid dans des cavités mais dans un endroit dégagé. Il est de forme ovoïde, d'une hauteur de 20 cm, et est complètement fermé avec un petit orifice latéral dans la partie supérieure. Il est composé à l'extérieur de mousse, de fibres végétales et de morceaux d'écorce ; l'intérieur est garni de plumes et de poils. Sa construction dure entre 15 et 20 jours. Les œufs sont couvés par la femelle 13 ou 14 jours. Les petits restent au nid entre 15 et 20 jours après l'éclosion.



Photos personnelles : 2x, en bas, sur la mangeoire

## Chardonneret élégant

Famille *Fringillidae* - [http://fr.wikipedia.org/wiki/Chardonneret\\_%C3%A9l%C3%A9gant](http://fr.wikipedia.org/wiki/Chardonneret_%C3%A9l%C3%A9gant)

### Description

L'adulte a la face rouge écarlate, entouré de blanc et de noir (ou de gris chez trois sous-espèces), le dos et les flancs bruns, la queue noire avec des taches blanches et le croupion blanc. Le plumage de ses ailes est noir rayé d'une large bande d'un jaune vif.

Il est assez gracieux, très sociable et son vol est onduleux et dansant, mais très erratique.

Assez farouche surtout à la saison de la nidification, il se perche principalement à la cime des arbres

### Alimentation

Le chardonneret est exclusivement granivore. Il recherche avant tout les graines de chardons (ce qui lui vaut son nom) et de bardanes car grâce à son bec effilé, il peut très bien les enlever sans se piquer et parvient à les décortiquer très habilement. Il se nourrit aussi de graines de bouleaux et d'aulnes. Note personnelle : mange en général dans la mangeoire (sur place).

### Longévité

Il vit une douzaine d'années, au maximum 14 ans.



Les populations de chardonnerets élégants sont classées en danger. Leur nombre a fortement baissé durant le siècle dernier : avec l'usage excessif des pesticides pour les mauvaises herbes, le chardonneret trouve de moins en moins facilement sa nourriture, composée quasi-exclusivement de graines ; durant le XXe siècle le chardonneret a été beaucoup capturé pour devenir oiseau d'ornement.



*Photos personnelles*

## Tarin des aulnes

Famille *Fringillidae* - [http://fr.wikipedia.org/wiki/Tarin\\_des\\_aulnes](http://fr.wikipedia.org/wiki/Tarin_des_aulnes)

Le tarin qui est l'un des plus petits fringillidés mesure environ 12 cm. Le mâle à la calotte et le menton noirs, l'arrière-sourcil jaune et les joues verdâtres. La femelle ne possède pas la calotte noire et est moins bariolée, tirant plus vers le brun-gris surtout sur le dos, mais est plus blanche sur le ventre. Elle est beaucoup plus rayée à la poitrine et aux flancs que le mâle.

### Chant et cri

Son chant, assez aigu et perçant, est un gazouillis musical incessant,

### Comportement

Il est très actif et assez erratique, mais est très sociable envers les autres espèces de passereaux. Le tarin se déplace principalement en groupe dont la composition varie de quelques individus à plusieurs dizaines de couples.

Lorsqu'il se nourrit son comportement se rapproche de celui des mésanges, car il se perche facilement la tête en bas pour atteindre sa nourriture.

Le vol du tarin est onduleux et dansant surtout lorsqu'il se déplace en groupes.

Pendant la parade nuptiale le mâle poursuit la femelle, puis se dresse devant elle les plumes hérissées et les ailes légèrement entrouvertes. Le vol nuptial du mâle continue à tourner en papillonnant autour de la femelle.

### Longévité

Il vit en moyenne une dizaine d'années.

### Habitat

Le tarin habite dans les zones assez boisées tels les bois les forêts ou les terrains vagues, et a une préférence pour les conifères. Durant la période hivernale il n'hésite pas à venir habiter près des habitations, où il fréquente volontiers les mangeoires.



Photos personnelles : à droite et en haut, en compagnie de Chardonnerets élégants

## Verdier

Famille *Fringillidae* - [http://fr.wikipedia.org/wiki/Verdier\\_d%27Europe](http://fr.wikipedia.org/wiki/Verdier_d%27Europe)

### Morphologie

L'adulte mesure entre 14 et 15 cm de longueur et pèse entre 25 et 35 g. Il est trapu avec une grosse tête et un bec un peu épais de couleur corne. Les yeux sont marron foncé et les pattes brun gris clair.

### Aspect du mâle

Le mâle est vert jaune olivâtre avec des taches jaunes vives sur les ailes et sur sa queue fourchue au niveau des rectrices externes. Il a aussi des taches jaunes moins vives sur la tête, le ventre et les flancs.

La femelle est plus sombre et moins verte que le mâle, un peu plus grise et ses taches jaunes sont moins nettes que celles du mâle.

Le verdier qui est assez erratique forme souvent de petites bandes avec ses congénères. Il est typique à cause de son vol assez onduleux.

Il ne craint pas la présence de l'homme. Il peut vivre jusqu'à treize ans.



### Mœurs

Relativement grégaire et anthropophile, il peut constituer des bandes hivernales où il s'associe parfois au pinson du nord.

### Alimentation

Les graines de mercuriale et d'orme ont sa préférence en été, celles de l'if, du charme et de l'aune en automne et celles du rosier et du framboisier en hiver. Les verdiers adorent les graines de tournesol.

### Protection

Le Verdier d'Europe bénéficie d'une protection totale sur le territoire français.

## Rouge Gorge

Famille Muscicapidae - [http://fr.wikipedia.org/wiki/Rouge-gorge\\_familier](http://fr.wikipedia.org/wiki/Rouge-gorge_familier)

### Alimentation

Se nourrit dans les campagnes ouvertes et dans les sous-bois. Son régime alimentaire est composé surtout des invertébrés vivant par terre (insectes, notamment des coléoptères, escargots, vers, araignées).

De l'automne au début du printemps, il consomme aussi beaucoup de baies et autres petits fruits. Sa technique de chasse est bien adaptée au mélange de végétation épaisse et d'espaces libres que l'on trouve dans les jardins et les sous-bois. Perché à faible hauteur, l'oiseau observe les environs, descend, saisit sa proie et se perche à nouveau.

### Comportement

*(Note personnelle) Supporte les autres espèces mais pas ses congénères. Il est assez territorial !*



*Photo personnelle ci-dessus*

## Gros-bec casse-noyaux

Famille *Fringillidae* - [http://fr.wikipedia.org/wiki/Gros-bec\\_casse-noyaux](http://fr.wikipedia.org/wiki/Gros-bec_casse-noyaux)

### Comportement

Le gros-bec est très farouche, méfiant et assez erratique, il ne se laisse pas approcher facilement, et il s'enfuit pour se percher en haut des arbres et ne redescend que très craintivement de branche en branche.

Son vol est puissant et onduleux, et sa démarche sautillante est tanguée. Il peut vivre environ 10 ans. Il est arboricole et préfère les charmes, les hêtres et les érables pour établir son nid. Les gros-becs se regroupent souvent en colonies pour nicher, et chaque couple défend un petit morceau de territoire.

### Alimentation

Le gros-bec se nourrit principalement de noyaux et de graines qu'il décortique avec son bec très puissant grâce à la musculature impressionnante de ses mâchoires, car il faut une pression énorme pour casser un noyau. Mais au printemps lorsque les graines viennent à manquer, il change de régime alimentaire, devenant insectivore et se nourrit volontiers de chenilles.



*Potos personnelles– Gros-bec sous la neige, et en compagnie d'un couple de Tarins.*

## Geai des chênes

Famille Corvidae – [http://fr.wikipedia.org/wiki/Geai\\_des\\_ch%C3%AAnes](http://fr.wikipedia.org/wiki/Geai_des_ch%C3%AAnes)

### Description

Le geai des chênes est reconnaissable à son plumage coloré, rayé de noir et blanc sur la tête, dont les plumes peuvent se dresser (huppe érectile). Son bec est prolongé par une bande noire sous l'œil qui donne l'impression qu'il porte des sortes de moustaches noires.

Son corps est brun rosé sur le dessus et brun plus clair sur le dessous, sa queue est noire, son croupion et son bas-ventre blanc, ses rémiges primaires des ailes sont bleu vif et noir. Son envergure est de 45 à 55 cm. Déployées, ses ailes révèlent des marques blanches et bleues.



### Alimentation

Son régime alimentaire est carnivore, il se nourrit de larves et d'insectes comme la mésange et le moineau, il a aussi une alimentation végétale. Il affectionne particulièrement les glands des chênes qu'il cache pour l'hiver. Il peut à l'occasion être prédateur et n'hésite pas à s'attaquer aux nids des autres oiseaux pour manger les œufs et même les oisillons (mais ce qui arrive très rarement), ce qui lui a donné une solide réputation de pilleurs de nids.

Dans les parcs et jardins des villes, il apprécie les arachides, les vers, les légumes, les céréales, les noix et les baies.



### Chant

Son chant est très varié, passant de cris rauques, brefs, forts et stridents aux gloussements, sifflements et parfois même à des espèces de miaulements.

C'est en fait un bon imitateur et il a la capacité de reproduire des chants ou des cris d'autres oiseaux et même de mammifères comme le chat ou le cheval. À la fin de l'hiver et au début du printemps il émet une multitude de sons inspirés de ceux qu'il a entendus dans la forêt ou à sa lisière.

*Photo personnelle ci-contre*

### Comportement

On peut le rencontrer, en hiver, en petits groupes fréquentant les mangeoires et réserves de boules de graisse jusqu'aux abords des maisons d'habitation où il se laisse parfois approcher.

C'est un oiseau guetteur dont le cri strident alerte le sous-bois à l'approche d'un intrus. Lorsqu'il est formé, le couple défend son territoire contre leurs congénères.

### Alimentation

Mange principalement des glands, des châtaignes, des baies, des fruits, des graines, des pois, des pommes de terre et du blé. Il a aussi une alimentation animale incluant des insectes (chenilles, coléoptères, etc.), des limaces et des escargots, des œufs et des oisillons d'espèces plus petites, et même parfois des petits rongeurs.

## Pie

Famille Corvidae - [http://fr.wikipedia.org/wiki/Pie\\_bavarde](http://fr.wikipedia.org/wiki/Pie_bavarde)

### Description

Une Pie est un oiseau de grande taille de plumage blanc et noir, plutôt intelligent et bruyant. Les pies font partie des rares animaux capables de réussir le test du miroir (conscience de soi).

Cet oiseau de grande taille (de 44 à 56 cm de longueur) est doté d'une longue queue (de 20 à 30 cm). L'envergure varie de 52 à 60 cm et le poids de 200 à 250 g. Le mâle est légèrement plus grand que la femelle

### Alimentation

La pie bavarde est omnivore : son régime alimentaire est constitué de petits rongeurs (dont le campagnol), de lézards, d'insectes et d'autres invertébrés, de fruits et de graines divers, d'œufs, de débris humains et de charognes.



*Photo personnelle en haut à droite seulement*



## Pic Epeiche

Famille Picidae – [http://fr.wikipedia.org/wiki/Pic\\_%C3%A9peiche](http://fr.wikipedia.org/wiki/Pic_%C3%A9peiche)

### Description

Le pic épeiche ressemble aux autres pics noirs tachetés de blanc (pic épeichette, pic mar, pic à dos blanc, etc.), mais s'en distingue par le dos bien plus sombre, le bas-ventre rouge vif et, pour ce qui concerne le mâle, une tache rouge sur la nuque. Seules deux bandes blanches bien visibles de chaque côté du dos sont présentes.

Le jeune pic épeiche a une large calotte rouge et le bas-ventre dans les tons rosés, plus clair que celui de l'adulte. Pour se maintenir à la verticale des branches qu'il parcourt, il utilise comme support des plumes spéciales de sa queue, les rectrices, qui sont rigidifiées.

### Alimentation

Le pic épeiche se nourrit d'insectes, de larves sous l'écorce ou dans les bois, mais aussi de graines ligneuses et de baies. Vient parfois aux mangeoires. Par temps de neige et de gel persistants, il vient se nourrir aux boules de graines et graisse du commerce suspendues hors de l'atteinte des chats.

Avec son bec, il lui arrive de transpercer le nichoir des mésanges pour en ramener les oisillons comme nourriture pour sa propre couvée

Le male possède une nuque bien rouge, tandis que celle de la femelle est noire.

Le Pic épeiche loge dans un tronc ou une branche. Le diamètre du trou d'entrée est de 5 - 6 cm (plus grand que celui du pic épeichette). 4 à 7 œufs en une ponte d'avril à juin.



**Notes personnelles :** *vu rarement !*

## Palombe (Pigeon Ramier)

Famille *Columbidae* - <http://fr.wikipedia.org/wiki/Palombe>

Le Pigeon ramier (*Columba palumbus*) ou palombe est la plus grande (entre 460 à 570 grammes, envergure de 75 à 80 centimètres et une longueur de 40 à 42 centimètre) et la plus commune des espèces de pigeons européens.

Le pigeon ramier est capable de résister à des conditions météo telles que la pluie, le froid ou une forte humidité mais supporte mal la chaleur torride, l'aridité, le gel prolongé et l'enneigement au sol.



*Photos personnelles*

Il est répandu aussi bien en forêt que dans les espaces urbains et ruraux. Le régime du pigeon ramier est essentiellement constitué de matière végétale (feuilles vertes, baies, bourgeons, fleurs, racines et graines) mais des invertébrés sont consommés occasionnellement. Il a été observé que la plus grande quantité de nourriture est prise en fin d'après-midi.

L'alimentation se déroule principalement au sol par picorage mais elle peut également s'effectuer dans les arbres, les oiseaux se montrant alors d'une rare agilité.

## Corneille noire

Famille Corvidae - [http://fr.wikipedia.org/wiki/Corneille\\_noire](http://fr.wikipedia.org/wiki/Corneille_noire)

Elle se nourrit surtout de cadavres, de petits animaux (en bord de mer, elle est capable de se nourrir de coquillages) et, en zone d'habitation humaine, de déchets.

Elle pille également les autres nids. A la campagne elle craint le voisinage de l'homme qui souvent cherche à la détruire ignorant les services qu'elle lui rend et ne lui reprochant que les dégâts qu'elle peut occasionner aux cultures, mais en ville elle a su parfaitement s'y habituer, s'approchant de très près de ceux qui la nourrissent.



La Corneille noire vit en couples territoriaux quand elle est adulte, en bande pour les juvéniles. Sa période de nidification s'étend de mars à juin : le nid, constitué de brindilles, est installé le plus souvent sur la fourche d'un arbre, mais on en voit aussi dans des structures métalliques et parfois même au sol. Elle pond une seule fois, jusqu'à une demi-douzaine d'œufs.



*Photo personnelle en haut.*