

La maladie de Carré.

Lillian C. Raymond Mallock.

La maladie de carré est une maladie que nous connaissons à peine ces jours. Une vaccination annuelle simple donne à votre chien la protection dont il a besoin et personne n'a plus désormais peur de perdre un chien à cause de cette maladie. Ca n'a pas toujours été le cas.

Au début du 20ème siècle il y eu de grandes éruptions de maladie de carré en Europe et aux Etats-Unis. Certains élevages furent complètement balayés. Aucun éleveur n'a échappé à cette horreur. Les expositions canines étaient de véritables terrains d'infection d'une triste notoriété et aller à une exposition n'était certainement pas sans risque. Beaucoup de chiens rapportaient le virus de la maladie de Carré à la maison et contaminaient leurs élevages.

La science vétérinaire était toujours dans ses balbutiements et des sélectionneurs désespérés ne pouvaient compter que sur eux-mêmes pour guérir leurs chiens de cette maladie presque incurable. Beaucoup d'entre eux commencèrent à expérimenter et bien souvent le remède aura été plus mauvais que la maladie. Arthur Seyfahrt, un sélectionneur allemand qui livrait ses chiens par la poste, envoyait chaque chien avec une boîte de comprimés anti-maladie de carré fait maison. Lorsque le chien avait de la chance il réchappait de la médication.

Lillian C. Raymond Mallock, un éleveur américain très célèbre qui avait émigré en Angleterre, expérimentait aussi des médicaments anti-maladie de carré. Mme. Raymond Mallock avait plusieurs lignées d'élevage sous l'affixe *Ashton More*. Ses Terriers Yorkshire et particulièrement ses King Charles Spaniels, étaient très célèbres dans le monde entier. Beaucoup de King Charles Spaniels du 21e siècle proviennent des lignées d'*Ashton More*. Une des *Ashton More* les plus célèbres était *Ashton More Michael*, une belle King Charles Spaniel Tricolore. *Michael* est morte de maladie de Carré en 1934 à l'âge de 2 ans. Malgré sa jeunesse elle fut importante pour la race. Après sa mort elle fut empaillée et présentée au Musée britannique d'Histoire naturelle dans

Tring, où on peut aujourd'hui encore la voir en compagnie de *Rubybitch Sweetheart* (mort en 1903), *BT Hartford Defender* (1900 - 1905) et la chienne blenheim *Rose* (1847 - 1849). J'ai visité le musée et ce fut une expérience très étrange que de voir des King Charles Spaniels empaillés. *Ashton More Michael* était en effet très beau. *BT Hartford Defender* était un plutôt grand spécimen, les autres étaient beaucoup plus petits.

Mme. Raymond Mallock était une lady de la society avec pour son temps des pensées très progressistes. Sa mort soudaine en 1937 fut la fin de l'*Ashton More* et de son héritage. Dans son livre «*Toydogs*», édité en 1907 au Michigan (USA), elle décrit comment elle traite la maladie de Carré :

C'est une des maladies les plus fatales qui puisse attaquer les chiens et celle qui peut revendiquer probablement le plus de victimes. On la connaît sous trois formes, c'est-à-dire de la tête, des poumons et des intestins. Les jeunes chiots sont les plus sensibles et c'est parmi eux que l'on trouve la mortalité plus grande. Les chiens plus vieux peuvent aussi en souffrir et ceux qui l'ont déclarée s'en sont rarement réchappés, car la maladie de Carré est autant contagieuse qu'infectieuse. La maladie n'est pas d'origine spontanée comme tant de personnes le croient, il s'agit d'un virus spécifique.

Les chiens souffrant de cette maladie doivent être mis strictement en quarantaine et ceux revenant d'expositions ne devraient jamais être mis près de jeunes chiots (j'ai connu une nichée entière perdue de cette façon). On croit généralement qu'une attaque donne l'immunité, ce n'est malheureusement pas toujours le cas. Un de mes Terriers Yorkshire fut atteint de maladie de Carré lorsqu'il était chiot et de nouveau à l'âge de huit ans, mais en règle générale si votre chien a été atteint par la maladie de Carré il est en général beaucoup plus résistant. Des soins intensifs sont la moitié de la bataille pour vaincre cette maladie fatale et on doit toujours être prêt à combattre cet ennemi d'importance car il n'existe aucune maladie qui accable le système si rapidement et aucun remède, fut-il vainqueur, ne peut assurer le plus habile des éleveurs qu'il vaincra la fois prochaine. Donc, la maladie devrait être prise en considération dès le premier symptôme et seule une bonne alimentation et une attention toute particulière donnée au petit invalide pour entretenir ses forces. Tant qu'il mangera il y aura peu de danger. Quand il ingère la nourriture (parfois donnée dans une cuillère), je me sens rarement inquiète, mais quand il ne peut plus alors ses chances de rétablissement s'amenuisent. Si possible, maintenir le

Santé

patient en quarantaine dans une chambre aérée, brillante et gaie de la maison celle-ci sera maintenue à température stable, les courants d'air doivent être rigoureusement évités.

La maladie de Carré dure d'habitude de trois à six semaines, ses premiers symptômes étant la débilité générale, la perte d'appétit, la fièvre, l'écoulement des yeux et du nez, la respiration lourde et dans quelques cas des étournements sévères. Mon premier mouvement est de mettre la petite créature dans une veste de flanelle (un morceau d'un vieux maillot de corps en laine d'agneau est meilleur que tout autre chose, car très léger et très chaud), qui peut facilement être modifiée : deux trous pour ses petites pattes de devant et un pour le cou, et cousu solidement dans le dos. Il n'a pas besoin de couvrir plus que la moitié de son corps, l'objet principal de la veste étant de protéger la poitrine et les poumons. Ceci étant fait, je commence à donner mon vieux remède : la glycérine de carbolic, qui est la combinaison la plus merveilleuse que je connaisse et pour laquelle je dois remercier le peintre animalier anglais célèbre et connaisseur bien connu, Mlle Fairman, qui m'a donné la prescription il y a quelques années déjà. Les proportions sont : une partie de carbolic pour dix de glycérine. Quand on soigne à l'aide de cette prescription, très peu de médicament sera nécessaire, car cela désinfecte à fond le système entier du chien et empêche la maladie d'atteindre ses formes les plus sévères. J'ai soigné des centaines de chiens de cette façon avec un succès simplement phénoménal et je considère cette découverte de la plus grande importance. C'est aussi un préventif capital de la maladie de Carré qu'on devrait toujours administrer à tous les chiens d'une nichée infectée par cette maladie ainsi qu'à ceux envoyés aux expositions. Durant ces dernières années, j'ai fait ma part d'exposition et je peux sincèrement déclarer qu'aucun cas n'est simple



MRS. LILLIAN C. RAYMOND-MALLOCK

et si j'ai vaincu la maladie de carré, je crois que c'était en raison du fait que l'on a donné à mes chiens huit gouttes de glycérine de carbolac deux fois par jour pendant qu'ils étaient en exposition.

Dans les cas sévères de maladie de carré le médicament peut être administré toutes les quatre heures, mais d'habitude trois fois par jour sera suffisant, dans des quantités variant de trois gouttes pour un chiot à zéro à six semaines, à vingt gouttes pour un chien de douze livres, quoique pour le sujet moyen dix gouttes seront suffisantes. Le médicament peut être administré dans une cuillerée à café d'eau. La température d'un chien malade doit, bien sûr, être régulièrement prise et s'il a de la fièvre, celle-ci doit être réduite. Les intestins doivent être entièrement nettoyés aussi. En cas de la constipation, donnez un laxatif doux, mais pour la diarrhée (le plus commun actuellement), j'ai trouvé qu'une petite cuillerée à café de teinture de rhubarbe mélangée avec un peu d'eau chaude et donnée trois fois par jour était un bon remède, ou alors deux fois par jour, matin et soir, un comprimé de salol à cinq grains et un pour un chien adulte et la moitié de cette quantité pour un chiot. De l'arronroot soigneusement préparé, auquel quelques gouttes de cognac auront été ajoutées est souvent un remède efficace et pour les jeunes chiots, la chose la plus sûre à utiliser.

L'amidon cru mélangé dans un peu de lait est parfois utilisé avec succès et l'eau de flocons d'avoine est aussi actuellement un remplaçant excellent de l'eau potable. Dans des cas très sévères on donne parfois cinq gouttes de laudanum dans un peu de lait, mais c'est une drogue puissante et ses effets doivent être soigneusement surveillés.

Les vomissements causent fréquemment beaucoup d'ennui et s'ils ne sont pas surveillés, seront souvent fatals, vingt gouttes de solution à cinq pour cent de cocaïne, répétée toute les vingt minutes, échouent rarement à l'arrêter, tout en rappelant que dès que les vomissements ont cessé, un grand soin devra être pris pour ne pas surcharger l'estomac et le régime devra être spécialement digeste. Je préfère le bœuf liquide peptonoids à toute autre nourriture. En fait, je conseille de donner ce bœuf durant toute la maladie pour un cas de maladie de Carré. Valable en tout temps, cette nourriture l'est spécialement quand l'estomac est très faible et sera conservée par celui-ci quand toute autre nourriture échoue. Il doit bien souligner ici la grande nécessité de donner la nourriture en abondance aux chiens atteints de la maladie de Carré : c'est sûrement la chose la plus importante. Quand la convalescente est atteinte, les pilules tonifiantes suivantes seront utiles : Quinine

Santé

neuf grains, soufre de fer treize grains, extrait de gentiane dix-huit grains, sucre en poudre treize grains, le tout réparti dans une douzaine de pilules à donner matin et soir.

Lillian C. Raymond Mallock

Nous sommes bien chanceux de nos jours avec nos aliments complets et tous les médicaments et vaccinations disponibles chez nos vétérinaires et pharmaciens (bien que nos bourses n'en soient pas toujours si heureuses!).

Ankie v.d.Berg-Hage

<http://www.royaldesire.nl>

www.royaldesire.nl



A Spencer,

Tu m'appartiens, je t'appartiens,

Ensemble nous faisons la route,

Et dis-moi de ces petits riens

Qui consolent qui les écoute (G. Apollinaire)

Spencer de Cartledge, prod. Thierry CARTEAU, prop. Viviane Godenne

Photo : Viviane Godenne

page 36 Club des Amis des Epagneuls Nains Anglais ASBL/VZW