


# Charmoise

Charmoise	
	
	
Brebis de race charmoise	
<b>Espèce</b>	Mouton ( <i>Ovis aries</i> )
<b>Caractéristiques</b>	
<b>Taille</b>	bélier 70cm; brebis 65cm
<b>Poids</b>	bélier de 80 à 90 kg, brebis de 55 à 70 kg
<b>Cornes</b>	motte
<b>Toison</b>	blanche
<b>Prolificité</b>	110 %
<b>Autre</b>	
<b>Utilisation</b>	viande
<a href="#">modifier</a> <sup>[1]</sup> 	

La **Charmoise** est une race ovine de petit format créée au milieu du XIX<sup>e</sup> siècle par l'agronome-éleveur Édouard Malingié.


## Origine

La **Charmoise** est une race ovine issue de croisements suivis de métissage entre d'une part des brebis elles-mêmes issues de croisements entre des races rustiques françaises (Berrichon, Mérinos, Tourangeau, Solognote) avec, d'autre part, des béliers de la race anglaise améliorée Romney-Marsh <sup>[2]</sup> appelée New Kent en France.

Cette race tire son nom de la ferme de la Charmoise près de Pontlevoy dans le Loir-et-Cher, dans laquelle elle a été créée entre 1838 et 1852 par un agronome et éleveur, Edouard Malingié<sup>[3]</sup>.


## Standard

- *Tête* : petite, blanche ou rosée. Profil droit. Yeux et orbites très saillants. Oreilles petites, minces, droites, mobiles.
- *Corps* : poitrine ample, dos horizontal, croupe large.
- *Gigot* : nettement rebondi et bien descendu
- *Membres*: courts, fins
- *Laine* : blanche, fine, tassée et à mèches courtes, laissant la tête et les jambes dénudées
- *Poids* : bélier de 80 à 90 kg, brebis de 55 à 70 kg
- *Taille* : petite : bélier 70cm; brebis 65 cm



Ovins de la race de La Charmoise

## Zones géographiques d'élevage



La Charmoise est surtout implantée dans le Centre ouest de la France, principalement en Vienne, Deux-Sèvres et Vendée. Elle est aussi disséminée dans d'autres départements du Centre et du Sud-Ouest, elle est présente dans les Ardennes.

C'est une race très appréciée à l'étranger, la première race française à avoir été introduite en Grande Bretagne où elle bénéficie d'une association d'éleveurs dynamique<sup>[5]</sup>.

## Population

Ses effectifs ont considérablement décliné au profit de races de plus grand format, de 645 000 au total en 1963<sup>[6]</sup>, où elle était la 3ème race nationale en effectif après la Lacaune et les Caussenards, ils seraient aujourd'hui de l'ordre de 20 000 brebis (estimation du Bureau des Ressources Génétiques<sup>[7]</sup>). La Charmoise est inscrite à la liste des races bénéficiant des « mesures agro-environnementales » au titre de la *protection des races menacées de disparition* (PRM)<sup>[8]</sup>.

## Aptitudes


La Charmoise est une race ovine de petit format dotée à la fois d'une excellente conformation bouchère et d'une très bonne rusticité, elle est qualifiée pour cela par les tenants de la race de *la plus rustique des races améliorées et la plus améliorée des races rustiques* comme la désignait Guy de Boisgrollier, autre grand nom associé à l'histoire de la race<sup>[9]</sup> et promoteur de l'élevage de plein air dans le Montmorillonnais<sup>[10]</sup>. Il s'agit en effet d'une race très résistante à la sécheresse et très bien adaptée aux conditions d'élevage en plein air avec agnelage sous abri. On retrouve donc des **Charmoise** dans des zones herbagères de qualité médiocre avec une conduite extensive<sup>[11]</sup>.

C'est une race à croissance lente, donc très bien adaptée à la production d'agneaux d'herbe pour une commercialisation possible au quatrième trimestre sous la forme d'*agneaux de report*<sup>[12]</sup>, avec une bonne aptitude au désaisonnement<sup>[13]</sup> naturel, qui permet de porter sa production à trois agnelages en deux ans, avec alors une productivité annelle de 1,3 à 1,4 agneau par brebis

## Résultats du contrôle des performances

- La **prolificité** est faible (110 % en œstrus naturel, 120 % en œstrus induit mais l'induction de l'œstrus y est rarement pratiquée). Qualifiée parfois de *race à l'enfant unique*, elle bénéficie en contrepartie d'un faible taux de mortalité après la naissance, d'une très bonne facilité d'agnelage (finesse de l'ossature) et en conséquence d'une simplification de la conduite en temps de travail.
- Le **désaisonnement** est bon avec la possibilité d'agnelages en septembre même si la conduite dominante d'élevage ou de finition à l'herbe s'accompagne d'agnelages en hiver ou au printemps comme le montre la distribution annuelle des agnelages.

(Répartition mensuelle des agnelages 2009, élaboration graphique par Wikipédia)



- Le **gain moyen quotidien** des agneaux entre 30 et 70 jours a été de 291 g avec un écart-type de 76 g, sur 436 agneaux mâles simples contrôlés, en élevages de sélection, en 2009.
- Le **poids à âge type de 30 jours** (PAT 30 j) qui donne une indication du potentiel laitier des mères est présenté dans le tableau qui suit.

PAT 30 j des agneaux exprimé en kg dans les élevages en organisme de sélection en 2009

	simples		doubles		triples et plus
	mâles	femelles	mâles	femelles	
<b>moyenne</b>	11,1	10,7	9,7	8,9	
<b>effectif</b>	1 120	1 267	208	237	
<b>écart-type</b>	2,2	1,9	2,9	2,1	

- La **carcasse** est caractérisée par une ossature fine avec un très bon développement musculaire (l'un des meilleurs qui soient : le rendement de carcasse est supérieur à 50 % du poids vif pour un poids de carcasse de 16 à 18 kilos) et une adiposité faible (peu de déchets).

Toutes ces caractéristiques bien mises en valeur, en sus des qualités d'élevage, devraient constituer un facteur de maintien voire de reprise de l'élevage de cette race.

## Notes et références

- [1] <http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Charmoise&action=edit&section=0>
- [2] [http://en.wikipedia.org/wiki/Romney\\_Marsh\\_Sheep](http://en.wikipedia.org/wiki/Romney_Marsh_Sheep)
- [3] Louis LEOUZON : Agronomes et éleveurs (Edouard Malingié, pp 302-315), J.-B. Baillière et fils, Paris, 1905
- [4] Institut de l'Élevage, département génétique : Bilan du contrôle de performances ovins allaitants - Campagne 2009, 105 pp, juillet 2010.
- [5] <http://www.charmoisesheep.co.uk/index.html>
- [6] E. Quittet, Inspecteur Général de l'Agriculture, avec la collaboration des Directeurs Départementaux des Services Agricoles, du Comité National Interprofessionnel de la Laine et de la Fédération Nationale Ovine, Cartes dressées par J. Lavailotte : Races ovines françaises, 2e édition, 95 pp, Éd. : La Maison Rustique ed., Paris, 1965
- [7] BRG Charmoise (<http://www.brg.prd.fr/brg/pages/rga/ovins/60>)
- [8] Protection des races menacées de disparition (PRM) ([http://www.nievre.equipement-agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/dispositif\\_F\\_notice\\_agriculteurs\\_2010\\_cle232d6a-1.pdf](http://www.nievre.equipement-agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/dispositif_F_notice_agriculteurs_2010_cle232d6a-1.pdf))
- [9] [http://www.monastere-transfiguration.fr/race\\_ovine\\_charmoise.html](http://www.monastere-transfiguration.fr/race_ovine_charmoise.html)
- [10] Laurent RIEUTORT : L'élevage ovin en France. Espaces fragiles et Dynamique des systèmes agricoles. Ceramac 7. Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand 1995.
- [11] <http://www.patre.fr/actualites/races-ovines-rustique-bien-conformee-la-charmoise-est-gagnante-en-systeme-econome&fldSearch=:19097.html>

---

[12] Fiche conseil Geodesheep de la Charmoise ([http://www.geodesheep.com/documents/fiche\\_conseil\\_CHARMOISE.pdf](http://www.geodesheep.com/documents/fiche_conseil_CHARMOISE.pdf))

[13] En rapport avec le photopériodisme et la reproduction : c'est le fait d'organiser la *lutte* (nom donné à la reproduction chez les ovins) au printemps, donc à contre saison car à durée de jours croissante, plutôt qu'à l'automne (durée de jour décroissante qui est la saison naturelle de reproduction des moutons dans l'hémisphère nord, au moins au nord de l'Europe et dans la moitié nord de la France)

# Sources et contributeurs de l'article

**Charmoise** *Source:* <https://fr.wikipedia.org/w/index.php?oldid=104228218> *Contributeurs:* Ben23, Darreenvt, De boisgrollier, Ediacara, Eponimm, Ertezoute, Gemini1980, Goudron92, Gz260, Haugure, Isaac Sanolnacov, JLM, Le pro du 94 :, MIRROR, Regissierra, Rosier, S010xal, Sebleouf, Totodu74, 4 modifications anonymes

## Source des images, licences et contributeurs

**Fichier:Ombremouton.png** *Source:* <https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Ombremouton.png> *Licence:* GNU Free Documentation License *Contributeurs:* Meuble\_mouton.svg: Henrysalome derivative work: Ben23 (talk)

**Fichier:Charmoise01 SDA2011.jpg** *Source:* [https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Charmoise01\\_SDA2011.jpg](https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Charmoise01_SDA2011.jpg) *Licence:* Creative Commons Attribution-Sharealike 3.0 *Contributeurs:* User:Eponimm

**Image:Gtk-dialog-info.svg** *Source:* <https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Gtk-dialog-info.svg> *Licence:* GNU Lesser General Public License *Contributeurs:* David Vignoni

**Fichier:Charmoises.jpg** *Source:* <https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Charmoises.jpg> *Licence:* Creative Commons Attribution-Sharealike 3.0,2.5,2.0,1.0 *Contributeurs:* Roland Darré

**Fichier:Elev sel Charmoise.png** *Source:* [https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Elev\\_sel\\_Charmoise.png](https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Elev_sel_Charmoise.png) *Licence:* Creative Commons Attribution-Sharealike 3.0,2.5,2.0,1.0 *Contributeurs:* Darreenvt

## Licence

---

Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0  
[//creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)