



## Pistachier (*pistacia lentiscus* L.)

Le lentisque, ou pistachier lentisque, est un arbuste poussant dans les garrigues et maquis des zones méditerranéennes. Plante de la famille des Térébinthacées, à feuillage persistant, elle donne des fruits, d'abord rouges, puis noirs. C'est une espèce dioïque (Les fleurs mâles et les fleurs femelles sont portées par des pieds différents). Les fleurs femelles sont de couleur vert-jaune et en grappes. Les fleurs mâles sont rouge foncé. On l'appelle aussi arbre à mastic, car sa sève est utilisée pour la réalisation d'une gomme à l'odeur prononcée. Dans l'Antiquité, cette gomme faisait office de chewing-gum. Cette gomme est aussi employée en pâtisserie, en confiserie, et pour la fabrication de liqueurs et cosmétiques. Dans son milieu naturel le pistachier peut atteindre une hauteur de 3 à 6 m.



Pistachier lentisque de 8 ans environ.

### Exposition

La plus lumineuse possible. Il ne craint pas le plein soleil, même en été.

Plage de températures :

-5°C - +35°C en extérieur (attention aux coups de froid qui peuvent le faire mourir, il est préférable de le maintenir hors-gel). En intérieur, pièce fraîche et lumineuse en hiver. A maintenir en extérieur l'été si possible.

### Fertilisation

Tous les mois de mars à juin. Interrompre en juillet et reprendre en septembre et octobre. Pas de fertilisation en hiver.

### Taille

Rabattre à deux feuilles en fin d'été. Eliminer les rejets à la base de l'arbre et à l'aisselle des branches. Il est possible de le défolier au printemps mais jamais l'année du repotage. Le pistachier est un arbre intéressant en bonsai et qui peut donner assez rapidement de beaux sujets malgré une croissance assez lente. L'espèce est très résistante.

### Ligature

Se prête assez mal à la ligature car le bois est assez cassant. Il vaut mieux le former par la taille.

### Arrosage

Craint l'excès d'eau. Laisser sécher le substrat avant d'arroser à nouveau.

### Repotage

Généralement entre fin mars et fin avril dans un mélange drainant 40 % akadama 60 % pouzzolane ou pierre ponce. Eviter les sols acides et ne pas trop tailler les racines. Se contenter de réduire en périphérie.

### Maladies et parasites

Peut être attaqué par la rouille et la gale du pistachier.



Feuilles du pistachier.