


James Garnett



Adulte

*Styrax* : du grec *sturax*, nom de l'Aliboufier  
*japonica* : du Japon

*Styrax japonica* est un arbuste au port étalé gracieux, portant une multitude de fleurs blanches en clochettes pendantes sous les rameaux.



Zone de rusticité 1 à 7 IDF, 5 USDA



Feuillages (6 à 8 cm)

T. LAMANT



Clochettes groupées par 3 à 6

T. LAMANT



Fructification globuleuse (1,5 cm)

T. LAMANT

**Port** : arbuste à port ovoïde large et aéré. Il a des branches latérales étalées à l'horizontale. La cépée est sa forme naturelle la plus adaptée. Cependant, il est possible de le conduire en tige branchue ou remontée sur une petite hauteur à condition de sélectionner un seul tronc principal.

**Rameaux** : sinueux, brun rouge, s'exfoliant après quelques années.

**Ecorce** : grise striée de rose, puis grise avec de grosses fissures orangées.

**Feuillage** : caduc. Feuilles obovales, à bordure ondulée de 6 à 8 cm de long. Elles sont vert foncé brillant dessus, plus clair dessous et se colorent en jaune à l'automne.

**Floraison** : en juin juillet, nombreuses fleurs en clochettes blanc pur, de 1,5 à 2 cm de diamètre, groupées par 3 à 6, pendant au bout d'un long pédicelle sous les rameaux de l'année précédente. Les fleurs sont légèrement parfumées.

**Fructification** : dès la fin de l'été, fruits gris vert globuleux et lisses, de 1,5 cm de diamètre.

**Climat** : résistance moyenne au froid. Il craint les vents froids, le protéger de ceux-ci. Il supporte le soleil et la mi-ombre, par contre un ombrage trop important ne lui convient pas.

**Usages et comportement** : sa croissance est moyennement rapide et sa longévité est moyenne. Il peut être planté isolé, en étage haut de massif, composer des haies libres ou être implanté en sous-étage de grands arbres.

**Sol** : il supporte les sols superficiels, compacts, légers et acides. Il n'apprécie pas les sols basiques et secs. Il a besoin d'un sol humifère restant légèrement humide (frais) sans être gorgé d'eau de façon temporaire ou permanente.

**Origine** : Corée, Japon. Il fut introduit en Europe en 1862.

**Conseils pour la plantation** : c'est un arbuste de semi-collection en forme libre et rare en tige. Il est recommandé de le planter en motte.

**Taille de formation** : le mieux est de conserver son port naturel ramifié depuis la base. Il n'est pas facile à former en tige du fait de son port ramifié et étalé. Si l'on souhaite le former en tige, éliminer les branches basses.

**Conseils d'entretien** : la taille d'entretien n'est pas nécessaire. Il est cependant possible d'éliminer les ramifications de la base pour lui donner un aspect de cépée arborescente.

**Anecdote** : Une espèce voisine, *Styrax benzoin*, donne le benjoin, substance autrefois sacrée, aux vertus médicinales et servant aussi de parfum.

**Essence apparentée** :  
*Styrax officinalis* est subsontané dans le Var, il lui ressemble. Il est moins rustique.

