



NOS JARDINS À LA LOUPE

www.nos-jardins-a-la-loupe.fr

Geai des Chênes

Nom latin : Garrulus glandarius

Famille : Corvidés

Taille : 34/36 cm

Envergure : 52/58 cm


Nidification : mars à août. Une nichée de 4 à 6 oeufs.

Habitat : milieux boisés.

Caractéristiques : son alimentation est constituée principalement de graines (glands et faines), mais il consomme aussi quelques insectes et autres petits animaux. En automne, il collecte des milliers de glands qu'il enfouit dans le sol pour subsister durant l'hiver.

À la mangeoire : Arachides, grosses graines : noix, noisettes, amandes, avoine aplatie, baies, restes de légumes.

CARTE D'IDENTITÉ DES OISEAUX



Le Pic épeiche

Nom latin : Dendrocopos major

Famille : Picidés

Taille : 23 / 26 cm


Envergure : 38 / 44 cm

Nidification : avril à août. Une nichée de 4 à 7 oeufs.

Habitat : Milieux boisés.

Caractéristiques : Assez éclectique dans le choix de son milieu de vie et de sa nourriture. En été, il se nourrit d'insectes mais n'hésite pas à éventrer des cavités où nichent de petits passereaux pour dévorer les oeufs ou oisillons. En hiver, les graines de conifères constituent sa principale source d'alimentation.

À la mangeoire : Tournesol, arachides, amandes, noix, noisettes, graisses végétales, beurre, saindoux.



Sittelle torchepot

Nom latin : Sitta europaea

Famille : Sittidés

Taille : 12 / 14 cm

Envergure : 23 / 27 cm

Nidification : mars à juin


Une nichée de 5 à 9 oeufs.

Habitat : Forêts, parcs et jardins.

Caractéristiques : se déplace de branche en branche la tête vers le bas. Niche dans des trous d'arbre qu'elle ne creuse pas elle-même, elle adopte volontiers d'anciennes loges de pics dont elle cimente le trou d'envol quand ce dernier est trop large. En été, elle cache des insectes, des noisettes et autres fruits dans les fissures des arbres (enclume).

À la mangeoire : Tournesol, graisses végétales, beurre, noisette (très friande).

CARTE D'IDENTITÉ DES OISEAUX



Grosbec casse-noyaux

Nom latin : Coccothraustes coccothraustes

Famille : Fringillidés

Taille : 16 / 18 cm


Envergure : 29 / 33 cm

Nidification : avril à août. Une nichée de 4 à 6 oeufs.

Habitat : Forêts mixtes et quelques vergers.

Caractéristiques : Comme son nom l'indique, il se sert de son bec puissant pour casser les graines des plantes, voire même les noyaux de cerise. Cet oiseau vit surtout dans la partie haute des arbres et n'est donc pas visible quand ces derniers se couvrent de feuilles au printemps. Observable occasionnellement quand il va boire à une flaque.

À la mangeoire : Tournesol, millet rond, maïs, noix, noisettes.





NOS JARDINS À LA LOUPE

www.nos-jardins-a-la-loupe.fr

CARTE D'IDENTITÉ DES OISEAUX

Rougegorge familier

Nom latin : Erithacus rubecula

Famille : Turdidés

Taille : 12 / 14 cm

Envergure : 20 / 22 cm

Nidification : avril à août. Deux nichées de 4 à 6 oeufs.

Habitat : Forêts, bocages, jardins.

Caractéristiques : Pour chanter, il se perche sur une branche un peu élevée, le reste du temps il vit surtout dans la basse végétation, près du sol. Il y chasse diverses bestioles, du puceron au ver de terre. Le nid, construit par la femelle, est aussi installé au sol, de préférence sous les racines et touffes d'herbe. La femelle assure seule la couvaison, mais aidée par le mâle pour le nourrissage des jeunes.

À la mangeoire : Avoine aplatie, riz cuit, millet rond, graisse végétale, beurre, suif et saindoux.



Bas du ventre gris clair



Plastron orange vif

Chardonneret élégant

Nom latin : Carduelis carduelis

Famille : Fringillidés

Taille : 12 / 14 cm


Envergure : 21 / 25 cm

Nidification : avril à septembre. Deux à trois nichées de 4 à 6 oeufs.

Habitat : Bosquets, lisières, vergers.

Caractéristiques : Cherche volontiers sa nourriture sur les bardanes et chardons d'où il tire son nom. Niche souvent en petites colonies comptant une dizaine d'individus. Pour chercher leur nourriture, ils se regroupent en bandes. Les individus étrangers au groupe ne sont pas tolérés sur son territoire d'alimentation.

À la mangeoire : petites graines : tournesol, millet rond, avoine aplatie.



Calotte noire

Rémiges jaunes vives

Bec assez long et pointu

Face rouge avec un masque noir



NOS JARDINS À LA LOUPE

www.nos-jardins-a-la-loupe.fr

Verdier d'Europe

Nom latin : Carduelis chloris

Famille : Fringillidés

Taille : 15 / 16 cm

Envergure : 25 / 27 cm


Nidification : avril à août. Une à deux nichées de 4 à 6 oeufs.

Habitat : Forêts mixtes et quelques vergers.

Caractéristiques : Les couples se forment dès l'hiver alors que les verdiers forment encore des bandes. Au printemps, la femelle recherche un site de nidification favorable (buissons, haies) et construit le nid toute seule.

À la mangeoire : Tournesol, avoine aplatie, riz cuit, maïs concassé, millet rond, graisses végétales, beurre, suif et saindoux.

CARTE D'IDENTITÉ DES OISEAUX



Merle noir

Nom latin : Turdus merula

Famille : Turdidés

Taille : 24 / 28 cm


Envergure : 34 / 40 cm

Nidification : février à août. Deux à quatre nichées de 4 à 5 oeufs.

Habitat : Forêts, bocages, jardins.

Caractéristiques : C'est il y a 150 ans que le merle noir a commencé à migrer de la forêt vers les jardins et les espaces verts des villes. Les fourrés sont autant de sites de nidification appropriés et les pelouses rases autant de garde-manger bien garnis. Si l'on estime la population de merles noirs en Europe à 40-80 millions de couples, on peut dire qu'il s'agit de l'une d'une des espèces les plus communes.

À la mangeoire : Avoine aplatie, pommes et poires, raisins secs, feuilles de salade, pommes de terre cuites, miettes de pain.





NOS JARDINS À LA LOUPE

www.nos-jardins-a-la-loupe.fr

Mésange charbonnière

Nom latin : Parus major

Famille : Paridés

Taille : 13 / 15 cm

Envergure : 23 / 25 cm

Nidification : mars à août. Une à deux nichées de 6 à 12 oeufs.

Habitat : Bois, bocages, jardins.

Caractéristiques : Oiseau très polyvalent ne craignant pas la concurrence. Elle affiche sa supériorité dans la recherche des cavités de nidification en s'imposant face à d'autres mésanges et espèces cavernicoles. En moyenne, une mésange charbonnière vit deux ans et demi, mais certaines peuvent atteindre un âge plus avancé, le record étant des 15 ans.

À la mangeoire : Tournesol, noix de coco, arachides, amandes, noix, noisettes, avoine aplatie, riz cuit, graisse végétale, beurre, suif et saindoux.

CARTE D'IDENTITÉ DES OISEAUX




Tête et calotte noire

Joues blanches

Bande ventrale noire

Dessous jaune vif



Mésange bleue

Nom latin : Parus caeruleus

Famille : Paridés

Taille : 10 / 12 cm

Envergure : 23 / 25 cm

Nidification : mars à août. Une à deux nichées de 6 à 12 oeufs.

Habitat : Bois, bocages, jardins.

Caractéristiques : Elle nourrit ses petits avec des insectes. En hiver, par contre, sa nourriture est constituée principalement de graines de plantes qu'elle fait éclater à grands coups de bec. Elle n'est pas pour autant obligée de renoncer complètement à son régime insectivore, car elle est capable d'extraire les insectes dissimulés dans les tiges de roseaux.

À la mangeoire : Tournesol, noix de coco, arachides, amandes, noix, noisettes, avoine aplatie, riz cuit, graisse végétale, beurre, suif et saindoux.




Calotte bleue

Dessus bleu

Bandeau noir

Dessous jaune



Mésange boréale

Nom latin : Parus montana

Famille : Paridés

Taille : 12 / 13 cm

Envergure : 17 / 20 cm


Nidification : avril à juillet. Une nichée de 4 à 12 oeufs.

Habitat : Forêts, zones boisées.

Caractéristiques : Elle recherche des cavités d'arbres avec un trou d'envol ou un espace intérieur très étroit. Elle essaie ainsi d'éviter de rentrer en concurrence avec les autres espèces de mésanges, mais l'inconvénient est que l'espace est souvent insuffisant pour une ponte complète. Par ailleurs, elle n'est pas à l'abri des prédateurs car les oeufs et les oisillons sont souvent victimes des pics épeiches.

À la mangeoire : Tournesol, noix de coco, arachides, amandes, noix, noisettes, avoine aplatie, riz cuit, graisse végétale, beurre, suif et saindoux.

CARTE D'IDENTITÉ DES OISEAUX



Mésange nonnette

Nom latin : Parus palustris

Famille : Paridés

Taille : 12 / 13 cm

Envergure : 18 / 19 cm

Nidification : avril à juillet. Une nichée de 4 à 12 oeufs.

Habitat : Forêts de feuillus humides, parcs et jardins.

Caractéristiques : Au tout début du printemps, cette mésange se met à la recherche d'un arbre mort. À l'aide de son bec petit mais puissant, elle fore une cavité dans le bois vermoulu au prix d'un travail d'une à deux semaines. La femelle en train de couvrir est ravitaillée de temps à autre par le mâle. Lorsque la nourriture est abondante, la mésange nonnette constitue des réserves en cachant des graines dans les fissures d'écorce.

À la mangeoire : Tournesol, noix de coco, arachides, amandes, noix, noisettes, chanvre, avoine aplatie, riz cuit, graisse végétale, beurre, suif et saindoux.



Moineau domestique

Nom latin : Passer domesticus

Famille : Passéridés

Taille : 13 / 14 cm

Envergure : 21 / 25 cm


Nidification : mars à septembre. Deux à quatre nichées de 4 à 6 oeufs.

Habitat : Près de l'Homme.

Caractéristiques : Il niche presque toujours dans des cavités situées sur des bâtiments. Il n'est pas rare que plusieurs couples forment une petite colonie et construisent un grand nid collectif avec plusieurs entrées. Pour se nourrir, il recherche aussi la compagnie de ses congénères, car le couple est une protection contre les attaques de prédateurs (chats, rapaces). Son régime se compose principalement de céréales et d'autres graines de plantes. Par contre, les jeunes sont nourris uniquement avec des insectes.

À la mangeoire : Tournesol, maïs concassé, avoine aplatie, blé, riz cuit, millet rond, graisse végétale, beurre, suif et saindoux.

CARTE D'IDENTITÉ DES OISEAUX



Moineau friquet

Nom latin : Passer montanus

Famille : Passéridés

Taille : 12 / 14 cm


Envergure : 20 / 22 cm

Nidification : avril à août. Deux à trois nichées de 3 à 7 oeufs.

Habitat : Bois clairs, jardins, cultures.

Caractéristiques : Comparé au moineau domestique, le moineau friquet se montre plus craintif à l'égard des Hommes. Lui aussi niche en zones habitées, entre autre dans les nichoirs. Il occupe une cavité dès l'automne, mais l'utilise seulement au début pour y passer la nuit. Il se nourrit de graines et se joint souvent pour cela à des groupes de fringillidés et de bruants jaunes.

À la mangeoire : Tournesol, maïs concassé, avoine aplati, riz cuit, millet rond, graisse végétale, beurre, suif et saindoux.



Pinson des Arbres

Nom latin : Fringilla coelebs

Famille : Fringillidés

Taille : 14 / 16 cm

Envergure : 25 / 28 cm

Nidification : avril à août. Une à deux nichées de 4 à 6 oeufs.

Habitat : Zones boisées, parcs.

Caractéristiques : Avec 200 millions de couples, le pinson des arbres est de loin l'espèce la plus représentée en Europe. La moitié environ vit dans le nord et l'est de l'Europe et migre vers le sud du continent en Automne. Chez nous la plupart sont sédentaires car ils trouvent suffisamment de nourriture sous la forme de graines et de faines. En Été, ils se nourrissent plutôt d'insectes.

À la mangeoire : Tournesol, maïs concassé, avoine aplatie, blé, riz cuit, millet rond. Se nourrit principalement au sol.

CARTE D'IDENTITÉ DES OISEAUX



Femelle beaucoup plus terne avec des teintes allant du beige au gris

Calotte et nuque grises bleutées

Barre alaire blanche très visible au vol



Dessous fauve à brun rose

Pinson du Nord

Nom latin : Fringilla montifringila

Famille : Fringillidés

Taille : 14 / 16 cm

Envergure : 25 / 26 cm

Nidification : mai à août. Une nichée de 5 à 7 oeufs.

Habitat : Forêts de conifères du Nord de l'Europe

Caractéristiques : L'aire de répartition des pinsons du nord varie fortement d'un hiver à un autre en fonction de l'abondance de nourriture. Certaines années, ils peuvent se faire rares, tandis que les années d'abondance, on assiste à des invasions de grande ampleur. Au printemps, le mâle voit son plumage se métamorphoser complètement en arborant des couleurs très vives (et cela sans aucune mue).

À la mangeoire : Tournesol, maïs concassé, avoine aplatie, riz cuit, millet rond.



Femelle plus terne, absence de calotte foncée et bec moins éclatant

Bec jaune, noir durant la période nuptiale

Calotte foncée et mouchetée, noire durant la période nuptiale

Poitrine orangée

Ventre blanc

