

Craspidospermum verticillatum Bojer var. **sessile** Markgr., var. nov.

Lamina foliorum desinens usque ad nodum, obovata, usque ad 15 × 7 cm.

TYPE : *Humbert 20575*, Vallée de la Manampanihy, aux environs d'Ampasimena, reste de forêt ombrophile sur argiles latéritiques et granite, 20-100 m, (holo-, P).

Humbert 20679, Mont Vohimavo au N. d'Ampasimena vers 700 m; *Decary 10996*, Ebakika (Fort Dauphin), dans le savoka.

Landolphia crassipes (Radlk.) K. Schum. var. **crassipes** subvar. **obtusiuscula** Markgr., subv. nov.

Folia obtuse angustata, non acuminata, brevia, late ovata, pleraque 3,5 × 2 cm.

CENTRE : *Homolle 432*, Montagne d'Ambre; *Cours 3379*, forêt d'Ambatosoratra (Ambatondrazaka), vers 1000 m; *Perrier 18632*, bassin du Mangoro, bord de la Haute Sahandramby. — EST : *Thiry s.n.*, côte N.E., « fingizahana » et « fingibary »; *S. F. 2442*, Soanierana-Ivongo; *Thiry s. n.*, côte Est « ditivahy »; *Perrier 12538*, Analamazaotra; *Flacourt s. n.*, Fort-Dauphin; *Geay 6688*, « voahena-mamavo ».

Stephanostegia capuroni Markgraf, sp. nov.

Arbor ultra 20 m alta. Ramuli compressi, glabri. Folia coriacea, late elliptica, apice rotundata et breviter acuminata, basi rotundata vel rotundato-angustata, 6-9 × 3,2-5,5 cm. Nervi laterales paulo distincti, recti, numerosi. Petiolus crassiusculus, 4 mm longus. Inflorescentiae iteratim dichasiales, multiflorae, cum paracladiis 10-13 mm longae, 6-8 cm latae, pubescentes. Pedunculus 4-7 cm longus, pedicelli 2 mm longi, dense albido-pubescentes. Lobi calycis ovati, 1,4 mm longi, ciliati et extus dense albido-pubescentes. Tubus corollae 4 mm longus, extus dense albido-pubescentis, squamae faucales (sine setarum fasciculo) 0,6 mm longae. Lobi corollae 4 × 3 mm, extus dense albido-pubescentes, intus glabri. Antherae 0,9 mm longae. Ovarium conicum, glabrum, 1,3 mm altum. Stylus 0,8 mm longus. Caput stigmatis 0,8 mm altum, apiculi breves, pilosi. Mericarpi paulo divergentia, ellipsoidea, basi attenuata, apice vix acuminata, 3-4 × 1,2-1,5 × 1,2 cm, sine costis lateralibus, extus magis carnosae quam aliarum specierum, rugosa, matura ventre et dorso ab apice usque ad basin fissa, margines ventrales et dorsales laeves, 3 mm lati, placenta 4 mm in loculum carpelli prominens. Semina obtusa, 10 × 8 mm, endospermium 7 × 4 mm, embryonis (maturi?) cotyledones 0,5 mm longi, radícula 0,9 mm longa.

Forêts littorales.

TYPE : *Capuron 24636 SF*, forêt d'Andrakaraka près d'Antahala, latérite de basalte, fl. (holo-, P).

EST : *Capuron 27787 SF*, Cap-Est, au sud d'Antalaha, fl.; *S.F. 15616*, 15698, Tampolo, village de Tanambao, district Fénéry, sable, fr. et 16103, fl.; *SF. 4495*, Taamtave, Antetazana, fr.; *SF. 12255*, 13292, Station forestière d'Ambila-Lemaitso, jardin botanique 2, fr. : *SF. 8316*, Antanamala, Ambila-Lemaitso.

Nom vern. : hazondronono.

Par la grandeur de ses fleurs et par le mésocarpe plus charnu et rugueux, couvert d'aspérités, l'espèce est particulière dans le genre.