



# Les Plantes

Comprendre la diversité du monde végétal



QUÉBEC AMÉRIQUE

# Les Plantes

<b>Éditeur</b>	Jacques Fortin
<b>Directeurs éditoriaux</b>	François Fortin Stéphane Batigne
<b>Rédactrice en chef</b>	Julie Cailliau
<b>Illustrateur en chef</b>	Jocelyn Gardner
<b>Designer graphique</b>	Anne Tremblay
<b>Illustrateurs</b>	Jean-Yves Ahern Manuela Bertoni Sonia Buffot Jocelyn Gardner Marc Lalumière Rielle Lévesque Alain Lemire Raymond Martin
<b>Rechercheur</b>	Gilles Vézina
<b>Correctrice</b>	Marie-Nicole Cimon
<b>Responsable de la production</b>	Nathalie Fréchette
<b>Graphistes</b>	Janou-Ève LeGuerrier Danielle Quinty Josée Noisieux
<b>Préresse</b>	Kien Tang Karine Lévesque
<b>Consultants</b>	Luc Brouillet Anne Bruneau Anja Geitmann Mario Parenteau Jean Rivoal

#### Données de catalogage avant publication (Canada)

Vedette principale au titre :  
Les Plantes : comprendre la diversité du monde végétal

(Guides de la connaissance)  
Comprend un index.

ISBN 2-7644-1105-6

1. Plantes. 2. Diversité végétale. 3. Écologie végétale. 4. Botanique.  
I. Titre. II. Collection.

QK45.2.P52 2006 580 C2005-941123-6



*Les Plantes : comprendre la diversité du monde végétal*  
a été conçu par **Les Éditions Québec Amérique inc.**

329, rue de la Commune Ouest, 3<sup>e</sup> étage  
Montréal (Québec) H2Y 2E1 Canada  
T 514.499.3000 F 514.499.3010

©2007 Éditions Québec Amérique inc.

Il est interdit de reproduire ou d'utiliser le contenu de cet ouvrage, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit – reproduction électronique ou mécanique, y compris la photocopie et l'enregistrement – sans la permission écrite de l'éditeur.

Nous reconnaissons l'aide financière du gouvernement du Canada par l'entremise du Programme d'aide au développement de l'industrie de l'édition (PADIÉ) pour nos activités d'édition.

Les Éditions Québec Amérique tiennent également à remercier les organismes suivants pour leur appui financier :

Conseil des Arts  
du Canada



Canada Council  
for the Arts



Imprimé et relié à Singapour.

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 09 08 07 06

[www.quebec-amerique.com](http://www.quebec-amerique.com)

# Les Plantes

---

Comprendre la diversité  
du monde végétal


# Table des



46	Les arbres	79	Les tropismes
44	Les inflorescences	78	Les hormones végétales
40	La fleur	74	La croissance des plantes
37	La feuille	70	Les végétaux hétérotrophes
34	La tige	67	La sève
30	La racine	64	La photosynthèse
26	L'anatomie des plantes à fleurs		

6   La diversité des végétaux	24   Les plantes à fleurs	50   La reproduction des plantes à fleurs	62   Nutrition et croissance
8 La classification des plantes		52 La pollinisation	
10 La cellule végétale		54 La fécondation	
12 Les algues		56 La graine	
14 Les champignons		57 Le fruit	
16 Les lichens		61 La multiplication végétative	
18 Les mousses			
20 Les fougères			
22 Les conifères			

# matières



- 112 Les boissons
- 110 Les ingrédients d'origine végétale
- 109 Les herbes et les épices
- 108 Algues et champignons comestibles
- 106 Les céréales
- 103 Les fruits
- 98 Les légumes

**80 | Les plantes  
et leur milieu**


- 82 Les formations végétales
- 84 La forêt équatoriale
- 86 Les savanes
- 88 Les forêts tempérées
- 90 Les plantes succulentes
- 92 Les plantes aquatiques
- 94 Les aires protégées

**96 | Les plantes  
alimentaires**

**114 | Les plantes  
industrielles**


- 116 L'industrie du bois
- 118 La fabrication du papier
- 120 Le caoutchouc naturel
- 121 Les plantes médicinales
- 122 Les plantes textiles

**124 | Glossaire  
126 | Index**



Le monde végétal rassemble **plus de 380 000 espèces**, dont plus des deux tiers sont des plantes vertes. Des algues marines unicellulaires aux plantes à fleurs les plus complexes, les végétaux présentent des organisations et des modes de vie et de reproduction d'une surprenante diversité, résultat de plus de **trois milliards d'années d'évolution**.





# La diversité des végétaux

- 8 **La classification des plantes**  
*Une complexité croissante*
- 10 **La cellule végétale**  
*L'élément de base des végétaux*
- 12 **Les algues**  
*Les premiers végétaux apparus sur Terre*
- 14 **Les champignons**  
*Des organismes sans chlorophylle*
- 16 **Les lichens**  
*La symbiose d'une algue et d'un champignon*
- 18 **Les mousses**  
*Les végétaux des zones humides*
- 20 **Les fougères**  
*Les plantes des sous-bois*
- 22 **Les conifères**  
*Les premiers arbres*

# La classification des plantes

*Une complexité croissante*

Au sein du monde végétal, les plantes vertes constituent le groupe le plus vaste, avec environ 278 000 espèces différentes. Les quatre principales subdivisions du groupe des plantes vertes sont les mousses, les fougères, les conifères et les plantes à fleurs. Ces dernières sont de loin les plus nombreuses, avec près de 234 000 espèces. Les champignons sont traditionnellement présentés aux côtés des plantes bien qu'ils n'en fassent pas partie. Ils forment un groupe distinct, homogène, constitué d'espèces qui puisent leur nourriture auprès d'autres organismes. Les algues, quant à elles, ne proviennent pas toutes du même ancêtre et composent un groupe hétérogène. Les algues brunes forment un groupe à part, tandis que les algues rouges et vertes font partie des plantes.


## L'ARBRE GÉNÉALOGIQUE DES VÉGÉTAUX

De tout temps, l'homme a cherché à classer les espèces vivantes qui l'entouraient. Les premières classifications, basées sur l'aspect extérieur des organismes, ont été affinées grâce à l'étude de l'organisation interne des individus, puis à l'analyse des gènes. Les gènes sont les caractéristiques propres à un individu et à son espèce, codées à l'intérieur de ses cellules. La comparaison des gènes propres à différentes espèces dévoile les relations entre ces espèces. La classification qui en découle permet de retracer l'évolution de la vie, des espèces les plus primitives aux plus complexes. Les êtres vivants y sont classés en lignées. Les végétaux sont répartis entre trois lignées distinctes : la lignée des champignons, celle à laquelle appartiennent les algues brunes et celle des plantes. Une lignée est subdivisée en phyllums, chaque phylum regroupant des organismes issus d'un ancêtre commun. Les principaux phyllums de végétaux sont ceux des bryophytes, des filicophytes, des coniférophytes et des angiospermes.



## NOMMER UNE PLANTE

À l'intérieur d'un phylum, on distingue parfois plusieurs classes, elles-mêmes divisées en ordres, en genres et finalement en espèces. Pour identifier une plante, il est inutile d'énumérer chacun des groupes auxquels elle appartient dans la classification des végétaux. En général, le genre et l'espèce, indiqués en latin, suffisent. Ainsi, la marguerite est désignée par son nom latin *Leucanthemum vulgare*. Il existe parfois plusieurs variétés d'une même espèce ; il est alors nécessaire d'ajouter le nom de la variété pour lever toute ambiguïté.



## TROIS MILLIARDS D'ANNÉES D'ÉVOLUTION

Les premières algues sont apparues dans les océans au cours de la période du précambrien, il y a plus de 3 milliards d'années, et les premières algues vertes, voilà 1,5 milliard d'années. Il y a environ 420 millions d'années, certaines algues vertes se sont adaptées à la vie terrestre. Elles ont évolué pour former des mousses, puis des plantes vasculaires sans feuilles ni racines. Les premières fougères voient le jour au début de la période carbonifère. Apparaissent ensuite les conifères, qui se développent à la fin du carbonifère et atteignent leur apogée au jurassique, entre -208 et -145 millions d'années. Les plantes à fleurs font leur apparition 30 millions d'années plus tard, au crétacé. Rapidement, leurs couleurs et leurs formes variées transforment le paysage terrestre.




# La cellule végétale

*L'élément de base des végétaux*

Malgré de nombreux points communs, la cellule végétale est bien différente de la cellule animale. Elle possède une paroi rigide, dont les cellules animales sont dépourvues, et elle renferme des organites supplémentaires : de grandes vacuoles et des chloroplastes. Cette machinerie cellulaire permet aux plantes de fabriquer leur propre nourriture à partir d'éléments puisés dans le milieu. En moyenne, une cellule végétale mesure 0,2 mm de diamètre, soit quatre fois plus qu'une cellule animale.



## LA STRUCTURE DE LA CELLULE VÉGÉTALE

La cellule végétale est l'élément de base de la plante. Elle est limitée par une membrane cellulaire recouverte par une paroi rigide, caractéristique des végétaux, qui donne sa forme à la cellule. L'intérieur de la cellule végétale est rempli d'un liquide visqueux, le cytoplasme, dans lequel baignent de petits éléments indispensables à la vie de la cellule, les organites cellulaires. Parmi ces organites, on compte le noyau, les ribosomes, la vacuole, les mitochondries et les chloroplastes. Les organites cellulaires remplissent différentes fonctions vitales, comme la nutrition, la respiration ou encore la fabrication des protéines qui serviront à la croissance de la plante.



## L'ORGANISATION D'UNE PLANTE À LA LOUPE

Les plantes sont composées de différents organes, comme par exemple les feuilles. Chaque organe est constitué de tissus formés par l'assemblage de cellules de différents types.



# Les algues

*Les premiers végétaux apparus sur Terre*

Plus de 25 000 espèces d'algues vivent en milieu aquatique, dans l'eau douce ou l'eau salée, et sur certains terrains humides. Les algues unicellulaires (formées d'une seule cellule) sont microscopiques. Elles vivent souvent en suspension dans l'eau douce ou l'eau de mer et font partie du plancton. Les algues pluricellulaires sont composées de plusieurs cellules associées sous forme de filaments ou de lames, et peuvent mesurer plusieurs mètres. En mer, certaines algues flottent à la surface de l'eau. D'autres sont fixées sur les rochers du littoral, rarement à plus de 30 m de profondeur. Au-delà de cette profondeur, la lumière devient insuffisante pour que les algues puissent se nourrir.

## LA STRUCTURE D'UNE ALGUE

Les algues sont parmi les espèces les plus simples du monde végétal. Ce sont des thallophytes : elles se présentent sous la forme d'un assemblage de cellules plus ou moins ramifié, le thalle, sans tige, ni racine, ni feuille.

Le **réceptacle**, partie renflée située à l'extrémité d'une fronde, porte les organes reproducteurs de l'algue.


Les divisions du thalle, appelées **frondes**, prennent la forme de lames plus ou moins larges qui ressemblent à des feuilles.

La **nervure médiane** forme une saillie qui parcourt le thalle ou les frondes de certaines algues.

De petites poches remplies de gaz, les **aérocystes**, assurent la flottaison de certaines algues.

Le **fucus vésiculeux** est une algue brune qui vit fixée sur les rochers découverts à marée basse.

Le thalle est fixé à son support grâce à un petit crampon, l'**haptère**.



thalle

## ALGUES VERTES, BRUNES ET ROUGES

Les algues présentent diverses colorations selon le type de pigments qu'elles renferment : on rencontre principalement des algues vertes, rouges et brunes. Cependant, toutes les algues possèdent un pigment vert, la chlorophylle, qui capte l'énergie lumineuse et permet la production de matière organique par photosynthèse. Les algues sont ainsi capables de fabriquer leur propre nourriture : elles sont autotrophes.



La laminaire sucrée est une **algue brune** du littoral de l'Atlantique Nord. Elle vit cramponnée aux rochers immergés dans des eaux peu agitées.



La dilsea est une **algue rouge** dont le thalle est épais et charnu. Fixée aux rochers dans des eaux assez profondes, elle est rarement émergée.




Les **algues vertes** poussent souvent en eaux douces. Ce sont les plus nombreuses : il en existe 8 000 espèces.

## LA REPRODUCTION DES ALGUES

Les algues peuvent se reproduire par voie asexuée : soit par simple fragmentation du thalle, soit par la production de cellules appelées spores qui sont libérées dans l'eau et qui germent pour former de nouvelles algues identiques à l'algue mère. La plupart des algues peuvent aussi se reproduire par voie sexuée. Les réceptacles de l'algue ① portent des structures productrices de gamètes ②. À maturité, ces organes libèrent dans l'eau des gamètes mâles et femelles ③. Munis de flagelles, les gamètes mâles sont mobiles dans l'eau ④. La fécondation, c'est-à-dire la fusion d'un gamète mâle et d'un gamète femelle, conduit à la formation d'un zygote ⑤. Cette cellule unique se multiplie pour former progressivement une nouvelle algue ⑥.

### CYCLE DE REPRODUCTION SEXUÉE D'UNE ALGUE



# Les champignons


*Des organismes sans chlorophylle*

Il existe plus de 100 000 espèces de champignons. Ils se caractérisent par leur incapacité à fabriquer leur propre matière organique par photosynthèse : ils dépendent donc d'autres organismes pour se nourrir. Les champignons colonisent tous les milieux. On en retrouve dans l'eau, le sol et l'air. Certains parasitent des plantes, causant des ravages dans les cultures, ou des animaux, provoquant diverses maladies. D'autres sont utilisés dans l'industrie pour faire lever la pâte à pain, produire de la bière, des fromages ou des médicaments comme la pénicilline. Ainsi, continuellement, l'homme tolère, subit ou utilise les champignons.

## LA STRUCTURE D'UN CHAMPIGNON

L'anatomie des champignons est très variée, des spécimens microscopiques aux grands champignons comestibles. Quelques rares champignons sont formés d'une seule et unique cellule. C'est le cas des levures. Mais la plupart sont composés de nombreuses cellules alignées sous forme de filaments, les hyphes. L'assemblage des hyphes compose le mycélium. Le mycélium est la plupart du temps souterrain. Au moment de la reproduction, il arrive que le mycélium se développe hors de la terre pour former un pied et un chapeau. Cette structure est appelée communément champignon.

Les champignons sont incapables de fabriquer leur propre nourriture par photosynthèse. Ils sont hétérotrophes : ils dépendent d'autres organismes pour se nourrir. Les champignons peuvent être saprophytes (ils s'alimentent de substances organiques en décomposition), parasites ou symbiotiques (ils vivent associés à d'autres organismes, notamment des plantes).



## DE DANGEREUX POISONS

Beaucoup de champignons sont comestibles, comme l'orange vraie, mais de nombreux autres sont vénéneux. Ils contiennent un poison dont le contact ou l'ingestion provoque chez l'homme des troubles divers. Dans certains cas, ces atteintes sont si graves qu'elles entraînent la mort.

### CHAMPIGNON COMESTIBLE



L'**orange vraie** est un champignon comestible. Ses lamelles jaunes permettent de la distinguer de la fausse orange, vénéneuse, dont les lamelles sont blanches.

### CHAMPIGNON VÉNÉNEUX



La **fausse orange**, ou amanite tue-mouches, est un champignon vénéneux dont le chapeau orangé est couvert de verrues blanches. Son poison attaque surtout le système nerveux, provoquant notamment des hallucinations.

### CHAMPIGNON MORTEL




L'**amanite vireuse** est un beau champignon blanc et élancé, mais c'est une espèce extrêmement vénéneuse. Elle dégage une odeur désagréable. Son poison, souvent mortel, agit à retardement et attaque principalement le foie.

## LA REPRODUCTION DES CHAMPIGNONS

Le sporophore ❶, composé d'un pied et d'un chapeau, est la forme du champignon capable de produire des cellules reproductrices appelées spores. Les lamelles du chapeau libèrent les spores ❷. Les spores germent sous la forme de filaments, les hyphes ❸. La fusion de deux hyphes issues de spores compatibles forme une hyphe unique ❹. L'hyphe se ramifie très rapidement. Ses ramifications s'enchevêtrent pour former le mycélium ❺. Au moment de la reproduction, le mycélium s'organise, se compacte et commence à sortir de terre ❻. Peu à peu, il se développe sous la forme d'un pied et d'un chapeau, silhouette bien connue du champignon ❼.

### CYCLE DE REPRODUCTION SEXUÉE D'UN CHAMPIGNON




# Les lichens

## *La symbiose d'une algue et d'un champignon*

Les lichens sont formés par l'association d'une algue et d'un champignon. Les deux partenaires bénéficient de cette association : ils vivent en symbiose. L'algue, grâce à la chlorophylle qu'elle contient, fabrique la matière organique nécessaire aux deux partenaires. Quant au champignon, il approvisionne le couple en eau et en sels minéraux. Les lichens sont capables de supporter des conditions climatiques extrêmes. Certaines espèces poussent dans les régions arides, d'autres en bord de mer ou encore dans les régions polaires.

### LA STRUCTURE D'UN LICHEN

L'algue et le champignon formant un lichen sont intimement liés. Bien souvent, les filaments du champignon s'entrelacent autour des cellules de l'algue et y pénètrent par endroits pour y puiser de la nourriture. Les lichens peuvent survivre à des sécheresses prolongées et à de grands écarts de température, mais leur croissance est très lente, de l'ordre de quelques millimètres par an. Ils se reproduisent par fragmentation du thalle ou par reproduction sexuée. Dans ce cas, l'appareil sexuel du champignon libère des spores qui germent et donnent naissance à un nouveau champignon. Ce dernier devra rencontrer une algue partenaire pour former un nouveau lichen.




## LES TYPES DE LICHENS

Il existe plus de 20 000 espèces de lichens, qui vivent à même le sol, sur les troncs d'arbres ou les roches. On distingue trois types de lichens selon la forme de leur thalle : les lichens crustacés, foliacés et fruticuleux.



Le thalle des **lichens fruticuleux** prend l'aspect d'un petit arbre qui n'est fixé que par un petit point de contact.




Les **lichens crustacés** forment une croûte qui colle fortement à son substrat.



Les **lichens foliacés** présentent un thalle en forme de feuilles ou de lames qui adhère peu à son support et s'en sépare facilement.

## DES VÉGÉTAUX UTILES

Ayant une croissance très lente et une longue durée de vie, les lichens permettent de dater les surfaces rocheuses sur lesquelles ils poussent. Ils sont aussi très utilisés comme indicateurs de pollution. Les lichens ont en effet la faculté d'emmagasinier des composés minéraux, y compris des substances polluantes. L'accumulation de composés toxiques dans le lichen entraîne sa mort, ce qui signale une pollution. De nombreux lichens sont consommés par les animaux, voire par l'humain. D'autres servent à la fabrication de colorants et de parfums.



La croissance des lichens crustacés du genre ***Rhizocarpon*** est extrêmement lente, de l'ordre de quelques centièmes de millimètres par an.



Le lichen fruticuleux ***Letharia vulpina*** renferme un pigment jaune vif, l'acide vulpinique, autrefois utilisé comme colorant.



Dans les régions arctiques, la **cladonie des rennes** fait le régal des cervidés et des populations humaines locales.


# Les mousses

*Les végétaux des zones humides*

Les mousses sont des plantes chlorophylliennes de petite taille qui poussent dans les forêts humides et les régions marécageuses. Elles se développent en touffes serrées et étendues qui forment de véritables tapis moelleux. Les mousses sont parmi les premières plantes apparues sur la terre ferme. Comme leurs ancêtres les algues, elles restent dépendantes de l'eau à plusieurs égards, notamment pour leur reproduction.

## LA STRUCTURE D'UNE MOUSSE

Les mousses possèdent des feuilles et des tiges primitives. Les feuilles contiennent de la chlorophylle qui permet à la mousse de fabriquer sa propre nourriture par photosynthèse. Contrairement aux plantes plus évoluées, les mousses n'ont pas de racines ni de tissus spécialisés dans le transport de l'eau et des substances nutritives. Elles se nourrissent en absorbant l'eau et les sels minéraux directement par leurs tiges, leurs feuilles et leurs rhizoïdes. Les mousses ne possèdent pas de fleurs.



## EXEMPLES DE MOUSSES

Il existe environ 15 000 espèces de mousses. On les trouve habituellement sur les sols humides, les rochers ou les troncs d'arbres, et parfois en eau douce.



La **sphaigne** pousse dans des zones marécageuses. Elle contient beaucoup d'eau et sa décomposition contribue à la formation de la tourbe.




Le **polytrich commun** vit en touffes, le plus souvent sur le sol des forêts. Ses soies dressées peuvent atteindre 10 cm de hauteur.

## LA REPRODUCTION DES MOUSSES

Les mousses peuvent se reproduire de manière asexuée, par simple fragmentation de la tige, qui conduit à la formation de touffes fournies de mousses. La reproduction sexuée fait quant à elle intervenir des cellules spécialisées, les spores. À maturité, la capsule libère des spores ❶ de deux types. Les spores tombent sur le sol et germent ❷. La germination des spores aboutit à la formation de tiges feuillées, les gamétophytes ❸, capables de produire des cellules sexuelles, les gamètes. Transportés par l'eau de pluie ou de rosée, les gamètes mâles passent du gamétophyte mâle au gamétophyte femelle ❹. La fécondation, c'est-à-dire la fusion des gamètes, donne naissance à un zygote ❺. Cette cellule unique, positionnée au sommet du gamétophyte femelle, se multiplie pour former un nouveau sporophyte ❻.

### CYCLE DE REPRODUCTION SEXUÉE D'UNE MOUSSE



# Les fougères

*Les plantes des sous-bois*

Les fougères sont des plantes sans fleurs qui vivent dans des milieux humides et ombragés, pour la plupart dans les forêts tropicales. Elles sont apparues sur Terre il y a quelque 360 millions d'années, au début de la période carbonifère. Les fougères d'alors, bien souvent arborescentes, côtoyaient d'autres plantes vasculaires dans des forêts denses et marécageuses. L'enfouissement et la décomposition des plantes du carbonifère ont conduit à la formation de gisements de combustibles fossiles, comme le charbon.

## LA STRUCTURE D'UNE FOUGÈRE

Les fougères sont constituées d'organes nettement différenciés. La tige, fréquemment souterraine et renflée, forme un rhizome. Contrairement aux plantes plus primitives, comme les mousses, les fougères possèdent de véritables racines. Les feuilles, grandes, vertes et très divisées, sont appelées frondes. Les fougères sont des végétaux vasculaires, c'est-à-dire qu'elles possèdent des vaisseaux capables d'assurer le transport de l'eau et des substances nutritives à travers la plante.



## EXEMPLES DE FOUGÈRES

Il existe environ 9 500 espèces de fougères, dont la taille varie de quelques millimètres à plusieurs mètres.



Le **tronc** de la fougère est constitué d'un rhizome vertical recouvert par la base des anciennes frondes.



Les frondes de la **fougère nid d'oiseau** forment une rosette autour d'un rhizome central, d'où son nom.




Les frondes du **polypode commun** atteignent 30 cm de longueur.

Certaines fougères ressemblent à de véritables arbres. Ce sont des **fougères arborescentes**. Pouvant atteindre 20 m de hauteur, elles vivent surtout dans les régions tropicales.

## LA REPRODUCTION DES FOUGÈRES

Les fougères se reproduisent fréquemment de manière asexuée : le rhizome s'allonge horizontalement sous terre et de nouvelles feuilles en émergent. Les fougères se reproduisent aussi de façon sexuée. Lorsqu'elle est au stade sporophyte, la fougère ① porte sous ses frondes des sores formés par l'agglomération d'organes appelés sporanges ②. Les sporanges sont capables de produire et de libérer des spores ③. Une fois tombée au sol, une spore germe ④ et forme progressivement un gamétophyte. Le gamétophyte ⑤ est l'organe producteur de cellules sexuelles, les gamètes. Sur sa face inférieure, le gamétophyte produit des œufs (gamètes femelles) et des spermatozoïdes (gamètes mâles). La fécondation, c'est-à-dire la fusion des gamètes ⑥, nécessite de l'eau, dans laquelle les spermatozoïdes, munis de flagelles, nagent à la rencontre d'un œuf. La fécondation donne naissance à une nouvelle fougère ⑦. Dans un premier temps, la jeune fougère reste attachée au gamétophyte. Celui-ci dégénérera lors de la formation du rhizome.

### CYCLE DE REPRODUCTION D'UNE FOUGÈRE




# Les conifères

*Les premiers arbres*

Les conifères sont de grands arbres qui s'accommodent bien des sols pauvres et des climats rigoureux. Ils composent notamment des forêts denses en montagne et dans les régions froides, comme en Europe, en Sibérie et en Amérique du Nord. Il en existe 600 espèces. Le pin, l'épicéa (épinette) et le sapin fournissent une grande partie des bois tendres utilisés en construction, car leur croissance rapide et leurs troncs longs et droits facilitent la production de bois d'œuvre.

## LA STRUCTURE D'UN CONIFÈRE

Les conifères sont généralement de grands arbres. Les plus grands peuvent atteindre 100 m de hauteur et les plus volumineux, jusqu'à 10 m de diamètre. Leurs feuilles présentent des adaptations à la sécheresse : elles sont étroites et dures, formant des aiguilles ou des écailles. Les feuilles sont généralement persistantes : elles restent sur l'arbre de trois à quatre ans avant de tomber, si bien que les conifères sont toujours verts. Le mélèze fait exception à la règle : chaque automne, toutes ses feuilles tombent. Plusieurs espèces de conifères, dont l'épicéa (épinette), possèdent des racines traçantes, déployées près de la surface du sol, ce qui leur permet de survivre dans des sols minces. La plupart des conifères sécrètent un produit collant et visqueux, la résine, qui protège l'arbre des insectes et des champignons.




## EXEMPLES DE CONIFÈRES

Si nombre de conifères sont de grands arbres adaptés aux régions froides, certains sont de taille modeste ou vivent dans des régions au climat chaud et sec.



Contrairement à la plupart des conifères, le **genévrier** est un petit arbre. Selon les espèces, sa taille varie de 1,5 m à 15 m de hauteur.


Le **cèdre du Liban**, au sommet large et aplati, est originaire du Proche-Orient, soumis au climat méditerranéen.



## LA REPRODUCTION DES CONIFÈRES


Les organes reproducteurs des conifères ont la forme de cônes. Les cônes mâles et femelles ❶ se développent sur les rameaux d'un même arbre. Les cônes mâles produisent de grandes quantités de grains de pollen ❷, les structures reproductives mâles de la plante. Les ovules ❸, structures reproductives femelles, sont portés par les écailles des cônes femelles. La fécondation de l'ovule par un grain de pollen produit une graine ❹, qui demeure sur le cône femelle jusqu'à maturité. Pendant la maturation des graines, le cône femelle durcit. À maturité, ses écailles s'écartent et les graines sont dispersées par le vent ❺. La graine germe pour former une plantule ❻. La plantule devient une plante lorsque les premières feuilles apparaissent ❼.


### CYCLE DE REPRODUCTION D'UN CONIFÈRE





Du rosier à l'acacia en passant par la vigne et le lilas, plus de 234 000 espèces de plantes à fleurs peuplent notre planète. Toutes différentes les unes des autres, elles ont en commun de posséder des organes très différenciés. **La fleur, souvent colorée et parfumée**, est l'organe de la reproduction, tandis que les racines, les tiges et les feuilles participent à la nutrition et à la croissance de la plante. Ces organes prennent **des formes très variées** et parfois trompeuses, comme les faux pétales de la fleur de tournesol.





# Les plantes à fleurs

26 **L'anatomie des plantes à fleurs**  
*Des organes très différenciés*

30 **La racine**  
*Un réseau de pompage souterrain*

34 **La tige**  
*L'axe principal de la plante*

37 **La feuille**  
*Le capteur de lumière*

40 **La fleur**  
*L'organe de la reproduction*

44 **Les inflorescences**  
*Des arrangements floraux*

46 **Les arbres**  
*Des végétaux faits de bois*


# L'anatomie des plantes à fleurs

*Des organes très différenciés*

Les plantes à fleurs sont les plus nombreuses et les plus évoluées du règne végétal. Il en existe environ 234 000 espèces, réparties en quelque 300 familles. La diversité des plantes à fleurs est telle qu'elles ont colonisé tous les milieux, des cactus des zones arides aux nénuphars des étangs marécageux, et du blé des prairies aux fleurs estivales des régions polaires. Malgré cette diversité, l'anatomie des plantes à fleurs, c'est-à-dire leur structure, est similaire d'une plante à l'autre.

## LA STRUCTURE D'UNE PLANTE À FLEURS

Les plantes à fleurs se distinguent des autres végétaux par le fait qu'elles se reproduisent grâce à des fleurs. La fleur est l'appareil reproducteur le plus complexe du règne végétal. Le reste de la plante est composé de tiges, de feuilles et de racines (appareil végétatif). Ces organes sont formés de tissus différenciés : un tissu différencié possède certains types de cellules et une organisation particulière qui lui permettent de remplir une fonction spécifique dans la plante. Par exemple, le tissu du bourgeon terminal, au sommet de la tige, est spécialisé dans la croissance en hauteur. Les plantes à fleurs possèdent des tissus dont les cellules allongées en forme de vaisseaux sont spécialisées dans le transport des substances nutritives dans la plante.




## PLANTES HERBACÉES ET PLANTES LIGNEUSES

De nombreuses plantes à fleurs possèdent des tissus imprégnés de lignine, une substance qui leur confère une grande rigidité. Ces végétaux sont dits ligneux. Le tissu le plus riche en lignine est le bois, caractéristique des arbres. La tige et les branches rigides des plantes ligneuses jouent un rôle de soutien permettant à ces plantes de croître jusqu'à des tailles considérables.

Les plantes herbacées, au contraire, contiennent peu ou pas de lignine et sont flexibles. Elles ont une durée de vie généralement courte, souvent de un ou deux ans. Certaines cependant survivent plus longtemps : elles sont vivaces. Leurs organes aériens dégénèrent à l'automne et repoussent au printemps suivant à partir d'organes souterrains (racine, rhizome, bulbe...).

Très différentes en apparence, les plantes herbacées et ligneuses présentent pourtant les mêmes organes principaux : les racines, la tige, les feuilles et les fleurs.











PLANTE À FLEURS HERBACÉE









PLANTE À FLEURS LIGNEUSE

L'anatomie des plantes à fleurs

MONOCOTYLÉDONES ET DICOTYLÉDONES


On distingue habituellement deux classes de plantes à fleurs : les monocotylédones et les dicotylédones. Ces deux groupes présentent de nombreux caractères distinctifs. La graine des monocotylédones ne possède qu'une seule feuille embryonnaire (cotylédon), contre deux chez les dicotylédones. Les monocotylédones sont généralement des plantes herbacées, comme les céréales, les tulipes et les orchidées. Quelques espèces sont arborescentes : le palmier, par exemple, n'est pas un arbre, car il ne contient pas de bois, mais sa forme et sa taille lui donnent l'aspect d'un arbre. Plus des trois quarts des plantes à fleurs sont des dicotylédones. Cet ensemble regroupe de nombreuses espèces herbacées et la quasi-totalité des arbres.

MONOCOTYLÉDONES	EXEMPLES DE MONOCOTYLÉDONES
 <p>plantes herbacées, parfois arborescentes</p>	   <p>tulipe</p> <p>palmier</p> <p>avoine</p>
 <p>embryon à un cotylédon</p> <p>cotylédon</p>	
 <p>feuilles à nervures parallèles</p> <p>nervure</p>	
 <p>vaisseaux conducteurs de sève disposés sur deux cercles ou sans disposition définie</p> <p>vaisseaux</p>	
 <p>système racinaire entièrement ramifié</p>	

DICOTYLÉDONES	EXEMPLES DE DICOTYLÉDONES
 <p>plantes herbacées et ligneuses (arbres)</p>	   <p>chêne</p> <p>origan</p> <p>saule</p>
 <p>embryon à deux cotylédons</p> <p>cotylédons</p>	
 <p>feuilles à nervures ramifiées</p> <p>nervure</p>	
 <p>vaisseaux conducteurs de sève disposés en cercle</p> <p>vaisseaux</p>	
 <p>racine principale persistante</p> <p>racine principale</p>	

## LE CYCLE DE REPRODUCTION DES PLANTES À FLEURS

Le cycle de reproduction des plantes à fleurs se décompose en six étapes principales. Les fleurs ❶ portent les organes reproducteurs de la plante, qui produisent des grains de pollen et des ovules. Lors de la pollinisation ❷, les grains de pollen sont transportés, par le vent ou un insecte pollinisateur, d'une étamine au sommet du pistil, organe qui surmonte les ovaires. Le grain de pollen germe dans le pistil : il forme un tube pollinique qui s'allonge dans le pistil, pénètre dans l'ovaire et permet la fécondation de l'ovule ❸. L'ovule fécondé forme une graine. La maturation de l'ovaire conduit à la formation d'un fruit ❹ dans lequel les graines sont enfermées. Le fruit se détache de la plante mère, s'ouvre et dissémine les graines qu'il contient ❺. La germination d'une graine ❻ forme une plantule, qui se développe pour devenir une plante.



# La racine

*Un réseau de pompage souterrain*


La racine est un organe ramifié qui assure la fixation de la plante dans le sol et qui lui permet d'y puiser les substances nutritives nécessaires à son développement. Elle remplit parfois d'autres fonctions, comme la mise en réserve de substances nutritives et le support mécanique de la plante.

## LE SYSTÈME RACINAIRE


L'ensemble des racines d'une plante constitue son système racinaire. Chez la plupart des plantes à fleurs et chez les conifères, le système racinaire est pivotant, c'est-à-dire que la racine principale, issue de la germination de la graine, est persistante. Elle constitue un pivot qui porte des ramifications appelées racines latérales. Les racines latérales possèdent les mêmes caractéristiques que la racine principale. Les ramifications les plus fines s'appellent des radicelles.

Chez certaines espèces, cependant, la racine principale de la jeune plante dégénère rapidement. Elle est remplacée par des racines ramifiées issues de la base de la tige (racines adventives), qui forment un système racinaire fasciculé. La ramification du système racinaire permet d'améliorer l'ancrage de la plante dans le sol et l'accès aux nappes phréatiques.

### SYSTÈME RACINAIRE PIVOTANT



### SYSTÈME RACINAIRE FASCICULÉ



## L'ABSORPTION RACINAIRE

L'absorption de l'eau et des sels minéraux est réalisée par les poils absorbants. Ces minuscules filaments de quelques millimètres de longueur sont concentrés près de l'extrémité des radicelles. On en compte parfois plusieurs centaines par millimètre carré. Leur superficie cumulée constitue une gigantesque surface d'absorption.

Les racines latérales émanent de la **zone de ramification**.

La **zone pilifère**, où se développent les poils absorbants, mesure quelques centimètres de longueur. Sa longueur est constante, car les poils dégénèrent au bout de quelques jours, à mesure que de nouveaux poils se forment du côté de l'extrémité de la racine.

Dans la **zone de croissance**, les nouvelles cellules produites par le point végétatif s'allongent et se différencient en tissus spécialisés.



### racine latérale


Les **poils absorbants** sont des cellules allongées qui assurent l'absorption de l'eau et des sels minéraux.

L'extrémité de la racine, appelée **point végétatif**, est constituée de cellules en division constante. Elle est recouverte d'une coiffe.

La **coiffe** désigne l'enveloppe protectrice recouvrant le point végétatif; elle protège l'extrémité de la racine contre les frottements lorsqu'elle s'enfonce dans le sol.

## LA CROISSANCE DE LA RACINE

La croissance des racines en longueur résulte de la production continue de nouvelles cellules par le point végétatif, situé à l'extrémité des racicules. Les racines de nombreuses plantes à fleurs peuvent aussi croître en largeur grâce au fonctionnement d'un tissu spécialisé appelé cambium. Le cambium produit chaque année des vaisseaux conducteurs de sève (xylème et phloème) qui se juxtaposent aux vaisseaux de l'année précédente et provoquent l'élargissement de la racine.



## La racine


### LES FONCTIONS DES RACINES

Une racine est généralement souterraine et elle pousse vers le bas. Ses principales fonctions sont de fixer la plante dans le sol et d'y absorber de l'eau et des sels minéraux. Cependant, très fréquemment, les racines présentent d'importantes modifications de structures. Ces racines modifiées remplissent des rôles variés dans la plante.

#### SUPPORT MÉCANIQUE


Les plantes déploient parfois des racines aériennes qui servent d'appui ou de point d'ancrage sur un support. Les racines-piliers, par exemple, se forment sur les branches de certains arbres tropicaux et plongent vers le sol pour s'y fixer; elles forment alors des piliers qui soutiennent les branches. Les racines-contreforts et les racines-échasses consolident aussi la tige ou le tronc de certaines plantes (ficus tropical, maïs). D'autres types de racines, généralement de petite taille, permettent aux plantes de s'accrocher à un support, comme les racines-crampons du lierre.

Les **racines-contreforts** jouent un rôle de soutien. Ces énormes racines aériennes se confondent avec le tronc et ne s'enfoncent que de quelques dizaines de centimètres sous terre.



Le **ficus tropical** est capable de pousser sur des sols peu profonds, étayé par des racines-contreforts.


L'absorption est réalisée par de fines **racines souterraines** qui s'immiscent dans la roche mère du sol.




Le pied de **maïs** est stabilisé par des racines aériennes issues des nœuds inférieurs de la tige, appelées racines-échasses.

Les **racines aériennes** des nœuds les plus hauts dégénèrent à mesure que la plante croît.

**racine-échasse**



Le lierre possède le long de sa tige des **racines-crampons**, de petites racines aériennes qui adhèrent à un support.



Le **lierre** est une plante grimpante : il pousse sur le mur des maisons ou sur le tronc des arbres.

## RÉSERVES

De nombreuses plantes emmagasinent de l'amidon et d'autres sucres dans leurs racines. Les organes gonflés de réserves nutritives constituent des tubercules. Bien des légumes, comme le salsifis, la carotte ou la betterave à sucre, sont des tubercules de racines. Certaines plantes des milieux secs possèdent, quant à elles, des racines gorgées de réserves d'eau, qui leur permettent de survivre pendant une longue période de sécheresse.

La coriandre possède une **racine principale tubéreuse**.



La **coriandre** est une plante aromatique dont les feuilles s'utilisent comme le persil et les racines, comme l'ail.


## NUTRITION ET RESPIRATION

Les racines participent parfois à la nutrition et à la respiration de la plante. Par exemple, de nombreux arbres abritent des champignons microscopiques dans leur système racinaire : les champignons facilitent l'absorption de l'eau et des sels minéraux, et ils bénéficient des matières organiques fabriquées par la plante. Certaines racines aériennes contiennent de la chlorophylle dans leur écorce, ce qui leur permet de fabriquer de la matière organique, rôle habituellement dévolu aux feuilles. Les plantes légumineuses, quant à elles, s'alimentent en azote grâce à des bactéries associées à leurs racines. Enfin, certaines espèces des zones inondées respirent grâce à leurs racines modifiées.



Les racines des légumineuses comme le **soja** comportent fréquemment des nodosités.


Les **nodosités** sont de petites excroissances provoquées par la prolifération de bactéries capables de fixer l'azote de l'atmosphère. Elles contribuent à la nutrition azotée de la plante.



Dans les sols marécageux mal aérés, les racines s'alimentent en oxygène grâce à des ramifications qui poussent verticalement hors de la vase, appelées **pneumatophores**.



Les pneumatophores des **palétuviers** de la mangrove facilitent la respiration des cellules du système racinaire.




# La tige

*L'axe principal de la plante*

La tige est l'organe principal de la plante. Elle est constituée de tissus différenciés qui lui permettent de remplir trois fonctions principales : le soutien des branches, des feuilles et des fleurs, le transport de la sève et la croissance de la plante. Les tiges sont de types très variés : elles peuvent être aériennes ou souterraines, dressées ou rampantes, lisses, velues, crénelées ou encore épineuses. Les plantes herbacées possèdent des tiges souples, généralement vertes. Les arbres, en revanche, sont des plantes ligneuses : leurs tiges et leurs branches, rigides, sont constituées d'un tissu très riche en lignine, le bois.


## LA STRUCTURE DE LA TIGE

On distingue deux parties dans la tige : l'écorce et le cylindre central. L'écorce comprend la cuticule (une enveloppe cireuse qui protège la tige), l'épiderme (la couche cellulaire la plus externe de la tige) et le parenchyme cortical, dont les cellules, souvent riches en chlorophylle, participent à la nutrition de la plante par photosynthèse. L'écorce protège le cylindre central, composé de la moelle et de vaisseaux conducteurs de sève (xylème et phloème).




## LA DISPOSITION DES VAISSEAUX CONDUCTEURS DE SÈVE

La disposition des vaisseaux conducteurs de sève varie selon le type de plantes.



vaisseaux  
conducteurs  
de sève

Les vaisseaux conducteurs de sève des **dicotylédones** (la majorité des plantes à fleurs, notamment les arbres) sont disposés sur un cercle.




vaisseaux  
conducteurs  
de sève

Les vaisseaux conducteurs de sève des **monocotylédones** (plantes à fleurs généralement herbacées, comme le blé ou les orchidées) sont dispersés dans la tige ou disposés sur deux cercles concentriques.

## LES TIGES SOUTERRAINES

Les tiges souterraines sont des tiges modifiées qui poussent dans le sol. Elles sont très différentes des racines, tant dans leurs structures que dans leurs fonctions. Par exemple, contrairement aux racines, les tiges souterraines ne participent pas à l'assimilation de l'eau et des sels minéraux du sol. Les tiges souterraines remplissent deux rôles principaux : l'accumulation de réserves nutritives et la propagation de la plante par multiplication végétative (reproduction par fragmentation de la plante, sans intervention de cellules sexuelles). Les principaux types de tiges souterraines sont les rhizomes, les tubercules et les bulbes.


### RHIZOME



rhizome

Les rhizomes, tiges souterraines gonflées de réserves nutritives, se rencontrent chez de nombreuses espèces, comme le **gingembre**.


### TUBERCULE



tubercule de tige

Un tubercule est un organe souterrain renflé par l'accumulation de réserves nutritives. Un même plant de **pommes de terre** possède de nombreux tubercules de tige.

### BULBE FEUILLÉ



L'**oignon** est un bulbe feuillé, formé par la superposition de feuilles chargées de réserves nutritives enveloppant complètement la tige, très réduite.

bulbe feuillé

### BULBE SOLIDE



Les bulbes solides, comme celui du **crocus**, sont formés par une tige souterraine courte gonflée de réserves nutritives, enveloppée dans les restes desséchés des premières feuilles.

bulbe solide

## LES TIGES AÉRIENNES MODIFIÉES

Les tiges aériennes présentent de multiples adaptations qui leur permettent de remplir différentes fonctions dans la plante. La tige des plantes herbacées renferme fréquemment de la chlorophylle qui lui permet de participer à la nutrition de la plante par photosynthèse. Certaines tiges assument même entièrement ce rôle lorsque les feuilles sont déficientes : c'est le cas des tiges de cactus. Les tiges des plantes grimpantes ont une fonction de soutien : elles sont capables de graver un support comme un mur, une treille ou encore un tronc d'arbre.


### TIGE SUCCULENTE



Les réserves d'eau contenues dans la tige succulente du **cactus saguaro géant** lui permettent de survivre pendant de longues périodes de sécheresse.

tige succulente

### TIGE ÉPINEUSE



La tige épineuse du **rosier** dissuade les animaux de manger cette plante.

tige épineuse

### VRILLE




vrille

La **vigne** est une plante grimpante. Sa tige présente des excroissances spiralées, les vrilles, qui permettent au rameau de s'accrocher sur un support.

Le stolon du **fraisier** est une tige mince qui pousse horizontalement à la surface du sol. Des racines peuvent se développer au niveau des nœuds du stolon et permettre le développement d'un nouveau plant. Les stolons jouent ainsi un rôle dans la reproduction végétative de la plante.

### STOLON




stolon

# La feuille

## Le capteur de lumière

La feuille est un organe généralement vert et aérien. Elle renferme de grandes quantités de chlorophylle, un pigment qui lui permet de capter l'énergie lumineuse et de l'utiliser pour produire des sucres par photosynthèse. La morphologie des feuilles, très variée, présente fréquemment des adaptations aux contraintes du milieu de vie de la plante.



### LA STRUCTURE D'UNE FEUILLE

La feuille est rattachée à la tige par sa partie la plus étroite, le pétiole. La partie de la feuille la plus large s'appelle le limbe. Généralement mince et plat, le limbe est parcouru par un réseau de nervures qui lui donne sa souplesse et sa résistance et qui transporte la sève dans la feuille. L'intérieur de la feuille, appelé mésophylle, est composé de couches de cellules riches en chlorophylle, les parenchymes palissadique et lacuneux, spécialisés dans la fabrication de matière organique par photosynthèse.

L'**épiderme**, composé de cellules accolées les unes aux autres, constitue une barrière entre l'intérieur de la feuille et le milieu extérieur.

Le **collenchyme** est un tissu de soutien qui longe les vaisseaux conducteurs.

Les **stomates** sont de petits orifices qui permettent les échanges gazeux.

La **cuticule** forme un revêtement cireux imperméable qui limite l'évaporation de l'eau.

Les cellules allongées du **parenchyme palissadique** sont riches en chlorophylle et captent efficacement la lumière.

mésophylle

Le **parenchyme lacuneux** est un tissu lâche formé de cellules riches en sucres issus de la photosynthèse, et d'espaces remplis d'air, les lacunes, qui facilitent les échanges gazeux dans la feuille.

Les vaisseaux du **xylème** transportent la sève brute (eau et sels minéraux).

Les vaisseaux du **phloème** conduisent la sève élaborée (sucres produits par photosynthèse).

Les **stomates** sont plus nombreux sur la face inférieure de la feuille.

Une enveloppe cellulaire, appelée **gaine périvasculaire**, protège les vaisseaux conducteurs. L'ensemble forme une nervure.

# La feuille

## DES FEUILLES ADAPTÉES AU MILIEU

La disposition et la forme des feuilles diffèrent selon le milieu de vie de la plante. Ces adaptations sont innombrables. Les plantes qui poussent à l'ombre possèdent généralement des feuilles plus grandes pour capter plus de lumière, tandis que les plantes carnivores disposent de feuilles transformées en pièges pour capturer des insectes.



Les **cactus**, adaptés aux milieux secs, possèdent fréquemment des feuilles réduites à l'état d'épines, ce qui limite les pertes d'eau par évaporation.



Les feuilles du **nymphéa** ont peu de stomates et ceux-ci sont disposés sur la face émergée de façon à optimiser les échanges gazeux.


## LA NERVATION ET LE BORD DES FEUILLES

La nervation d'une feuille désigne la disposition du réseau de nervures dans le limbe. Le bord des feuilles peut prendre des aspects très divers, selon la forme et la profondeur des découpures. L'étude de la nervation et du bord d'une feuille est souvent nécessaire pour identifier l'espèce à laquelle la feuille appartient.

### LES TYPES DE NERVATIONS D'UNE FEUILLE


#### feuille penninerve

Le limbe porte une nervure principale médiane et des nervures secondaires disposées régulièrement de chaque côté.




#### feuille uninerve

Le limbe, étroit, est parcouru par une seule nervure.




#### feuille parallélinerve

Le limbe, généralement allongé, est parcouru de nervures parallèles les unes aux autres.



#### feuille palmitinerve

Le pétiole se divise en un nombre impair de nervures, toutes divergentes à partir d'un même point.



### LES TYPES DE BORDS D'UNE FEUILLE

#### entier

Bord d'une feuille ne présentant aucune découpure.



#### lobé

Bord d'une feuille découpé par de profondes échancrures.



#### denté

Bord d'une feuille pourvu de dents pointues de taille similaire.



#### crénelé

Bord d'une feuille pourvu de dents au sommet arrondi.



#### cilié

Bord d'une feuille entouré de poils courts et minces appelés cils.



#### doublement denté


Bord d'une feuille pourvu de dents de différentes tailles.



## FEUILLES SIMPLES ET FEUILLES COMPOSÉES

Les feuilles dont le limbe n'est pas divisé en parties indépendantes sont appelées feuilles simples. Il en existe de nombreux types classés selon la forme du limbe. Les feuilles composées, au contraire, possèdent un limbe divisé en parties distinctes, les folioles. On distingue plusieurs types de feuilles composées selon la disposition des folioles.

### LES TYPES DE FEUILLES SIMPLES



**cordée**

Le limbe prend la forme d'un cœur.



**réniforme**

La forme du limbe rappelle celle d'un rein.



**arrondie**

Le limbe prend une forme plus ou moins arrondie.



**ovoïde**

Le limbe prend la forme d'un œuf.



**lancéolée**

Le limbe étroit, plus long que large, se termine en forme de pointe.



**hastée**

Le limbe prend la forme d'un fer de lance.




**spatulée**

Le limbe s'élargit pour prendre la forme d'une spatule.



**peltée**


Le pétiole est fixé perpendiculairement au milieu de la face inférieure du limbe.



**linéaire**

Le limbe, long et très étroit, possède des bords presque parallèles.


### LES TYPES DE FEUILLES COMPOSÉES



**foliole**

**trifoliée**

Le limbe est composé de trois folioles distinctes.



**imparipennée**

Le pétiole principal d'une feuille pennée se termine par une foliole unique.



**pennée**

Les folioles sont disposées des deux côtés d'un pétiole commun.



**palmée**

Toutes les folioles sont réunies en un même point au sommet du pétiole.



**paripennée**

Le pétiole principal d'une feuille pennée se termine par deux folioles opposées.


# La fleur

## L'organe de la reproduction

La fleur est l'organe caractéristique des plantes à fleurs. Elle résulte de la spécialisation d'un rameau feuillé dans la fonction de reproduction de la plante. La fleur est constituée de pétales, de sépales et d'organes reproducteurs. Elle produit des ovules et des grains de pollen, porteurs des cellules reproductrices de la plante. La fécondation de l'ovule par un grain de pollen conduit à la formation d'une graine, qui se développe enfermée dans un fruit.


### LA STRUCTURE D'UNE FLEUR

Une fleur comporte habituellement des pétales, des sépales et des organes reproducteurs. Cette organisation typique est fréquemment modifiée. Par exemple, la fleur d'ortie est dépourvue de pétales; elle est dite apétale. Chez la majorité des plantes à fleurs, les organes reproducteurs mâles et femelles sont portés par une même fleur (fleur mixte, ou hermaphrodite, comme le lis). Mais chez certaines espèces, il existe des fleurs mâles et des fleurs femelles distinctes. Elles sont portées par un même plant (espèce monoïque, comme le maïs) ou par des plants séparés (espèce dioïque, comme le kiwi). Les fleurs possèdent cependant une caractéristique invariable : les ovules sont toujours enfermés dans un organe creux, l'ovaire. La fécondation de l'ovule conduit à la formation d'une graine et d'un fruit.



## LE DIAGRAMME FLORAL

Les éléments qui constituent la fleur sont appelés pièces florales. On distingue quatre types de pièces florales : les sépales, qui forment le calice, les pétales, qui composent la corolle, et les organes reproducteurs mâles (les étamines) et femelles (les pistils). Les pièces florales sont disposées en cercles concentriques. Un diagramme floral permet de représenter de manière schématique la disposition des pièces florales d'une fleur donnée.



## LA DIVERSITÉ DES FLEURS

On dénombre au total environ 234 000 espèces de plantes à fleurs, soit autant de fleurs différentes. C'est dire l'extrême diversité des fleurs ! Depuis leur apparition, il y a plus de 115 millions d'années, les plantes à fleurs ont colonisé tous les milieux, pour la plupart terrestres, et leurs fleurs se sont adaptées en conséquence.



Les trois sépales et les trois pétales de la **jonquille** (famille des Liliacées), identiques, sont fusionnés et forment un tube qui protège les organes reproducteurs.

Le **coquelicot** (famille des Papavéracées), fleur des champs voisine du pavot, possède des pétales d'un rouge très vif.




Le réceptacle du **chardon** (famille des Astéracées) est recouvert de feuilles modifiées hérissées d'épines.

## La fleur


## LES FAMILLES DE FLEURS

Les 234 000 espèces de plantes à fleurs sont classées selon leurs caractéristiques en quelque 300 familles. Les trois principales familles de plantes à fleurs sont celles des Astéracées, aussi appelées Composées (marguerite), des Orchidacées (orchidée) et des Fabacées (pois), qui totalisent le quart des plantes à fleurs.



pissenlit

Le pissenlit et la marguerite appartiennent à la famille des **Astéracées**, qui regroupe au total plus de 20 000 espèces. Ces fleurs composées sont constituées de dizaines de fleurs très petites serrées les unes contre les autres. Celles du centre sont tubulaires, leurs minuscules pétales étant soudés. Les fleurs de la périphérie sont dites ligulées : elles possèdent des extensions latérales qui forment une couronne de faux pétales.



marguerite



Le pois appartient à la famille des **Fabacées**, ou Légumineuses, la troisième famille la plus vaste, avec plus de 10 000 espèces. La plupart des Fabacées possèdent une corolle papilionnée (en forme de papillon).



Les **Orchidacées** sont parmi les fleurs les plus évoluées. On en compte plus de 15 000 espèces.



Le **labellum** est un pétale en forme de plate-forme colorée très attirant pour les insectes pollinisateurs.



sépal



pétale

## LE PRODUIT DE L'ÉVOLUTION

Au fil de l'évolution, les plantes se sont adaptées aux contraintes de leurs milieux de vie. L'adaptation des fleurs au milieu leur permet de remplir plus efficacement leur fonction de reproduction de la plante. La reproduction nécessite le transport des grains de pollen d'une fleur à l'autre. Ce transport, appelé pollinisation, fait souvent intervenir des insectes. De nombreuses fleurs, comme le lis, se sont adaptées en développant des couleurs vives et des nectars odorants, sucrés et collants, très attirants pour les insectes pollinisateurs. Le degré d'évolution d'une fleur est aussi signalé par le nombre, la forme et la disposition de ses pièces florales. Le bouton d'or, par exemple, a de nombreux exemplaires de chaque type de pièce florale disposés symétriquement. L'orchidée, au contraire, possède deux pétales semblables à ses trois sépales, et un troisième pétale très différent, le labellum. Cette morphologie à symétrie bilatérale caractérise les fleurs les plus évoluées.



Les **lis** (famille des Liliacées) sont des fleurs de grande taille très colorées et généralement très parfumées.



La fleur du **bouton d'or** (famille des Renonculacées) présente une organisation relativement primitive, avec cinq sépales, cinq pétales et des étamines et des pistils en grand nombre.

## LES FLEURS CULTIVÉES


Les fleurs cultivées pour leur beauté sont des fleurs d'ornement. Les roses, les tulipes, les primevères et les orchidées embellissent ainsi les jardins et servent à souligner des occasions spéciales. Les fleurs sont aussi cultivées à des fins alimentaires : certaines fleurs sont directement comestibles (chou-fleur, courgette), d'autres sont cultivées pour produire des épices (crocus). De très nombreuses fleurs entrent dans la composition de préparations médicamenteuses, notamment l'arnica, la violette, la lavande et le coquelicot, ou encore cosmétiques, pour l'élaboration de parfums ou d'huiles essentielles incorporées dans des crèmes et des savons (rose, jasmin, violette, muguet, mimosa, œillet).



La **primevère** est une petite fleur décorative aux teintes diverses qui fleurit tôt au printemps.



Les petites fleurs en forme de clochette du **muguet** sont fréquemment utilisées par les parfumeurs.



La fleur d'**œillet**, très parfumée et de couleurs variées, est parfois portée à la boutonnière lors de cérémonies.



Le safran provient des pistils de **Crocus sativus**, une espèce principalement cultivée en Inde, en Espagne et au Moyen-Orient. Le safran est utilisé pour épicer de nombreux plats comme la bouillabaisse et la paella.



Il existe environ 100 espèces de **tulipes**, de toutes les couleurs. La majorité des bulbes de tulipes sont cultivés aux Pays-Bas.



La **rose** est cultivée en grandes quantités pour sa beauté, son parfum et la variété de ses coloris.



La fleur de **violette** se mange en salade ou sous forme de bonbons. Elle est aussi utilisée en pharmacie, notamment pour ses propriétés anti-inflammatoires.



La fleur de **courgette**, extrêmement périssable, est consommée sautée, en beignet ou farcie.



Originaire d'Amérique du Sud, le **bégonia** est une fleur d'ornement appréciée pour ses couleurs éclatantes.

# Les inflorescences

*Des arrangements floraux*


Les fleurs se présentant de façon isolée, comme la tulipe, sont rares. Elles sont plus souvent regroupées sur la tige ou un rameau de la plante selon une disposition déterminée appelée inflorescence. La croissance de la plante et l'ordre d'apparition des fleurs donnent lieu à différents types d'inflorescences.

## LES INFLORESCENCES INDÉFINIES

Les inflorescences indéfinies sont des inflorescences à croissance monopodiale : l'axe principal s'allonge continuellement et il émet latéralement des fleurs ou des rameaux portant des fleurs. Les fleurs de la base s'ouvrent les premières, celles du sommet les dernières. L'inflorescence indéfinie typique est la grappe, de laquelle dérivent l'épi, l'ombelle, le corymbe, le spadice et le capitule.


### GRAPPE

L'axe principal porte latéralement des fleurs munies de pédoncules de longueur égale.




### ÉPI

L'axe principal porte latéralement des fleurs sans pédoncule.




### OMBELLE

L'axe principal porte latéralement des fleurs munies de pédoncules de longueur égale partant tous du même point.




### CORYMBE

L'axe principal porte latéralement des fleurs munies de pédoncules de longueur inégale se terminant tous à la même hauteur.




## SPADICE

Des fleurs sans pédoncule sont insérées sur un réceptacle commun en forme d'ovale allongé.



## CAPITULE

Des fleurs sans pédoncule sont insérées sur un réceptacle commun en forme de plateau.




## LES INFLORESCENCES DÉFINIES

Les inflorescences définies sont des inflorescences à croissance sympodiale : l'axe principal se termine par un bourgeon floral qui fleurit en premier, les autres fleurs apparaissant ensuite sur des rameaux secondaires. L'inflorescence définie typique est la cyme, unipare ou bipare.


### CYME UNIPARE

L'axe principal se termine par une fleur, sous laquelle naît un seul rameau latéral. Le processus se répète sous chaque fleur terminale.



### CYME BIPARE

L'axe principal se termine par une fleur, sous laquelle naissent deux rameaux latéraux. Le processus recommence sous chaque fleur terminale.




# Les arbres

*Des végétaux faits de bois*

Les arbres sont des végétaux de grande taille qui renferment du bois, un tissu imprégné d'une substance qui le rigidifie, la lignine. Quelques espèces d'arbres sont des conifères, comme le sapin, mais la plupart appartiennent au groupe des plantes à fleurs, comme le chêne. On distingue les arbres à feuilles caduques, nus en hiver, des arbres à feuilles persistantes, toujours verts.

## LA STRUCTURE D'UN ARBRE

Un arbre est formé d'une partie souterraine, les racines, et de deux parties aériennes, le tronc et le houppier. Le tronc est une tige unique, ligneuse, qui ne se ramifie en branches qu'à partir d'une certaine hauteur. Les branches, ligneuses elles aussi, se ramifient progressivement en rameaux et ramilles, formant un ensemble appelé la ramure. La ramure porte le feuillage, composé de l'ensemble des feuilles de l'arbre.



## LE PORT D'UN ARBRE

Le port d'un arbre désigne sa silhouette générale. Il dépend de l'espèce et de l'âge de l'arbre, mais il est aussi grandement influencé par les conditions de croissance. Par exemple, les arbres qui poussent serrés les uns contre les autres dans une forêt dense possèdent peu de branches basses, faute de lumière. Parmi les principaux ports d'arbres naturels, on distingue les ports colonnaire, ovoïde, conique et pleureur.



**PORT COLONNAIRE**

La forme presque cylindrique est due à des branches courtes et minces.



**PORT OVOÏDE**

Les rameaux du milieu de la tige sont bien développés.



**PORT CONIQUE**

Caractéristique de nombreux conifères, il rappelle la forme d'une pyramide.



**PORT PLEUREUR**

Les rameaux commencent à croître vers le haut puis retombent.

## LES ARBRES À FEUILLES CADUQUES

Dans les régions tempérées, la végétation est soumise à l'alternance des saisons. Les arbres à feuilles caduques sont adaptés à ce rythme saisonnier : ils perdent toutes leurs feuilles en automne, en l'espace de quelques semaines. Ils passent l'hiver les branches nues, jusqu'à la pousse de nouvelles feuilles au printemps.



### ÉTÉ

L'abondance de lumière, d'eau et de chaleur favorise la croissance.



### AUTOMNE

La diminution de la durée du jour et la baisse des températures provoquent la chute des feuilles.



### PRINTEMPS

L'allongement de la durée du jour déclenche l'éclosion des bourgeons.




### HIVER

Le faible ensoleillement et le gel de l'eau bloquent la croissance.


## Les arbres

## LE MÉCANISME DE LA CHUTE DES FEUILLES


À l'approche de la saison défavorable à leur croissance, les arbres se défont de leurs feuilles et entament une période de repos qui va durer jusqu'au printemps.




❶ Pendant la belle saison, l'apport d'eau pompée par les racines et les pertes d'eau dues à la transpiration foliaire s'équilibrent.




❷ Les substances nutritives de la feuille sont transférées vers les branches, le tronc et les racines. L'eau continue de s'évaporer des feuilles tandis que l'apport venant des racines diminue : la feuille se dessèche.



❸ La chlorophylle, pigment dominant de la feuille, est détruite. Les autres pigments deviennent alors visibles : les antocyanes (rouges), les carotènes et les xanthophylles (jaunes) donnent à la feuille ses couleurs d'automne.




❹ À la base du pétiole, les cellules de la zone d'abscission commencent à se dégrader. Bientôt, la feuille n'est plus attachée à la tige que par quelques tissus desséchés.



❺ La feuille tombe, soufflée par un coup de vent ou martelée par la pluie. Elle laisse une cicatrice recouverte par une fine couche de liège.


## EXEMPLES D'ARBRES À FEUILLES CADUQUES

Les arbres à feuilles caduques sont caractéristiques des zones tempérées, comme l'Europe, l'est de l'Amérique du Nord et l'est de l'Asie. On les retrouve parfois localement dans la zone intertropicale, sur le flanc des montagnes, par exemple. Ce sont pour la plupart des arbres feuillus, du groupe des plantes à fleurs, comme le chêne, le noyer ou encore l'érable. Il existe aussi quelques conifères à feuilles caduques, comme le mélèze.



## LES ARBRES À FEUILLES PERSISTANTES


Contrairement aux feuilles caduques, qui tombent chaque automne, les feuilles persistantes durent généralement plusieurs années. Leur chute n'est pas déterminée par l'alternance des saisons, mais par le simple vieillissement. Tout au long de l'année, certaines feuilles tombent, selon le même processus que les feuilles caduques. Elles sont rapidement remplacées par de nouvelles feuilles, si bien que l'arbre reste toujours vert. Dans la zone intertropicale, quasiment toutes les plantes possèdent des feuilles persistantes. Aux latitudes moyennes, très peu d'espèces gardent leurs feuilles en hiver. Ce sont pour la plupart des conifères. Leurs feuilles étroites et dures, en forme d'écaillés ou d'aiguilles, leur permettent de limiter les pertes en eau et de résister au froid et à la sécheresse de l'hiver. Quelques rares plantes à fleurs, comme le houx, conservent aussi leurs feuilles toute l'année.




Les **plantes tropicales** sont verdoyantes à longueur d'année. Le climat tropical humide, caractérisé par une chaleur et une humidité élevées, favorise le renouvellement constant des feuilles.



Les **feuilles du houx**, brillantes du fait de leur épaisse cuticule, sont bien adaptées à la sécheresse hivernale des régions tempérées.



La fleur est **un organe entièrement dédié à la reproduction**. Elle produit des grains de pollen et des ovules qui renferment les cellules sexuelles mâles et femelles. Bien souvent, ses couleurs chatoyantes et son nectar parfumé attirent des insectes pollinisateurs qui transportent le pollen et favorisent la rencontre des cellules sexuelles. La fécondation a lieu dans la fleur, qui se transforme alors en fruit protégeant des graines. Ce cycle de reproduction, qui fait intervenir des structures hautement spécialisées, est **le plus complexe et le plus efficace** du règne végétal.





# La reproduction des plantes à fleurs

- 52 **La pollinisation**  
*Le transport des grains de pollen*
- 54 **La fécondation**  
*La rencontre des cellules sexuelles*
- 56 **La graine**  
*Un organisme en devenir*
- 57 **Le fruit**  
*Protéger et disséminer les graines*
- 61 **La multiplication végétative**  
*La reproduction asexuée des plantes*


# La pollinisation

## Le transport des grains de pollen

La pollinisation est le passage du pollen de l'organe reproducteur mâle, l'étamine, à l'organe reproducteur femelle, le pistil. Elle permet la fécondation, qui conduit à la naissance d'une nouvelle plante. Selon les espèces, la pollinisation peut avoir lieu dans une même fleur (autopollinisation) ou entre deux fleurs distinctes (pollinisation croisée). Dans la nature, la pollinisation fait intervenir des animaux pollinisateurs ou le vent. En agriculture et en horticulture, l'homme peut agir comme agent de pollinisation.

### LES AGENTS DE POLLINISATION

Les grains de pollen sont produits par les anthères, à l'extrémité des étamines. Ils doivent être transportés jusqu'au stigmate, au sommet du pistil. Les agents de pollinisation assurent ce transport. Ce sont des animaux, le vent ou l'homme.




### LA POLLINISATION ZOOPHILE

La plupart des plantes sont pollinisées grâce à des animaux. Le pollen est transporté par de petits oiseaux, comme le colibri, par des mammifères, comme la chauve-souris, ou, plus fréquemment, par des insectes (abeilles, papillons, guêpes). La pollinisation par les insectes est dite entomophile. Elle concerne des fleurs généralement grandes, colorées et parfumées.


### LA POLLINISATION ENTOMOPHILE

L'insecte se pose sur une fleur, attiré par sa couleur, son odeur ou le sucre de son nectar. Des grains de pollen se fixent alors sur le corps de l'animal ❶. Celui-ci se déplace ensuite vers une autre fleur ❷. Quelques grains de pollen tombent accidentellement sur le stigmate de la deuxième fleur visitée ❸.




## LA POLLINISATION ANÉMOPHILE

Les fleurs pollinisées par le vent sont généralement discrètes et peu attirantes pour les insectes. Le transport du pollen grâce au vent est relativement peu efficace. Une faible proportion des grains de pollen émis par une fleur atteint effectivement le stigmate d'une autre fleur. Certaines plantes se sont adaptées aux aléas de la pollinisation anémophile en produisant d'énormes quantités de pollen ❶, aux grains petits, légers, lisses et secs. Le vent disperse le pollen sur un vaste territoire ❷. La plupart des grains de pollen sont perdus lors de ce transport aléatoire. Rares sont ceux qui parviennent à féconder une autre fleur ❸.



## LA POLLINISATION ARTIFICIELLE


L'homme intervient parfois dans le processus de pollinisation, déposant lui-même le pollen d'une fleur sur le stigmate d'une autre. L'objectif est d'obtenir une plante fille qui cumule les caractéristiques agronomiques des deux plantes mères.



La pollinisation s'effectue manuellement à l'aide d'un **pinceau** ou de tout autre objet pouvant transporter le pollen sans l'endommager.

## LE BRASSAGE GÉNÉTIQUE

Lorsque la pollinisation se fait de l'étamine au pistil d'une même fleur, on parle d'autopollinisation. Quand au contraire le pollen est transporté vers la fleur d'un autre plant, la pollinisation est dite croisée. La pollinisation croisée permet de mélanger dans la plante fille des caractères propres à chacune des deux plantes mères. Les caractères propres à une plante, comme sa tolérance à la sécheresse, sont codés sous forme de gènes, conservés dans le noyau de chacune des cellules de la plante. Le mélange des gènes grâce à la pollinisation croisée s'appelle le brassage génétique. Ce phénomène, qui favorise l'apparition de nouveaux caractères chez les végétaux, est le moteur de l'évolution.



# La fécondation

## La rencontre des cellules sexuelles

La fécondation résulte de la germination d'un grain de pollen sur le stigmate d'une fleur. Elle correspond à la fusion des cellules sexuelles, les gamètes, produites par des organes spécialisés, les gamétophytes (grain de pollen et sac embryonnaire). Les cellules sexuelles mâle et femelle fusionnent en une cellule unique, le zygote, qui se multipliera pour former un embryon. Chez les plantes à fleurs, la fécondation est double : une autre paire de cellules reproductrices forme un tissu chargé de réserves nutritives, l'albumen, utile au développement de l'embryon.


### LE GRAIN DE POLLEN

Le grain de pollen est le gamétophyte mâle. De forme quasi sphérique, il est constitué d'une cellule végétative volumineuse dont la paroi est composée de deux enveloppes, l'intine et l'exine. La cellule végétative englobe et protège la cellule reproductrice mâle, beaucoup plus petite.

L'**exine**, enveloppe externe du grain de pollen, est fréquemment ornementée.

L'**intine** est l'enveloppe interne du grain de pollen.

Les grains de pollen sont produits par les **anthères**.



La **cellule reproductrice** est à l'origine des cellules sexuelles mâles (gamètes mâles).


La **cellule végétative** dirige la croissance du tube pollinique au moment de la fécondation.

Le **noyau de la cellule végétative**

Les **apertures** sont des régions en forme de pore ou de sillon où l'exine est amincie.


### LE SAC EMBRYONNAIRE

Le gamétophyte femelle s'appelle le sac embryonnaire. Il est contenu dans un ovule, lui-même intégré dans un ovaire. Le sac embryonnaire renferme huit noyaux cellulaires, dont trois participent à la fécondation : l'oosphère (cellule sexuelle femelle) et les deux noyaux polaires.



ovaire

ovule



Les trois cellules situées à l'opposé du micropyle sont appelées **antipodes**. Elles dégénèrent après la fécondation.

Les deux **noyaux polaires** de la cellule centrale participent à la formation de réserves nutritives.

L'**oosphère** est la cellule sexuelle femelle (gamète femelle).


Les deux cellules qui encadrent l'oosphère, appelées **synergides**, dirigent l'entrée du gamète mâle dans le sac embryonnaire et dégénèrent juste après la fécondation.

Le **sac embryonnaire** compte sept cellules, dont une renferme deux noyaux.

L'enveloppe de l'ovule présente une discontinuité, le **micropyle**, offrant un accès au sac embryonnaire.

## LA DOUBLE FÉCONDATION

La reproduction des plantes à fleurs est caractérisée par une double fécondation. À l'issue de la pollinisation, le grain de pollen ❶ déposé sur le stigmate germe : il s'hydrate, gonfle et l'intine, poussée à travers une ouverture, s'allonge sous la forme d'un tube, le tube pollinique ❷. Le tube pollinique croît dans le style en direction de l'ovule. Pendant ce temps, la cellule reproductrice se divise pour former deux gamètes mâles ❸. Le tube pollinique pénètre dans l'ovule par le micropyle ❹ et libère son contenu dans le sac embryonnaire. C'est alors qu'a lieu la double fécondation. Un gamète mâle fusionne avec l'oosphère et forme le zygote ❺, une cellule qui va générer l'embryon de la future plante. Le second gamète mâle fusionne avec les deux noyaux polaires. La cellule à trois noyaux ❻ résultant de cette fusion va se diviser pour former un tissu de réserves nutritives, l'albumen.



# La graine

*Un organisme en devenir*

La fécondation conduit à la formation d'une graine qui protège l'embryon de la future plante et qui renferme des réserves nutritives utiles pour les premières étapes de son développement. La graine résulte de la transformation de l'ovule après la fécondation. Chez les plantes à fleurs, elle est enfermée dans un fruit, organe qui résulte de la transformation de l'ovaire.

## LA STRUCTURE DE LA GRAINE

La graine comprend l'embryon, l'albumen et le tégument. L'embryon, véritable ébauche de la future plante, est composé de la gemmule, la tigelle, la radicule et un ou deux cotylédons. L'albumen est un tissu chargé de réserves nutritives destinées au développement de l'embryon et de la jeune plante (plantule). Au cours de sa maturation, la graine se dessèche. Elle peut entrer dans un état de dormance : la graine vit au ralenti en attendant des conditions favorables à sa germination. La dormance peut durer de deux jours à plusieurs années, selon les espèces.

Les **cotylédons** sont des feuilles embryonnaires qui servent de réserves nutritives à la jeune plante au début de son développement et qui dégénèrent rapidement après que les premières feuilles sont apparues.

albumen

plan de coupe  
transversale

plan de coupe  
longitudinale

Selon les espèces, la taille des graines varie d'un centième de millimètre à 30 cm. La **graine de ricin**, par exemple, mesure environ 1,2 cm.

La graine est protégée par le **tégument**, une enveloppe rigide imprégnée de lignine.

cotylédon

La **radicule** deviendra la racine principale de la plantule.

Lors de la germination, la **tigelle** formera une tige primitive entre le sol et les cotylédons.

Lors de la germination, la **gemmule** produira la tige feuillée.

Le **hile** est une cicatrice marquant le point d'attache de la graine au fruit.

coupe transversale

coupe longitudinale

embryon

# Le fruit

## Protéger et disséminer les graines

Le fruit résulte de la transformation de la fleur après la fécondation. Il est constitué d'une ou plusieurs graines, d'une enveloppe plus ou moins épaisse, et des restes de certaines pièces florales. Le fruit contribue à la dissémination des graines. Une fois libérée, la graine germe et se développe en plantule. La plantule devient une plante, qui à son tour va former des fleurs, puis des graines et des fruits, suivant le cycle de reproduction des plantes à fleurs.

### LES PARTIES DU FRUIT

Le fruit comprend une ou plusieurs graines (issues de la fécondation des ovules) protégées par une enveloppe appelée **péricarpe**. Le péricarpe, qui dérive des parois de l'ovaire, est composé de trois parties. L'**épicarpe**, communément appelé peau, désigne la couche extérieure du fruit. Il recouvre le **mésocarpe**, qui correspond souvent à la partie la plus charnue du fruit. L'**endocarpe**, quant à lui, forme une enveloppe plus ou moins rigide autour de la graine.

La consistance du péricarpe permet de classer les fruits : si le péricarpe est épais, mou et pulpeux, le fruit est dit charnu (pomme, pêche, raisin). Si le péricarpe est mince et sec, le fruit est dit sec (grain de blé, noisette).

COUPE D'UNE PÊCHE

Le **pédoncule**, familièrement appelé queue, relie le fruit à la ramification terminale d'une tige ou d'un rameau.


La peau du fruit, ou **épicarpe**, est une mince pellicule qui peut être lisse, rugueuse ou encore velue.

La **graine**, qu'on appelle amande ou pépin selon les fruits, contient l'embryon et des réserves nutritives qui permettront la naissance d'une nouvelle plante.

Le **mésocarpe**, ou pulpe, est généralement sucré et juteux.

L'**endocarpe** est la couche interne du fruit qui entoure et protège la graine.

Certaines pièces florales peuvent persister sur le fruit, comme le **style** desséché au bas de la pêche.




## Le fruit

### LES FRUITS SECS


Les fruits secs au sens botanique sont des fruits qui possèdent un péricarpe mince et sec. Ils sont bien différents des fruits secs au sens commun. Ainsi, la noix n'est pas un fruit sec, mais une drupe (fruit charnu). À l'inverse, la fraise n'est pas un fruit charnu, mais un regroupement de fruits secs très petits insérés sur un réceptacle renflé. On distingue deux types de fruits secs, les fruits secs déhiscents et indéhiscents, selon qu'ils s'ouvrent spontanément ou non.

#### LES FRUITS SECS DÉHISCENTS


À maturité, les fruits secs déhiscents s'ouvrent d'eux-mêmes et libèrent leurs graines. Ils renferment généralement plusieurs graines. Selon la forme du fruit, on distingue les capsules, les follicules, les siliques et les gousses.




La **gousse** du pois est un fruit sec à une seule loge qui, à maturité, s'ouvre en deux endroits, soit la suture et la nervure principale de son enveloppe.



La **silique** de moutarde est un fruit sec à deux valves qui, à maturité, s'ouvrent pour libérer les graines.




La **capsule** du pavot est un fruit sec à plusieurs loges qui, à maturité, s'ouvre latéralement ou par le sommet. Elle renferme de très nombreuses graines.




Un **follicule** est un fruit sec à une seule loge qui, à maturité, s'ouvre d'un côté seulement, le long de la suture de son enveloppe. L'anis étoilé est composé de huit follicules.

#### LES FRUITS SECS INDÉHISCENTS

Les fruits secs indéhiscents ne s'ouvrent pas spontanément. Ils contiennent habituellement une seule graine. Ce sont des akènes (tournesol, fraise), des samares (érable) ou encore des caryopses (blé).




Le tournesol produit des **akènes**, petits fruits secs indéhiscents possédant une graine unique, non soudée au péricarpe.



Le grain de blé est un **caryopse**, petit fruit sec possédant une graine unique soudée au péricarpe.

Une seule fraise peut porter des dizaines, voire des centaines d'**akènes**.



La fraise est un **fruit complexe**, formé d'akènes soutenus par le réceptacle charnu de la fleur.




La **samare** d'érable est un fruit sec indéhiscents dont le péricarpe allongé forme une aile qui favorise la dissémination.

## LES FRUITS CHARNUS

Les fruits charnus possèdent un péricarpe épais, mou et charnu. Il existe deux principaux types de fruits charnus, les drupes et les baies, qui diffèrent par la consistance des couches de leur péricarpe. Les fruits charnus peuvent être simples, comme la pêche, ou composés, comme la framboise.

### LES DRUPES


Les drupes possèdent un épicarpe et un mésocarpe charnus, correspondant à la peau et à la pulpe du fruit, mais l'endocarpe est sec et rigide, car il est imprégné de lignine, une substance présente dans le bois. L'endocarpe forme un noyau autour de la graine. Parmi les drupes, on trouve notamment la pêche, la framboise et la noix de coco.



La **noix de coco** qu'on trouve dans les épiceries est le noyau d'une drupe. La coquille brune correspond à l'endocarpe rigidifié.

### LES BAIES

Les baies sont des fruits dont le péricarpe est entièrement charnu, l'endocarpe se confondant avec le mésocarpe. Elles contiennent généralement plusieurs graines. Parmi les baies, on compte par exemple le raisin et l'orange. Les fruits à pépins comme la pomme et la poire sont intermédiaires entre les baies et les drupes, car leur endocarpe n'est ni charnu ni rigide, mais cartilagineux. On les assimile fréquemment à des baies.



## Le fruit

### LA DISSÉMINATION DES GRAINES

Les plantes à fleurs, immobiles, conquièrent de nouveaux territoires en dispersant leurs graines à distance de la plante mère. La dissémination des graines est souvent assurée par des animaux, comme les oiseaux ou les écureuils, qui collectent les fruits pour les mettre en réserve avant de les manger. Le vent transporte certains fruits très légers ou ailés, comme l'aigrette de pissenlit. Les cours d'eau ou les courants marins peuvent aussi transporter des fruits sur de grandes distances (noix de coco).


La libération des graines dépend du type de fruit. Certains fruits secs, comme la gousse du pois, sont déhiscent : ils s'ouvrent spontanément à maturité, libérant leurs graines. Mais de nombreux autres fruits, comme la noisette et la pomme, sont indéhiscents. La libération des graines a lieu si la paroi du fruit est détruite, lorsque le fruit tombe brutalement, qu'un animal l'ouvre pour le manger, ou simplement lorsqu'il pourrit.



Le fruit du **pissenlit** forme une aigrette dispersée par le vent.

### LA GERMINATION

La germination est le processus par lequel la graine, jusque-là dans un état de vie ralentie, reprend son développement. Puisant dans les réserves nutritives de la graine, l'embryon émet une racine, une tige et des feuilles. Ces dernières commencent rapidement à fabriquer de la nourriture par photosynthèse pour alimenter la nouvelle plante. La germination nécessite de l'eau, de l'oxygène, de la lumière et de la chaleur, en quantités variables selon la plante. Certaines graines réclament des conditions particulières pour germer, comme d'être maintenues au froid pendant un certain temps (vernalisation).




# La multiplication végétative

## La reproduction asexuée des plantes


De nombreuses plantes sont capables de se reproduire de manière asexuée, c'est-à-dire sans l'intervention de cellules sexuelles. Ce mode de reproduction s'appelle la multiplication végétative. Une partie de la plante se détache, s'enracine et se développe pour former une nouvelle plante. Les nouveaux plants obtenus par multiplication végétative sont identiques à la plante mère : ce sont des clones. De nombreux organes permettent la reproduction asexuée, comme les tubercules, les bulbes, les rhizomes et les stolons.

### TUBERCULE




Un tubercule est un organe de réserves nutritives souterrain formé par le renflement de la tige ou de la racine. De nouvelles pousses peuvent se former sur un tubercule, comme sur le tubercule de **pomme de terre**.

### BULBE




Un bulbe est un organe de réserves nutritives souterrain fréquent chez les monocotylédones, comme le **crocus**, le glaïeul ou encore la tulipe. Il est formé par le renflement de la tige ou des feuilles à la base de la tige. Une bulbille peut se former sur le bulbe principal, se détacher et donner naissance à une nouvelle plante.

### RHIZOME



Un rhizome est une tige souterraine horizontale gonflée de réserves nutritives. Sur toute sa longueur, à intervalles réguliers, se forment des racines adventives et de nouvelles pousses aériennes. Le bambou, le **gingembre** et l'iris, par exemple, possèdent des rhizomes.

### STOLON




Un stolon est une tige mince, issue de la tige principale, qui s'allonge à la surface du sol. Des racines adventives peuvent se former au niveau des nœuds du stolon et permettre la formation d'un nouveau plant. Le lierre et le **fraisier** peuvent se multiplier ainsi.



Qu'est-ce qui distingue les plantes chlorophylliennes des autres végétaux ? Leur capacité à **fabriquer leur propre nourriture** grâce à une réaction complexe, la photosynthèse. La matière vivante fabriquée par photosynthèse circule dans tous les tissus de la plante et sert de **matière première pour l'édification des organes**. Nourries d'eau, de sels minéraux et de lumière, les plantes se développent parfois considérablement, certaines dépassant même 100 mètres de hauteur.





# Nutrition et croissance

- 64 **La photosynthèse**  
*Comment les plantes captent la lumière pour se nourrir*
- 67 **La sève**  
*Le fluide vital des plantes*
- 70 **Les végétaux hétérotrophes**  
*Vivre aux dépens des autres*
- 74 **La croissance des plantes**  
*Le développement de tissus spécialisés*
- 78 **Les hormones végétales**  
*Des régulateurs chimiques*
- 79 **Les tropismes**  
*La croissance sous influence extérieure*


# La photosynthèse

*Comment les plantes captent la lumière pour se nourrir*

La grande majorité des végétaux sont autotrophes, c'est-à-dire qu'ils se nourrissent du gaz carbonique de l'atmosphère et d'eau et de sels minéraux puisés dans le sol, qu'ils transforment en matière vivante. La photosynthèse est le mécanisme qui permet à la plante d'utiliser l'énergie lumineuse pour effectuer la transformation de molécules simples en matière organique. Elle a lieu dans des structures cellulaires spécifiques, les chloroplastes. La photosynthèse participe au métabolisme des plantes, au même titre que la respiration.


## LE MÉCANISME DE LA PHOTOSYNTHÈSE

La photosynthèse a généralement lieu dans les feuilles. Les cellules des feuilles renferment de nombreux chloroplastes. Ces organites contiennent un pigment vert, la chlorophylle, capable de capter l'énergie lumineuse. Cette énergie sert à fabriquer des molécules de sucres à partir de l'eau puisée dans le sol par les racines et du gaz carbonique de l'atmosphère. Les sucres produits par photosynthèse sont ensuite distribués dans toute la plante.




## LES DEUX PHASES DE LA PHOTOSYNTHÈSE

La première phase de la photosynthèse nécessite l'éclairage de la feuille. La chlorophylle qui est enchâssée dans la membrane des thylakoïdes absorbe l'énergie lumineuse ①. Cette absorption d'énergie s'accompagne de la dégradation de molécules d'eau et de la libération d'oxygène ②. Dans une seconde phase, indépendante de la lumière, l'énergie absorbée par la chlorophylle ③ est utilisée pour la transformation ④ de molécules de gaz carbonique en molécules de sucres ⑤.



## LES PRODUITS DE LA PHOTOSYNTHÈSE

Les sucres fabriqués par photosynthèse sont emmagasinés dans la cellule sous forme d'amidon, transformés en autres molécules organiques, comme les protéines, ou dégradés dans les mitochondries lors de la respiration pour subvenir aux besoins énergétiques de la plante.




## La photosynthèse

### LE MÉTABOLISME DES PLANTES

Le métabolisme est l'ensemble des réactions chimiques qui permettent à un être vivant de vivre et de se développer. On distingue les réactions de construction de matière vivante (anabolisme) et les réactions de dégradation (catabolisme). Ces réactions ont lieu à l'intérieur de chacune des cellules de l'organisme.

La photosynthèse, qui aboutit à la fabrication de sucres, permet l'édification de la plante. Elle consomme de l'énergie lumineuse, de l'eau et du gaz carbonique. La respiration, au contraire, consiste en la dégradation des sucres. Elle génère l'énergie nécessaire aux différentes activités de la plante, comme la croissance et la reproduction. Pour que la plante croisse, il faut que la quantité de matière organique fabriquée par photosynthèse excède les pertes dues à la respiration.




### LES ÉCHANGES GAZEUX

Les échanges gazeux entre la plante et l'atmosphère se font à travers des minuscules pores, les stomates, situés principalement sous les feuilles. Les stomates sont constitués de deux cellules encadrant une ouverture, l'ostiole. Selon les besoins de la plante, les stomates s'ouvrent ou se ferment.

Lors de la photosynthèse, les plantes consomment du gaz carbonique et libèrent de l'oxygène. L'inverse se produit quand les plantes respirent. La respiration et la photosynthèse jouent ainsi un rôle majeur dans le maintien de l'équilibre des gaz de l'atmosphère.

De plus, les plantes transpirent : de la vapeur d'eau s'échappe des feuilles par les stomates. Cette transpiration foliaire permet à la plante de maintenir une teneur en eau optimale.



# La sève

## Le fluide vital des plantes


La sève est un liquide nutritif qui circule dans les racines, les tiges et les feuilles de la plante. Il existe deux types de sèves : la sève brute et la sève élaborée. La sève brute est composée d'eau et de sels minéraux, dont plusieurs sont essentiels à la survie de la plante. La sève élaborée renferme les sucres fabriqués lors de la photosynthèse. La sève est transportée dans toute la plante par des tissus spécialisés formés de vaisseaux conducteurs.

### LES MINÉRAUX ESSENTIELS

Les organismes végétaux renferment une soixantaine d'éléments chimiques, parmi lesquels 17 sont essentiels à leur bon fonctionnement. Les trois principaux sont le carbone, l'hydrogène et l'oxygène. Ils servent à l'édification de la plante et sont obtenus par transformation de l'eau et du gaz carbonique lors de la photosynthèse.

Les autres éléments sont puisés dans le sol par les racines, sous forme minérale. Ces minéraux essentiels entrent dans la composition des tissus de la plante ou jouent un rôle d'activateur du métabolisme. On distingue les micro-éléments, nécessaires en petites doses, des macro-éléments, requis en plus grandes quantités. Les carences minérales peuvent perturber le cycle de reproduction de la plante, provoquer la déformation des tiges ou encore le jaunissement des feuilles.

Les **principaux éléments** dont se nourrit la plante (carbone, hydrogène, oxygène) proviennent de l'eau du sol et du gaz carbonique de l'atmosphère.



Le **gaz carbonique** de l'atmosphère pénètre dans la plante au niveau des feuilles.

L'**eau** du sol est absorbée par les racines.

Les **sels minéraux** puisés par les racines sont issus de la dégradation des roches du sol.

### LE RÔLE DES MICRO-ÉLÉMENTS ESSENTIELS

<b>molybdène et cobalt</b>	aident à la fixation de l'azote
<b>cuivre et zinc</b>	activent plusieurs réactions cellulaires
<b>manganèse</b>	participe à la photosynthèse
<b>bore</b>	est nécessaire à la division cellulaire
<b>fer</b>	est nécessaire à la fabrication de la chlorophylle
<b>chlore</b>	intervient dans l'ouverture et la fermeture des stomates
<b>nickel</b>	contribue à la viabilité des graines

### LE RÔLE DES MACRO-ÉLÉMENTS ESSENTIELS

<b>soufre</b>	composant des protéines
<b>magnésium</b>	composant de la chlorophylle
<b>calcium</b>	composant de la paroi cellulaire
<b>phosphore</b>	composant de molécules de transport d'énergie
<b>potassium</b>	intervient dans l'ouverture et la fermeture des stomates
<b>azote</b>	composant, entre autres, des protéines

## La sève

## LE TRANSPORT DE LA SÈVE

La sève circule à l'intérieur d'un réseau de vaisseaux conducteurs qui parcourent la plante. Selon le type de sève, elle n'emprunte pas le même circuit.


La sève brute est composée d'eau et de sels minéraux absorbés dans le sol par les racines. Elle est ascendante : elle se déplace des racines, souterraines, vers les feuilles. La sève brute est transportée par le xylème, un tissu conducteur formé de larges vaisseaux. Son déplacement résulte principalement de la transpiration foliaire et, dans une moindre mesure, de la poussée racinaire.

La sève élaborée contient les sucres issus de la photosynthèse. Elle est fabriquée dans les feuilles puis distribuée vers les autres organes par le réseau de conduits du phloème. La différence de concentration en sucres aux deux extrémités des tubes de phloème joue un rôle important dans ce transport.

La **sève brute** est composée de substances non transformées par la plante, de l'eau et des sels minéraux, qui servent de matière première à la réaction de photosynthèse.

La **sève élaborée** est un liquide très concentré en substances organiques fabriquées dans les feuilles et servant à nourrir toute la plante (glucides issus de la photosynthèse, protéines, hormones végétales...).

vapeur d'eau





## LA TRANSPIRATION FOLIAIRE

L'évaporation d'eau au niveau des feuilles provoque l'aspiration de l'eau des racines vers les feuilles et par conséquent la montée de la sève brute.

## LA POUSSÉE RACINAIRE


La racine pompe activement les sels minéraux du sol, créant un déséquilibre de concentration en minéraux entre l'intérieur et l'extérieur de la racine. L'eau du sol a tendance à affluer dans la racine afin de rétablir l'équilibre des concentrations. L'afflux d'eau exerce une force de poussée, la poussée racinaire, qui fait remonter la sève brute des racines vers le reste de la plante.

eau du sol



## LE XYLÈME

Le xylème des plantes à fleurs est composé de vaisseaux et de trachéïdes conducteurs de la sève brute.



## LES VAISSEAUX CONDUCTEURS DE SÈVE

Le xylème et le phloème sont indépendants : ils forment deux réseaux parallèles de vaisseaux conducteurs de sève, s'étendant des racines aux nervures des feuilles.


Le **cambium** est un tissu de croissance qui donne naissance aux vaisseaux du xylème et du phloème.

## LE PHLOÈME

Le phloème est formé de tubes criblés spécialisés dans le transport de la sève élaborée.

Les **tubes criblés** sont constitués de files de cellules allongées partiellement vidées de leur contenu cellulaire. Leurs parois transversales criblées permettent la circulation de la sève élaborée.

Accolées aux tubes criblés, les **cellules compagnes** sont des cellules vivantes qui jouent un rôle d'intermédiaire dans le transfert des sucres entre les cellules photosynthétiques et le phloème.



# Les végétaux hétérotrophes

*Vivre aux dépens des autres*

Les plantes chlorophylliennes fabriquent leur propre nourriture par photosynthèse, à partir de l'eau et des sels minéraux puisés dans le sol. Elles sont autotrophes. À l'inverse, les végétaux hétérotrophes sont incapables de se nourrir par eux-mêmes. Ils puisent la totalité ou une partie de leur nourriture auprès d'autres êtres vivants. On distingue différents types de végétaux hétérotrophes, selon la relation qu'ils entretiennent avec leurs hôtes. Dans le cas d'une symbiose, le végétal hétérotrophe et son hôte tirent tous deux bénéfice de leur association. Les végétaux parasites, en revanche, détournent les ressources de leur hôte à leur seul profit.


## LES VÉGÉTAUX SYMBIOTIQUES

La symbiose désigne l'association de deux organismes qui bénéficient mutuellement de leur vie commune. Les lichens sont composés d'un champignon et d'une algue vivant en symbiose. Les mycorhizes (association d'un champignon et des racines d'un arbre) sont aussi des exemples de symbioses.

### LES MYCORHIZES

Une mycorhize est formée par l'association des racines d'un arbre et des filaments souterrains d'un champignon. Le champignon bénéficie de la matière organique qui circule dans la racine, tandis que l'arbre profite d'une plus grande surface de contact au sol, et donc d'un meilleur accès à l'eau et aux sels minéraux. Les mycorhizes sont fréquentes : 80 % des plantes à fleurs et des conifères abritent un champignon dans leur système racinaire.


Les filaments du champignon forment parfois un **manchon** autour d'une radicelle.



### LES LICHENS

Les lichens sont formés par l'association d'une algue et d'un champignon vivant en symbiose. L'algue, chlorophyllienne, fabrique la matière organique nécessaire aux deux partenaires, tandis que le champignon approvisionne le couple en eau et en sels minéraux. Les lichens poussent généralement à la surface des arbres ou des rochers.

filament du champignon



## LES VÉGÉTAUX PARASITES


Les végétaux parasites sont incapables de réaliser la photosynthèse et dépendent par conséquent entièrement de leur hôte. La plupart d'entre eux, comme la cuscute, possèdent des suçoirs, sorte de racines qui pénètrent dans la tige de l'hôte jusqu'aux faisceaux conducteurs et aspirent la sève élaborée.



La **cuscute** s'enroule autour de la tige de la plante qu'elle parasite.

### LA CUSCUTE

La cuscute est une plante herbacée qui parasite de nombreuses plantes, herbacées ou ligneuses. Elle présente de petites fleurs blanches et des tiges rougeâtres, enroulées en vrilles autour des tiges de la plante hôte. La cuscute ne possède pas de feuilles et elle est incapable de réaliser la photosynthèse. Elle se nourrit exclusivement de la matière organique fabriquée par son hôte, qu'elle pompe directement dans le phloème à l'aide de suçoirs.




## LES VÉGÉTAUX SEMI-PARASITES

Ces végétaux possèdent de la chlorophylle et peuvent donc fabriquer leur nourriture par photosynthèse. Cependant, comme ils sont dépourvus de racines, ils doivent puiser l'eau et les sels minéraux de base auprès d'un hôte, en pompant sa sève brute. C'est le cas du gui, par exemple.

### LE GUI

Le gui est un semi-parasite qui pousse en touffes sur les branches de nombreux arbres. Ses baies translucides contiennent une substance très collante caractéristique. Le gui plonge ses suçoirs jusqu'aux vaisseaux du xylème de son hôte afin d'y puiser de la sève brute. Il utilise ensuite cette matière première pour fabriquer sa nourriture par photosynthèse.



Le feuillage verdâtre du **gui** est persistant, si bien qu'en hiver, quand l'arbre hôte a perdu ses feuilles, le gui est encore bien visible.

## Les végétaux hétérotrophes


### LES PLANTES CARNIVORES

Les plantes carnivores sont capables de fabriquer leur propre nourriture par photosynthèse. Cependant, les animaux qu'elles capturent leur apportent un complément alimentaire qui leur permet de survivre sur des sols pauvres en azote, acides et marécageux, comme les tourbières. On dénombre environ 600 espèces de plantes carnivores. Elles capturent principalement des insectes, qu'elles digèrent lentement grâce à des sucs digestifs.

Les plantes carnivores utilisent diverses stratégies pour piéger leurs proies. La moitié des espèces capture ses proies par aspiration : l'animal est aspiré à l'intérieur d'un petit sac où il sera digéré grâce à des sucs digestifs. Près du tiers des espèces de plantes carnivores piège ses victimes dans du mucilage, un nectar visqueux dans lequel l'insecte est englué puis digéré. Une centaine d'espèces végétales disposent de pièges à urne, sorte de puits duquel l'animal piégé ne peut pas ressortir. Enfin, les pièges à charnière sont spectaculaires mais très rares : seulement deux espèces connues l'utilisent.


#### PIÈGE PAR ASPIRATION

L'**utriculaire** est une plante aquatique flottante dépourvue de racines. Certaines de ses feuilles sont transformées en minuscules outres, appelées utricules. Lorsqu'un insecte effleure un utricule, celui-ci s'ouvre brutalement. Il se remplit d'air ou d'eau, aspirant l'insecte au passage. L'utricule se referme et se contracte sur la victime. Des glandes digestives produisent des sucs qui dégradent les parties molles de l'insecte.



#### PIÈGE À MUCILAGE

La **drosera** est une petite plante carnivore qui s'est adaptée à la plupart des régions du globe.




❶ La drosera porte sur ses feuilles de petites glandes allongées produisant du mucilage, un liquide sucré et collant qui attire les insectes.

❷ L'insecte est englué dans le mucilage et les glandes de la feuille se rabattent sur lui.

❸ Après quelques jours, il ne reste plus que les parties rigides du corps de la victime, dispersées par le vent.


# PIÈGE À CHARNIÈRE

La **dionée** est originaire de la région frontalière entre la Caroline du Nord et la Caroline du Sud, aux États-Unis. Ses feuilles possèdent deux lobes articulés autour de la nervure centrale. Elles sont colorées en rouge et produisent du nectar, deux caractères très attractifs pour les insectes. Lorsqu'un insecte touche une feuille, les deux lobes se rabattent brutalement l'un sur l'autre, emprisonnant l'insecte. Ce dernier sera lentement digéré.



# PIÈGE À URNE

Le **népenthès** pousse dans les régions soumises à un climat tropical humide. Il possède des feuilles dont l'extrémité forme une urne colorée. Le bord des urnes est enduit d'un nectar sucré qui attire les insectes et provoque leur glissade vers le fond de l'urne. Là, les insectes se noient dans un mélange d'eau de pluie et de sécrétions digestives.





# La croissance des plantes

## Le développement de tissus spécialisés

La croissance des plantes s'opère de deux façons. Les plantes croissent en largeur grâce à la production de nouvelles cellules par un tissu spécialisé, le cambium, et elles s'allongent du fait de la multiplication des cellules situées à l'extrémité des rameaux et des racines. Dans les régions tempérées, les plantes ne poussent qu'au printemps et en été. Dans la zone intertropicale, en revanche, leur croissance est continue. La taille qu'atteint une plante dépend de son espèce mais aussi de son âge et des conditions dans lesquelles elle pousse.

### LA CROISSANCE EN LARGEUR

Les plantes capables de croître en largeur sont les conifères et les dicotylédones (groupe qui rassemble les trois quarts des plantes à fleurs, incluant les arbres). Ces plantes possèdent un tissu particulier, le cambium, capable de générer de nouveaux tissus conducteurs de sève (xylème et phloème). Chez les arbres, le xylème produit par le cambium s'imprègne de lignine et durcit pour former le bois. Chaque année, de nouvelles couches de bois se superposent à celles des années précédentes, faisant croître l'arbre en largeur.




### LES CERNES

Une coupe transversale du tronc d'un arbre permet de visualiser la superposition des couches de bois produites année après année. Ces couches s'appellent des cernes annuels. Des cernes larges indiquent une croissance rapide, tandis que des cernes étroits signalent une croissance ralentie. L'âge de l'arbre peut donc être calculé en comptant les cernes.

## LA CROISSANCE EN LONGUEUR


Les plantes grandissent grâce à l'allongement de leurs tiges et de leurs racines. Cette croissance en longueur est due à des tissus de croissance, les méristèmes, en particulier les méristèmes terminaux, situés aux bouts des rameaux et des racines. Les méristèmes sont composés de cellules capables de se diviser rapidement pour générer les différents organes de la plante. Les méristèmes situés à l'extrémité et aux nœuds des rameaux, exposés aux intempéries, sont généralement protégés à l'intérieur de bourgeons.



## La croissance des plantes

### EXTRÉMITÉ D'UN RAMEAU AU PRINTEMPS


Lorsque les conditions météorologiques deviennent favorables, les bourgeons éclosent. Leurs écailles s'ouvrent, les cellules du méristème se mettent à se diviser rapidement, les premières feuilles s'épanouissent et la tige s'allonge. Ce processus est très rapide. Il ne dure que quelques semaines, au début du printemps.



### LA TAILLE DES ARBRES


La hauteur des arbres varie de quelques centimètres à plus d'une centaine de mètres. La hauteur d'un arbre ne dépend pas uniquement de son espèce. Elle varie aussi selon son âge et le milieu dans lequel il pousse. En effet, un arbre qui, sous des conditions favorables, croît au-delà de trois mètres de hauteur, peut très bien ne rester qu'un arbuste dans un environnement moins propice à sa croissance.

Dans un environnement propice et sans contraintes, l'arbre atteint la **hauteur maximale** propre à son espèce.




### ARBUSTES ET ARBRISSEAUX

Les arbustes sont des arbres de petite taille. Leur hauteur maximale est d'environ trois mètres. Ce sont soit des plantes arrivées à maturité, soit de jeunes arbres destinés à dépasser cette limite. Les arbustes sont fréquemment utilisés en horticulture pour l'ornement des jardins ou pour la réalisation de haies végétales. Dans la nature, ils poussent à l'ombre des grands arbres des forêts, ou ils forment des fourrés dominant les plantes herbacées des savanes. Ils peuvent avoir un tronc unique, comme l'aulne blanc. Les arbustes dont le tronc est ramifié dès la base, comme le lilas, sont appelés arbrisseaux.



Le **lilas** est un arbrisseau cultivé comme plante d'ornement dans les parcs et les jardins. Ses fleurs, très odorantes, peuvent être mauves, blanches ou roses.




## DES ARBRES D'EXCEPTION

Le plus grand arbre vivant est un séquoia de Californie (*Sequoia sempervirens*) de 115,55 m de hauteur baptisé Hyperionun. Cet arbre est situé dans le parc du nord de la Californie.

L'arbre vivant le plus volumineux est un séquoia géant (*Sequoiadendron giganteum*) baptisé General Sherman. Cet arbre, situé en Californie, mesure 84 m de hauteur et son volume est estimé à environ 1 480 m<sup>3</sup>.

L'arbre le plus petit est le saule herbacé (*Salix herbacea*), qui, malgré son nom, possède bien une tige ligneuse. Il pousse en montagne et dans les régions polaires, et ne mesure que quelques centimètres de hauteur.

Les **séquoias** comptent parmi les arbres les plus grands et les plus volumineux. Ces conifères hors normes peuvent vivre pendant plus de 3 000 ans.



Le **saule herbacé** est un arbre miniature composé d'une tige ligneuse et de quelques feuilles encadrant un groupe de fleurs ou de fruits. Il fait partie du tapis végétal des régions froides, la toundra.


# Les hormones végétales

*Des régulateurs chimiques*

Les hormones sont des substances chimiques qui circulent dans les organismes vivants et qui régulent leur fonctionnement. Les hormones végétales, ou phytohormones, sont des hormones fabriquées par les plantes. Elles sont souvent transportées dans la sève, comme les hormones humaines sont transportées dans le sang. Véritables signaux chimiques émis par une cellule à destination d'une autre, les hormones végétales agissent en modifiant l'activité du tissu cible, par exemple en stimulant la division des cellules. Elles coordonnent ainsi le développement de la plante.

## LE MÉCANISME D'ACTION DES HORMONES VÉGÉTALES

Certaines hormones agissent dans le tissu même où elles ont été produites. D'autres sont transportées vers un tissu cible, généralement par les vaisseaux conducteurs de sève. Par exemple, les hormones du groupe des cytokinines sont fabriquées à l'extrémité des racines ①. Elles sont transportées dans les vaisseaux du xylème ② vers les feuilles ③, où elles stimulent la division cellulaire ④.



## LES PRINCIPALES HORMONES VÉGÉTALES

Les hormones végétales les plus étudiées sont l'éthylène, l'acide abscissique et les hormones des groupes des auxines, des cytokinines et des gibbérellines. D'autres phytohormones ont été découvertes récemment, comme les brassinolides, qui favorisent la division des cellules pendant la croissance, et l'acide salicylique, qui stimule les défenses de la plante contre les maladies.


### LE RÔLE DES PRINCIPALES HORMONES VÉGÉTALES

<b>auxines</b>	Elles favorisent la croissance du bourgeon terminal et inhibent la croissance des bourgeons axillaires, inhibent la chute des feuilles et des fruits, stimulent le développement des fruits et sont impliquées dans le phototropisme.
<b>cytokinines</b>	Elles favorisent la multiplication des cellules et ralentissent le vieillissement des feuilles.
<b>éthylène</b>	Il déclenche la maturation de certains fruits, le vieillissement des feuilles et des fleurs et la chute des feuilles et des fruits (abscission).
<b>acide abscissique</b>	Il est responsable de la fermeture des stomates quand la plante manque d'eau et inhibe la germination des graines. Contrairement à ce que son nom suggère, l'acide abscissique n'est pas impliqué dans la chute des feuilles et des fruits (abscission).
<b>gibbérellines</b>	Elles favorisent l'allongement des tiges, déclenchent la germination des graines et stimulent la floraison de certaines plantes.

# Les tropismes


## La croissance sous influence extérieure

La croissance des plantes est régie par des hormones végétales, qui circulent à l'intérieur de la plante, mais elle subit aussi l'influence de facteurs extérieurs. L'orientation de la croissance dans une direction donnée en réponse à une stimulation externe s'appelle un tropisme. Il existe plusieurs types de tropismes, selon la nature de la stimulation. Le gravitropisme répond à la force de gravité, l'hydrotropisme à l'humidité, le phototropisme à la lumière et le thigmotropisme à un contact. Si la plante pousse en direction de la source de stimulation, le tropisme est positif. Dans le cas contraire, il est négatif.



### LE GRAVITROPISME

Le gravitropisme, ou géotropisme, désigne l'orientation de la croissance de la plante en réponse à la force de gravité. Les tiges poussent en s'éloignant du centre de gravité de la Terre (gravitropisme négatif). La racine principale, au contraire, pousse habituellement vers le bas, en direction du centre de gravité terrestre (gravitropisme positif).



Les **racines** poussent vers les endroits les plus humides (hydrotropisme positif).

racine principale

jeune pousse de haricot

### LE THIGMOTROPISME

Lorsque la zone de croissance située à l'extrémité d'une tige touche un objet, la croissance est bloquée localement; la tige se courbe alors vers l'objet. Cette réaction, appelée thigmotropisme, est remarquable chez les plantes grimpantes comme le liseron, dont les tiges peuvent s'enrouler autour d'un tuteur.



liseron

tuteur




champ de tournesols

### LE PHOTOTROPISME

Le phototropisme est une réaction de la plante par rapport à une source de lumière. Les tournesols doivent leur nom au fait que leurs fleurs sont orientées face au soleil, quelle que soit l'heure du jour (phototropisme positif). Les racines, elles, poussent à l'obscurité (phototropisme négatif).

### LA NUTATION

Indépendamment de toute stimulation extérieure, l'extrémité de la tige des plantes se développe en décrivant une spirale : ce mouvement est appelé nutation. La nutation est imperceptible, à moins de filmer la plante pendant plusieurs heures et de visualiser le film à vitesse rapide. Cependant, les plantes dites volubiles, comme le liseron, effectuent une nutation de grande amplitude, la circumnutation : la tige pousse en balayant l'espace. Si elle rencontre un support, elle peut réagir en s'y enroulant.




L'extrémité de la tige des plantes pousse en décrivant une **spirale**.



Des déserts aux régions polaires en passant par les forêts et les océans, **chaque milieu possède une flore caractéristique**, adaptée aux conditions environnementales, au climat et au relief. Tandis que, dans les régions arides, des plantes se gorgent d'eau pour résister aux périodes de sécheresse, celles des milieux humides emmagasinent de l'air dans leurs tissus. À l'échelle du globe, les végétaux composent une formidable mosaïque. **Une mosaïque fragile**, constamment menacée par les activités humaines.





# Les plantes et leur milieu

- 82 **Les formations végétales**  
*Une mosaïque de paysages naturels*
- 84 **La forêt équatoriale**  
*Une forêt foisonnante de vie*
- 86 **Les savanes**  
*Le domaine des hautes herbes*
- 88 **Les forêts tempérées**  
*Des feuillus et des conifères*
- 90 **Les plantes succulentes**  
*Des plantes adaptées aux milieux secs*
- 92 **Les plantes aquatiques**  
*Des plantes capables d'emmagasiner l'air*
- 94 **Les aires protégées**  
*La conservation des espèces*









# Les formations végétales


*Une mosaïque de paysages naturels*

Une formation végétale correspond à une communauté d'espèces végétales parmi lesquelles certaines prédominent et déterminent un paysage caractéristique. On distingue par exemple la forêt, peuplée de grands arbres, de la prairie, composée de plantes herbacées. Les principales formations végétales peuvent être nuancées selon les conditions locales. La steppe, par exemple, est une forme de prairie semi-aride. À l'échelle de la planète, les botanistes distinguent 225 formations végétales différentes.

## LES PRINCIPALES FORMATIONS VÉGÉTALES DANS LE MONDE

La végétation varie selon le climat et la nature du sol. On distingue huit formations végétales principales réparties autour de la planète.

FORMATIONS VÉGÉTALES	
	toundra
	forêt boréale
	forêt tempérée
	prairie tempérée
	forêt tropicale humide
	savane
	désert
	maquis



La **forêt boréale** est une vaste étendue forestière composée principalement de conifères, mais où poussent aussi quelques feuillus.




La **forêt tropicale humide** est une forêt dense parmi les plus riches en biodiversité, qui croît grâce à des précipitations abondantes et régulières.




La **prairie tempérée** est une zone herbacée pratiquement dépourvue d'arbres, où prédominent les graminées, dans des régions où l'hiver est relativement sec et froid.



La **forêt tempérée** est composée principalement de feuillus, parmi lesquels des chênes, des frênes et des hêtres.




La **toundra** est une formation végétale des régions froides et arides, constituée de mousses, de lichens, d'herbes, de buissons et d'arbres nains.




Des herbes courtes composent la **steppe** qui s'étend au pied des montagnes du Caucase.



Le **maquis** est un paysage végétal aujourd'hui dégradé, composé d'arbustes à feuilles persistantes, adaptés à la sécheresse estivale.



Le **désert** est une région très aride où les précipitations sont inférieures à 250 mm par an et où la végétation est rare.



La **savane** est une étendue herbacée où prédominent les graminées de grandes dimensions et les arbustes, dans des régions chaudes marquées par une saison des pluies.

# La forêt équatoriale

*Une forêt foisonnante de vie*

La forêt équatoriale, ou forêt tropicale humide, est une forêt dense qui recèle une incroyable biodiversité. Bien qu'elle ne couvre que 7 % des terres émergées de la planète, la forêt équatoriale abrite la moitié des espèces vivantes. On y trouve 20 fois plus d'espèces d'arbres que dans la forêt tempérée.

## UNE FORÊT ÉTAGÉE


Les régions équatoriales sont soumises au climat tropical humide, caractérisé par une chaleur et une humidité constantes. Les espèces végétales qui peuplent la forêt équatoriale bénéficient ainsi de conditions atmosphériques très favorables à leur croissance. Cependant, la luminosité, indispensable à la photosynthèse, varie selon l'étage de la forêt. Des arbres gigantesques, comme des ficus, s'élèvent à plusieurs dizaines de mètres de hauteur. Leurs feuillages forment l'étage supérieur de la forêt, la canopée, qui absorbe la plus grande partie du rayonnement solaire. Les espèces du sous-bois (palmiers, fougères, etc.) demeurent à l'abri de la lumière et du vent.

Dans les régions équatoriales, le jour et la nuit sont d'égale longueur tout au long de l'année. Cette **luminosité** régulière favorise la croissance des végétaux.

La **canopée** est l'étage supérieur de la forêt, situé entre 30 et 45 m de hauteur. Elle abrite la majorité des espèces végétales et animales.



Ne pouvant pas s'enraciner profondément dans le sol, les arbres sont souvent étayés par de puissantes racines aériennes, appelées **racines-contreforts**, qui entourent la base de l'arbre et la renforcent.

Le **sol** n'a pas le temps de s'épaissir et de s'enrichir, car la matière végétale décomposée est très rapidement réutilisée par les autres plantes.



## LA RÉPARTITION DE LA FORÊT ÉQUATORIALE

L'Asie du Sud-Est et les bassins fluviaux de l'Amazonie, en Amérique du Sud, et du Congo, en Afrique, soumis au climat tropical humide, sont occupés par de vastes forêts équatoriales.



Culminant à plus de 60 m de hauteur, des **arbres émergents** servent de supports à de longues lianes et à divers épiphytes (plantes qui poussent sur un autre végétal).

Les **feuilles**, spécialisées dans la captation de la lumière, sont concentrées au sommet des arbres, exposées à l'ensoleillement.

La forêt équatoriale compte en moyenne plus de 40 **espèces d'arbres** différentes par hectare.

L'étage du **sous-bois** reçoit 100 fois moins de lumière solaire que le sommet de la canopée. L'ombre y est constante et la végétation relativement peu abondante.



Les **épiphytes**, comme certaines plantes de la famille des Broméliacées, poussent sur un autre végétal sans pour autant le parasiter. Elles s'alimentent de l'eau de l'atmosphère humide ou de la pluie, et absorbent les sels minéraux transportés par la pluie.


# Les savanes

*Le domaine des hautes herbes*

Les savanes sont des formations herbeuses qui couvrent de vastes régions de la zone intertropicale. Elles sont caractérisées par des graminées de grande taille, parmi lesquelles sont dispersés des arbres et des arbustes. On distingue plusieurs types de savanes en fonction de la quantité et de la taille des arbres qu'on y trouve.

## LES PLANTES DE LA SAVANE

Les savanes se développent dans des régions soumises à un climat tropical à deux saisons, l'une humide, l'autre sèche. On y trouve principalement des graminées, dont la plupart possèdent une tige souterraine chargée de réserves nutritives (rhizome), qui leur permet de perdurer enfouies dans le sol pendant la saison sèche. Les arbres de la savane sont généralement de taille modeste, dépassant rarement 15 m de hauteur. Leur écorce est souvent épaisse, leurs feuilles caduques et leur tronc ramifié et tortueux.



L'**acacia** est un petit arbre épineux très résistant à la sécheresse. Sa sève sert à la fabrication de la gomme arabique, un liquide utilisé comme liant dans des préparations alimentaires ou dans des peintures.



L'**arbre à saucisses** (*Kigelia africana*), originaire des savanes arbustives d'Afrique de l'Est, possède de gros fruits bruns et allongés semblables à des saucisses, mais dont la pulpe n'est pas comestible.



Arbres emblématiques de la savane africaine, les **baobabs** stockent de l'eau à l'intérieur de leur tronc pendant la saison sèche.




La famille des Graminées, qui domine les savanes, regroupe près de 12 000 espèces, dont ***Imperata cylindrica***.

## LA SAVANE HERBEUSE

Dépourvue d'arbres, la savane herbeuse est composée de hautes herbes, de 80 cm à plusieurs mètres de hauteur, principalement des graminées.

## LES SAVANES DANS LE MONDE

Les savanes se développent dans des régions chaudes marquées par l'alternance entre une saison sèche et une saison des pluies (Brésil, Amérique centrale, Afrique, Asie du Sud-Est et nord de l'Australie).



## LES DIFFÉRENTS TYPES DE SAVANES


Les savanes sont des formations végétales intermédiaires entre les forêts équatoriales et les déserts subtropicaux. On distingue trois principaux types de savanes : les savanes herbeuse, arbustive et arborée.

### LA SAVANE ARBORÉE

La savane arborée est située aux abords de la forêt équatoriale. Elle comprend des arbres plus nombreux et plus grands, comme le baobab.

### LA SAVANE ARBUSTIVE

Dans la savane arbustive, quelques végétaux ligneux côtoient les hautes herbes. Ce sont des arbustes, isolés ou groupés en fourrés, et de petits arbres comme l'acacia.



# Les forêts tempérées

*Des feuillus et des conifères*

Les régions tempérées sont marquées par la succession de quatre saisons bien distinctes. En été, les plantes bénéficient de conditions favorables à leur croissance, tandis qu'en hiver, elles entrent dans un état de vie ralentie par manque d'eau et de lumière. Les arbres à feuilles caduques et les conifères, qui résistent bien à ces conditions climatiques, composent la forêt tempérée. Comme le climat des latitudes moyennes est très nuancé d'une région à l'autre, notamment à cause du relief ou des courants océaniques, on distingue plusieurs types de forêts tempérées, selon la proportion de conifères qu'on y trouve.

## LES TYPES DE FORÊTS TEMPÉRÉES




### LA FORÊT DE FEUILLUS

La forêt de feuillus, ou forêt tempérée au sens strict, est dominée par les arbres à feuilles caduques. Elle se développe dans les régions où l'été est chaud et où l'hiver est relativement froid. Sous les branches de grands arbres, comme des chênes et des hêtres, le couvert végétal du sous-bois est généralement dense, constitué de plantes herbacées de quelques dizaines de centimètres de hauteur. Ce sont principalement des herbes vivaces, c'est-à-dire capables de survivre d'une année à l'autre grâce à des réserves nutritives souterraines (bulbes ou rhizomes).



### LA FORÊT BORÉALE


Aussi appelée taïga, la forêt boréale est une forêt de conifères. Elle recouvre une grande partie de l'Amérique du Nord, le nord de l'Europe et de l'Asie et de nombreuses régions montagneuses. L'hiver y est généralement froid et un manteau neigeux recouvre le sol pendant une grande partie de l'année. Très peu d'espèces d'arbres sont capables de résister à de telles conditions. La forêt boréale est donc une forêt très uniforme, composée d'épicéas (épinette), de mélèzes et de sapins.



### LA FORÊT MIXTE



Composée d'arbres à feuilles caduques, comme des bouleaux et des saules, et de conifères, elle constitue une zone de transition entre la forêt de feuillus et la forêt boréale.

En automne, les arbres à feuilles caduques se distinguent des conifères par leurs feuilles qui changent de **couleurs** avant de tomber.



# LA RÉPARTITION DES FORÊTS TEMPÉRÉES DANS LE MONDE

La plupart des forêts tempérées se trouvent dans l'hémisphère Nord.




## L'INFLUENCE OCÉANIQUE

Les arbres à feuilles caduques cèdent la place aux conifères à mesure qu'on s'approche du pôle Nord. Cette répartition des forêts tempérées selon la latitude est nuancée par l'influence des courants océaniques, comme le Gulf Stream. Le Gulf Stream est un courant chaud venu du golfe du Mexique. Après avoir baigné les côtes américaines, il traverse l'Atlantique Nord en réchauffant les masses d'air froid arctique qu'il rencontre. Le Gulf Stream est largement responsable de la différence de climat, et par conséquent de végétation, entre l'Amérique du Nord, où seuls des conifères résistent à l'influence du froid polaire, et l'Europe occidentale, où le temps doux et humide permet une plus grande diversité d'espèces végétales.

## L'ÉTAGEMENT DES FORMATIONS VÉGÉTALES SELON L'ALTITUDE

Le type de végétation varie selon la température et la pluviosité, paramètres qui dépendent de la latitude, mais aussi de l'altitude. En gravissant une montagne, on traverse la même succession de formations végétales qu'en se déplaçant des tropiques vers les pôles.



# Les plantes succulentes

*Des plantes adaptées aux milieux secs*

Soumises au manque d'eau et à des facteurs aggravants comme de très hautes températures ou des vents desséchants, les plantes des milieux secs présentent diverses adaptations à leur environnement. Elles disposent généralement d'organes gorgés d'eau, appelés organes succulents, qui leur permettent de faire face à l'aridité. Les plantes qui possèdent de telles réserves d'eau sont appelées plantes succulentes.

## L'EAU, UNE RESSOURCE PRÉCIEUSE

De très nombreuses familles de plantes comptent des succulentes dans leurs rangs. Cependant, les Cactées sont les plantes succulentes par excellence. On dénombre environ 2 000 espèces de cactus, originaires pour la plupart d'Amérique du Nord et du Sud. Certains cactus peuvent emmagasiner près de 3 000 litres d'eau dans leur tige, ce qui leur permet de survivre entre deux averses, soit parfois pendant plusieurs années. Les feuilles des plantes succulentes sont généralement de petites dimensions, ce qui limite l'évaporation de l'eau. Bien souvent, les bourgeons foliaires ne se développent pas et restent réduits à l'état d'épines. Lorsque les feuilles sont très réduites, la photosynthèse, mécanisme grâce auquel la plante fabrique sa nourriture, est assurée par la tige elle-même.

Le **coussin de belle-mère** fait partie des cactus, ou Cactées, une famille de plantes à tige succulente.

La **tige chlorophyllienne** possède de la chlorophylle, un pigment qui permet de capter l'énergie lumineuse et de réaliser la photosynthèse.

La transformation des feuilles en **épines** permet de limiter les pertes d'eau.



## DES PLANTES TOUT EN RONDEURS

Les plantes des milieux arides présentent souvent des formes arrondies et ressemblent à des chandeliers (saguaro géant), à des raquettes (figuier de Barbarie) ou à des tonneaux (coussin de belle-mère). Cette géométrie a l'avantage d'offrir un grand volume interne tout en minimisant la surface d'échange avec l'air sec extérieur. Les cannelures qui ornent la tige, quant à elles, permettent d'abriter la plante un tant soit peu des rayons du soleil.



Les raquettes que forme la tige du **figuier de Barbarie**, cactus originaire d'Amérique tropicale, sont comestibles. Elles se mangent crues ou se cuisinent comme un légume.



Le duvet blanchâtre qui recouvre les feuilles succulentes de la **kalanchoe tomenteuse** isole la plante contre la chaleur excessive.



Contrairement aux apparences, l'**euphorbe résinifère** ne fait pas partie de la famille des Cactées. Soumise aux mêmes contraintes environnementales, elle a cependant évolué de façon semblable à un cactus.



Le **saguaro géant** est un des plus grands représentants de la famille des Cactées. Il peut mesurer jusqu'à 12 m de hauteur.


### COUPE D'UN CACTUS COUSSIN DE BELLE-MÈRE

La **cuticule cireuse** forme un revêtement étanche qui imperméabilise la tige et parfois les feuilles.

La majeure partie de la tige est constituée de **parenchyme aquifère**, un tissu permettant d'emmagasiner de grandes quantités d'eau.

Les **tissus conducteurs**, spécialisés dans le transport de la sève, sont disposés au centre de la tige.

De longues racines déployées juste sous la surface du sol, appelées **racines traçantes**, permettent de collecter, sur une vaste étendue, la moindre trace d'humidité (eau de pluie, rosée, brouillard). Ce type de racine est fréquent chez les plantes des milieux les plus arides.



# Les plantes aquatiques

*Des plantes capables d'emmagasiner l'air*

Les plantes aquatiques vivent partiellement ou totalement immergées dans l'eau. Les parties immergées sont généralement dépourvues de revêtement imperméable, ce qui permet l'absorption directe de l'eau et des nutriments qu'elle contient. L'oxygène et le gaz carbonique sont en revanche des ressources plus difficiles à obtenir, car ce sont des gaz peu solubles dans l'eau. Pour pallier la rareté de ces gaz, les plantes aquatiques renferment dans leurs tissus des réserves d'air qui facilitent les échanges gazeux et assurent la flottabilité.

## LE NYMPHÉA

Le nymphéa n'est que partiellement immergé. Ses grandes feuilles arrondies, de 25 cm de diamètre environ, s'étalent à la surface de l'eau. Leur face supérieure est recouverte d'une cuticule cireuse sur laquelle l'eau ruisselle sans perturber l'aération de la feuille. Les fleurs aussi sont aériennes. Elles possèdent plusieurs dizaines de pétales colorés et, chez certaines espèces, elles sécrètent un nectar très parfumé. Elles assurent la reproduction sexuée du nymphéa. Une fois fécondées, elles libèrent des graines directement dans l'eau. Transportées par les courants ou par les animaux de l'écosystème aquatique, comme les canards, les graines germent dans l'eau et donnent naissance à un nouvel individu. Le nymphéa se reproduit aussi efficacement par multiplication végétative : de nouvelles pousses apparaissent régulièrement sur son rhizome.



Le rhizome du **nymphéa** s'enracine dans la vase sous 1 m d'eau en moyenne.



Les **fleurs** du nymphéa flottent ou s'élèvent de quelques centimètres au-dessus de l'eau.

**pédoncule de la fleur**


Les **pétioles** des feuilles sont très longs et très flexibles. Totalement immergés, ils émanent du rhizome.

Le **rhizome** est une tige souterraine qui fixe la plante au fond du bassin et permet sa multiplication végétative.

Des **racines adventives**, issues du rhizome, contribuent à la fixation et à la nutrition de la plante.


La face supérieure de la feuille de nymphéa est recouverte d'une cuticule imperméable. Elle est ponctuée de minuscules pores, les **stomates**, qui permettent les échanges gazeux avec l'atmosphère.

Les **sclérites** sont des cellules épineuses dont la paroi rigidifiée assure un léger soutien de la feuille sans pénaliser sa flottaison.




Complètement immergée, la **face inférieure** de la feuille est dépourvue de stomates.

Des espaces remplis d'air, appelés **lacunes**, facilitent l'approvisionnement de la plante en oxygène et en gaz carbonique.



Chez le nymphéa, comme chez de nombreuses plantes aquatiques, les **feuilles** sont émergées.

Le **nymphéa** vit en eau douce, dans les étangs, les lacs ou dans les rivières à faible courant.



jeune feuille

## L'ÉLODÉE

L'élodée du Canada est une plante aquatique entièrement immergée. Ses longues tiges portent de nombreuses feuilles ovales. Flexibles, elles sont capables de ployer ou de s'étirer au gré des courants. L'élodée vit dans les milieux aquatiques ou dans les marais et elle est cultivée dans les aquariums. Très envahissante, elle tend à supplanter les autres espèces du bassin dans lequel elle pousse. Elle est cependant très utile en aquarium parce qu'elle assure l'oxygénation de l'eau en libérant de l'oxygène lors de la photosynthèse et parce qu'elle empêche la prolifération des algues qui pourraient troubler l'eau.

L'**élodée du Canada** est une plante fréquemment utilisée dans les aquariums.



# Les aires protégées

*La conservation des espèces*

Depuis près de deux siècles, l'intensification des activités humaines a gravement accéléré le rythme d'extinction des espèces végétales et animales à la surface du globe. Aujourd'hui, quand une nouvelle espèce apparaît, 1 000 autres s'éteignent. Les aires protégées sont des espaces dans lesquels des mesures plus ou moins strictes sont prises pour préserver la biodiversité. Depuis la création du premier parc national américain, Yellowstone, en 1872, le nombre d'aires protégées a augmenté de manière exponentielle, pour dépasser aujourd'hui 100 000.


## DES MILLIONS DE KILOMÈTRES CARRÉS PROTÉGÉS

Dans les aires protégées, les activités humaines telles que l'abattage des arbres, l'exploitation des rivières et même la promenade sont réglementées afin de préserver les écosystèmes. Certaines aires protégées sont gigantesques : la plus vaste, le Parc national du Groenland, s'étend sur 972 000 km<sup>2</sup>. Les plus petites, ne dépassant pas 10 km<sup>2</sup>, sont des terrains privés que leurs propriétaires se sont engagés à préserver.

En 2003, l'Union internationale pour la conservation de la nature (IUCN) recensait 102 102 aires protégées, couvrant plus de 18 millions de km<sup>2</sup>. Ces aires protégées sont classées en sept catégories (Ia, Ib, II, III, IV, V et VI) selon le degré d'intervention humaine. D'autres sites sont protégés dans le cadre de programmes de l'ONU : ce sont les Réserves de la biosphère et les sites du Patrimoine mondial.

### LES CATÉGORIES D'AIRES PROTÉGÉES

<b>Ia</b>	<b>Réserves naturelles intégrales</b> , dédiées à l'étude scientifique d'écosystèmes non altérés par l'homme.
<b>Ib</b>	<b>Zones de nature sauvage</b> , préservées dans leur strict état naturel.
<b>II</b>	<b>Parcs nationaux</b> , où des visiteurs sont admis dans le respect des écosystèmes naturels.
<b>III</b>	<b>Monuments naturels</b> , protégés pour leur caractère unique mais accessibles sans restrictions.
<b>IV</b>	<b>Aires de gestion des habitats ou des espèces</b> , où l'homme intervient pour maintenir l'équilibre de l'écosystème.
<b>V</b>	<b>Paysages terrestres ou marins protégés</b> , destinés à conserver des paysages naturels modelés par l'homme au fil du temps.
<b>VI</b>	<b>Aires protégées de ressources naturelles gérées</b> , exploitées par les populations locales dans une perspective de développement durable.




Au sud du **Parc national du Groenland**, en été, la glace cède la place à une végétation rase et fragile, la toundra.



**Parc national de Yellowstone (États-Unis)**



 zones à risque

## LES ZONES À RISQUE

Les régions de la zone intertropicale sont celles où les végétaux sont le plus menacés. Si la biodiversité y est élevée, le nombre d'individus d'une espèce donnée est souvent relativement faible. Certaines espèces d'arbres de la forêt équatoriale n'ont qu'un seul représentant par hectare, et sont donc plus vulnérables. D'autre part, de nombreuses plantes tropicales sont endémiques, c'est-à-dire qu'elles ne poussent que dans une région particulière de la planète. La dégradation des écosystèmes tropicaux risque d'entraîner la disparition définitive des espèces endémiques qu'ils abritent.

## LES ESPÈCES MENACÉES D'EXTINCTION

Environ 15 500 espèces, dont plus de 8 300 espèces végétales, sont menacées de disparition à cause de la pollution, de la déforestation, de l'agriculture intensive, de l'urbanisation ou encore de l'exploitation minière. La plupart des végétaux menacés sont des plantes à fleurs, puisque c'est le groupe qui comprend le plus d'espèces. Mais les mousses, les lichens, les fougères et les conifères sont aussi touchés, proportionnellement au nombre d'espèces qu'ils regroupent.



*Impatiens letouzeyi*, une plante découverte au Cameroun au cours des années 1970, est menacée de disparaître à cause de la construction d'un réservoir qui pourrait inonder son habitat naturel.




Affecté par la pollution de l'air, l'*érioderme boréal* a complètement disparu de Norvège et de Suède, et il ne subsiste plus que dans l'est du Canada. La disparition complète de ce lichen semble aujourd'hui inévitable.



L'*arbre concombre* est un arbre qu'on ne trouve qu'au Yémen. Bien qu'adapté aux régions arides, il est décimé lors des périodes de sécheresse, car il est alors coupé pour servir de nourriture au bétail.



Le *ginkgo* est le seul survivant d'une famille de plantes apparue il y a plus de 150 millions d'années. Cultivé depuis des siècles, il n'existe plus à l'état sauvage qu'en Chine.




L'écosystème environnant les chutes Victoria, au Zimbabwe, est classé **Monument naturel**.




La flore et la faune exceptionnelles de la région de Ngorongoro, en Tanzanie, sont inscrites au **Patrimoine mondial**.



La région semi-désertique d'Uluru, en Australie, est protégée à titre de **Réserve de la biosphère**. Environ 350 personnes peuplent la réserve, mais 500 000 la visitent chaque année. Il existe plus de 440 Réserves de la biosphère dans le monde, où l'homme tente de concilier la préservation et l'exploitation de la nature.



Crus, cuits, séchés, infusés ou fermentés, en purée, en soupe ou en salade... **Apprêtés de mille et une façons**, les végétaux font partie de l'alimentation humaine depuis des millénaires. Répandues grâce au développement de l'agriculture, il y a environ 12 000 ans, les céréales sont aujourd'hui **les aliments les plus consommés partout dans le monde**. Les fruits, les graines, les tiges, les feuilles et les racines de plantes très diverses font aussi partie de notre menu, agrémentés d'une grande variété d'épices, d'huiles et d'extraits végétaux en tous genres.





# Les plantes alimentaires

- 98 **Les légumes**  
*Les plantes potagères*
- 103 **Les fruits**  
*Des aliments sucrés riches en vitamines*
- 106 **Les céréales**  
*À la base de l'alimentation humaine*
- 108 **Algues et champignons comestibles**  
*Des textures et des saveurs variées*
- 109 **Les herbes et les épices**  
*Des plantes pour tous les goûts*
- 110 **Les ingrédients d'origine végétale**  
*Des extraits végétaux savoureux*
- 112 **Les boissons**  
*Infusions et alcools*


# Les légumes

*Les plantes potagères*


Les légumes sont des végétaux utilisés comme aliments. Une façon simple de classer les légumes consiste à les regrouper selon la partie de la plante qui est consommée. Certains organes de réserves nutritives des plantes sont utilisés comme légumes : les légumes bulbes, comme l'ail, entrent dans l'assaisonnement des plats, et les légumes tubercules, dont la pomme de terre, sont parmi les aliments les plus consommés dans le monde. Les tiges, les feuilles et les racines, qui forment l'appareil végétatif des plantes, constituent aussi des aliments très nutritifs. Les légumes fleurs les plus courants sont en fait des inflorescences, comme le chou-fleur. Les légumes fruits sont nombreux et présentent des formes et des consistances variées.

## LES LÉGUMES FRUITS

Les légumes fruits sont aussi bien des fruits charnus, comme la tomate, que des fruits secs, comme le haricot vert. Le goût des légumes fruits est généralement peu sucré. Les fruits sucrés des plantes constituent une autre catégorie d'aliments : les fruits.




Il existe des dizaines d'espèces de **poivrons**. Les poivrons verts sont cueillis avant pleine maturité et deviennent rouges en mûrissant.



La **tomate** est un fruit charnu qui renferme de nombreuses graines (pépins). Originaires d'Amérique centrale, elle est aujourd'hui l'un des ingrédients les plus universels.



La gousse de **haricot** est cueillie verte, avant maturité, et sert généralement de légume d'accompagnement.



L'**avocat** est un fruit charnu contenant une graine unique, communément appelée noyau.

Le **concombre** est un fruit très rafraîchissant du fait de sa forte teneur en eau. Les variétés européennes sont longues, tandis que les variétés américaines sont plus trapues.



## LES LÉGUMES TIGES

Les tiges sont consommées avec ou sans les feuilles qu'elles portent. Les légumes tiges sont bien souvent cuits, car ils sont trop fermes pour être mangés crus.



Les tiges et les feuilles du **céleri** sont consommées tout comme sa racine (céleri-rave).



On consomme les pousses de **bambou** en Asie depuis des milliers d'années, ainsi que les feuilles, le cœur et le liquide sucré qui s'écoule des tiges entaillées.

L'**asperge** est cueillie au printemps lorsqu'elle est jeune, tendre et charnue.



## LES LÉGUMES FEUILLES

Les légumes feuilles sont habituellement verts, car ils contiennent un pigment vert, la chlorophylle. Il existe une très grande diversité de légumes feuilles, des plus surprenants, comme les feuilles d'ortie, au plus commun, comme le chou.



Il existe plus de 100 variétés de **laitues**, comme la laitue beurre, aux feuilles larges et tendres.



Le **chou** fait partie de la même famille de plantes que le brocoli, le chou de Bruxelles, le chou-rave ou encore le chou-fleur.



Les feuilles d'**ortie** perdent leur caractère irritant dès qu'elles sont cuisinées, le plus souvent en soupe.



L'**épinard** cru est une excellente source d'acide folique, de vitamine A, de potassium et de magnésium.

## LES LÉGUMES RACINES

Les légumes racines sont des racines gonflées de réserves nutritives accumulées par la plante. Ils sont consommés crus, râpés, mijotés ou réduits en purée.

La **betterave**, très riche en sucre, peut être mangée crue ou cuite.



Les **radis** rouges sont généralement moins piquants que les noirs et leurs feuilles sont comestibles.



Le **lotus** est une plante asiatique cultivée depuis 3 000 ans. Il possède une racine croquante dont la chair est blanche et légèrement sucrée.



Les possibilités d'utilisation de la **carotte** sont presque illimitées, du hors-d'œuvre au dessert.

## Les légumes

## LES LÉGUMES FLEURS

Les fleurs comestibles sont depuis longtemps utilisées pour agrémenter des plats. Les plus connues sont les capucines et les pensées. Elles sont commercialisées dans certains marchés spécialisés seulement. Les légumes fleurs les plus courants, comme le chou-fleur et l'artichaut, sont en fait constitués d'inflorescences.




inflorescence

L'inflorescence du **chou-fleur** est consommée cuite ou en salade.



Les fleurs de la **capucine**, plante originaire d'Amérique du Sud, se consomment en salade.



bractée

capitule

Les fleurs de l'**artichaut**, réunies en capitule, constituent le foin. Elles sont recouvertes de feuilles modifiées, les bractées, dont on consomme la base charnue.


## LES LÉGUMES BULBES

Les légumes bulbes sont généralement des bulbes feuillés, c'est-à-dire formés par la superposition de feuilles modifiées gonflées de réserves nutritives. Ce sont pour la plupart des plantes du genre *Allium*, qui regroupe le poireau ainsi que plusieurs variétés d'ail et d'oignon.



Largement utilisé comme condiment, autant cuit que cru, l'**oignon** est aussi l'élément essentiel de la soupe à l'oignon.

La partie blanche (souterraine) du **poireau** est la plus appréciée, mais la verte (aérienne) parfume potages et plats mijotés.



gousse

tête d'ail

L'**ail** est l'une des plus anciennes plantes cultivées, soit depuis plus de 5 000 ans. Le bulbe ou « tête d'ail » est formé de caïeux nommés gousses.

## LES LÉGUMES TUBERCULES

Les réserves nutritives accumulées dans les tubercules sont le plus souvent des sucres, généralement sous forme d'amidon. Les légumes tubercules se conservent facilement pendant plusieurs mois. Ce sont des aliments de base dans bien des régions du monde, en particulier la pomme de terre, légume le plus consommé sur la planète.

La **pomme de terre** est le plus connu des tubercules. Cuite à la vapeur, frite ou en purée, elle est généralement servie en légume d'accompagnement. Il existe de très nombreuses variétés de pommes de terre. La qualité de la chair détermine le mode de cuisson : la Russet, par exemple, possède une chair farineuse idéale pour la friture.



All blue



Marfona blanche



Les **potatoes nouvelles** sont des pommes de terre fraîchement récoltées. Leur peau fine peut être consommée.



Desiree rouge



Russet



Aliment de base dans plusieurs pays, notamment en Amérique du Sud et dans les Antilles, l'**igname** se consomme cuite et apprêtée comme la pomme de terre.



Plus sucrée que la pomme de terre, la **patate douce** n'y est pas apparentée. La cuisine créole en fait grand usage.



La variété douce du **manioc** est consommée comme la pomme de terre, alors que la variété amère permet d'obtenir le tapioca.



Surtout apprécié en Asie, d'où il est originaire, le **crosne** est peu consommé ailleurs.

## Les légumes

### LES LÉGUMINEUSES

En botanique, le terme « légumineuse » désigne une famille de plantes dont le fruit est une gousse. Leurs graines constituent la catégorie alimentaire des légumineuses, ou légumes secs, qui comprend notamment les haricots, les lentilles, les fèves, les sojas et les arachides.

Très nourrissantes, les légumineuses sont consommées sous forme de graines fraîches, séchées, germées, ou encore réduites en purée. Les légumineuses occupent une place importante dans l'alimentation de plusieurs peuples, notamment en Afrique du Nord, en Amérique latine et en Asie. Les protéines des légumineuses diffèrent des protéines de la viande, car elles contiennent des quantités moindres de certains acides aminés (composants de base des protéines). La plupart des légumineuses sont d'excellentes sources de fer et de magnésium et constituent une source très élevée de fibres alimentaires.



Les graines fraîches ou séchées du **haricot d'Espagne** se préparent comme celles du haricot rouge.




Le **haricot rouge** est l'un des plus connus. Il entre dans la composition du chili con carne, d'origine mexicaine. Comme il garde bien sa forme, on le met souvent en conserve.




Le **haricot mungo** à grains noirs est très apprécié en Asie, où il est à la base d'une sauce noire bien connue. En Inde, on l'utilise avec du riz pour préparer une galette et une purée épicée.



Les graines de **luzerne** germées peuvent être ajoutées crues aux salades et sandwiches.



Les graines d'**arachide** (ou cacaahuètes) sont servies en amuse-gueule ou sont consommées transformées en beurre ou en huile.




Les **lentilles** sont souvent consommées en soupe. En Inde, elles sont fréquemment associées au riz.

La graine de **soja** est utilisée cuite ou germée comme les autres légumineuses. On en extrait un liquide, surnommé lait de soja, qui est utilisé notamment pour faire le tofu, une pâte riche en protéines.



Les **germes de soja** proviennent des graines non pas du soja, mais du haricot mungo.



graines de soja



lait de soja



tofu


# Les fruits

## Des aliments sucrés riches en vitamines


Généralement sucrés, les fruits sont consommés surtout au petit déjeuner, en collation ou au dessert. Ils sont aussi très utilisés en pâtisserie et en confiserie. Les fruits sont généralement riches en eau, en vitamines (A, B6, C...) et en minéraux (calcium, fer, magnésium...). Manger un fruit frais avec sa peau permet d'en retirer le maximum de vitamines, de fibres et de minéraux.

### QU'EST-CE QU'UN FRUIT ?

La terminologie utilisée dans le langage courant pour classer les fruits est différente de celle utilisée en botanique. Pour les botanistes, le fruit est l'organe de la plante qui contient les graines. Selon cette définition, la tomate est un fruit au même titre que la pomme. Dans le langage courant, cependant, on distingue deux classes d'aliments : les légumes fruits et les fruits, plus sucrés. Parmi ces derniers, on parle de baie pour désigner des petits fruits qui ne sont pas toujours de véritables baies, comme la fraise, qui est en fait composée de fruits secs. Enfin, les aliments communément appelés fruits secs sont des fruits charnus à enveloppe rigidifiée, comme la noix, ou des graines.



La **noix** est une drupe, c'est-à-dire un fruit charnu à enveloppe rigidifiée (coque) dont on consomme la graine. Elle sert d'amuse-gueule ou est ajoutée à divers desserts, salades, sauces ou plats principaux.



La **fraise** est un petit fruit composé de nombreux akènes (fruits secs) disposés sur un réceptacle charnu. Elle s'utilise crue ou cuite, la plupart du temps dans les desserts.

### LES « FRUITS SECS »


Souvent appelés noix, ces fruits possèdent généralement une enveloppe dure et sèche, la coque, qui renferme une graine comestible.



L'**amande** sert à préparer une pâte, des friandises (nougat, praline) et une essence qui parfume l'amaretto et divers aliments.



Fruit d'une ronce de la famille du framboisier, la **mûre** est un fruit fragile. Elle se mange fraîche ou en confiture.



Fruit de la vigne, le **raisin** est apprécié partout dans le monde, qu'il soit nature, cuit, sec ou en jus. Il sert à produire le vin.




Souvent servie en amuse-gueule, la **noix du Brésil** est aussi utilisée en confiserie, enrobée de chocolat. Elle remplace la noix de coco dans certaines préparations.

## Les fruits

## LES FRUITS À NOYAU

La chair de ces fruits, plus ou moins juteuse, entoure un noyau dur, généralement non comestible.



Essentielle dans le gâteau forêt-noire et, confite, dans le gâteau aux fruits, la **cerise** est aussi consommée fraîche.




Très riche en sucre, la **datte** est souvent vendue déshydratée. Elle est surtout incorporée dans des desserts.

## LES FRUITS À PÉPINS

Leur chair recouvre une partie centrale non comestible, le cœur, qui renferme un certain nombre de graines appelées pépins.




Appelée aussi « melon d'eau » en raison de sa teneur en eau très élevée, la **pastèque** se mange le plus souvent nature, en tranches.




D'utilisation presque aussi variée que la pomme, la **poire** est cueillie avant maturité pour éviter que sa chair ne soit granuleuse.

## LES AGRUMES

Les agrumes sont les fruits des plantes du genre *Citrus* (hormis de rares exceptions comme le kumquat, qui appartient au genre *Fortunella*). Ce sont des fruits composés de plusieurs quartiers et recouverts d'une écorce dont la couche extérieure est appelée zeste. Plutôt acides, de couleurs vives, les agrumes sont riches en vitamine C. Les agrumes sont cultivés dans des régions chaudes et ensoleillées, notamment au Brésil, dans le sud des États-Unis et sur le littoral méditerranéen. Ils comptent parmi les fruits les plus consommés au monde.



Massivement commercialisée, l'**orange** est souvent consommée nature ou en jus. On en tire de l'essence alimentaire et une huile essentielle.



Le **pomelo rose** est plus sucré et moins amer que le pomelo blanc, dont la chair est jaune. Il est souvent coupé en deux et consommé nature, à la cuillère.



Très acide, le **citron** est utilisé notamment pour parfumer diverses préparations et aviver la saveur des aliments. C'est aussi l'ingrédient de base de la limonade.




Très parfumée, la **lime** s'utilise comme le citron. Elle est un ingrédient essentiel du ceviche, un plat de poisson cru mariné.



Petit agrume de 2 à 5 cm de longueur, le **kumquat** peut être mangé tel quel, avec son écorce tendre et sucrée.

## LES FRUITS TROPICAUX

Les fruits tropicaux forment un groupe très hétérogène. Ils sont généralement cultivés dans les régions chaudes de la zone intertropicale. Certains sont devenus courants dans les pays occidentaux, comme la banane et le kiwi, tandis que d'autres, comme le tamarillo, sont principalement consommés là où ils sont produits.




La **mangue** est un fruit à noyau qui se consomme de préférence sans la peau, irritante pour la bouche.



Une fois débarrassé de son écorce, l'**ananas** est consommé nature, cuit ou en jus.



Le **tamarillo** se mange cru s'il est très mûr, sinon on le cuit souvent comme un légume. La chair de ce fruit originaire d'Amérique du Sud est ferme et acidulée.



Recouvert d'une enveloppe rougeâtre, le **litchi** possède une chair translucide, juteuse et très sucrée. Dans la cuisine chinoise, il est associé à la viande et au poisson.



Une fois épluchée, la **banane** est consommée crue, sautée, frite ou flambée au rhum.


# Les céréales

*À la base de l'alimentation humaine*

Les céréales sont à la base de notre alimentation depuis l'émergence de l'agriculture, 10 000 ans avant notre ère. Chaque continent a eu sa céréale de prédilection : le riz en Extrême-Orient, le blé et l'orge de l'Inde à l'Atlantique, le seigle et l'avoine en Europe occidentale, le maïs en Amérique, le millet et le sorgho en Afrique.

## DES GRAINS RICHES EN RÉSERVES NUTRITIVES

Les céréales sont dans leur grande majorité des plantes de la famille des Graminées, souvent cultivées à grande échelle pour leurs graines farineuses. Ces graines, ou grains, sont composées de 60 à 80 % de glucides (sucres, principalement de l'amidon), de 8 à 15 % de protéines et elles contiennent relativement peu de matières grasses. Elles renferment également des minéraux (fer, phosphore...) et des vitamines, localisées à la périphérie de la graine. Le grain des céréales (caryopse) est constitué d'une enveloppe extérieure, le son, d'un albumen et d'un germe. La structure des grains est relativement semblable d'une céréale à l'autre.




## LES PRINCIPALES CÉRÉALES CONSOMMÉES DANS LE MONDE

Les grains de céréales, utilisés tels quels ou sous forme de produits dérivés, occupent une grande place dans notre alimentation. Ils peuvent accompagner des mets principaux ou être apprêtés avec des légumes, des fruits ou des épices. Moulus ou concassés, ils servent à la fabrication de farines, de semoules ou de féculs. Les céréales les plus consommées dans le monde sont le blé et le riz.

### LE BLÉ

Un tiers de la population mondiale dépend principalement de la culture du blé. Le blé dur est riche en protéines ; il est utilisé pour la fabrication du pain et des pâtes alimentaires. Le blé tendre sert à la confection de farines à gâteaux.



## LE MAÏS

Le maïs est une céréale originaire d'Amérique cultivée pour ses grains. On en tire un sirop sucré et une huile alimentaire.



grains de maïs



épi de maïs



## L'AVOINE

L'avoine est une céréale cultivée pour ses grains, qui sert surtout à l'alimentation des chevaux; elle est également consommée par l'humain, notamment sous forme de flocons.



grains d'avoine



Les **flocons d'avoine** sont obtenus à partir de grains décortiqués, cuits et aplatis.

## LE MILLET

Le millet est utilisé comme fourrage ou pour son grain, qui sert notamment à faire des galettes et à nourrir les oiseaux domestiques.




grains de millet

## LE RIZ

On compte 8 000 variétés de riz, qui sont regroupées d'après la longueur des grains. Les utilisations du riz sont très variées. La cuisine asiatique en fait grand usage, notamment sous forme de galettes.



grains de riz



galettes de riz



# Algues et champignons comestibles

*Des textures et des saveurs variées*

Il existe environ 25 000 algues, dont seulement 50 environ sont agréables à consommer. Généralement aquatiques, les algues sont parfois appelées « légumes de mer ». Le Japon est le principal producteur, exportateur et consommateur d'algues, ce qui explique qu'on connaisse souvent les algues sous leur nom japonais.

Sur les 100 000 espèces de champignons connues, une vingtaine seulement entre en cuisine. De 1 à 2 % des espèces sont vénéneuses : elles peuvent entraîner divers maux, voire la mort, et ne doivent pas être consommées. D'autres possèdent simplement une texture ou un goût désagréables.

## LES ALGUES

La texture et la saveur des algues sont très variables. Certaines sont caoutchouteuses, d'autres sont tendres ou croquantes. Elles sont utilisées comme aliment, comme assaisonnement, comme garniture ou comme supplément alimentaire. Les algues contiennent de 40 à 60 % de glucides. Elles sont également une bonne source de minéraux, dont le calcium et l'iode. Certaines algues sont cultivées : des portions de l'algue portant des spores sont mises en cultures sur des tubes de plastique ou des cordes, dans des réservoirs d'eau de mer à température contrôlée ou en pleine mer.




Une fois trempées dans l'eau, les brindilles d'**hijiki** forment des nouilles noires légèrement croustillantes.



Le **nori** est une algue de couleur pourpre, noire quand elle est sèche, utilisée notamment en feuilles minces pour confectionner les sushis.



L'**agar-agar** est une substance extraite d'algues rouges qu'on fait fondre pour obtenir une gelée pouvant remplacer la gélatine dans certaines recettes.



La **spiruline** est une algue microscopique riche en protéines, consommée surtout comme supplément alimentaire.



La **laitue de mer** a l'apparence et la saveur des feuilles de laitue.

## LES CHAMPIGNONS

Le groupe des champignons comprend les champignons à pied bien connus, mais aussi des moisissures et des levures utilisées dans la fabrication de fromages, du pain et de la bière, notamment. Plusieurs espèces de champignons sont cultivées, comme le champignon de Paris. La technique consiste à favoriser le développement du mycélium sur du fumier naturel, du fumier synthétique (à base de foin, de paille, d'écorce, de gypse...) ou sur du bois. Certains champignons sont consommés crus, mais la plupart nécessitent une cuisson.



La **collybie à pied velouté**, très appréciée en Asie, est formée d'un minuscule chapeau et d'un long pied.



Le **champignon de Paris**, ou champignon de couche, est le plus cultivé et le plus consommé.



La **truffe** est un champignon souterrain rare et très prisé.



La **morille**, dont le chapeau est orné d'alvéoles, n'est comestible que si elle est bien cuite.

# Les herbes et les épices

*Des plantes pour tous les goûts*

Les herbes et les épices sont employées pour relever la saveur des aliments depuis des millénaires. Toutes les parties des plantes sont mises à profit. Des graines, des fruits, des tiges ou encore des rhizomes, tels quels ou réduits en poudre, servent ainsi à aromatiser des plats.

## LES FINES HERBES

Les fines herbes sont des plantes herbacées à feuilles vertes des régions tempérées, cultivées couramment dans les potagers. Ces plantes aromatiques sont utilisées fraîches ou séchées, seules ou en mélange. Ce sont le plus souvent les feuilles qui apportent la saveur, comme les feuilles de basilic, de menthe et d'aneth.



Idéal pour relever les tomates et les pâtes alimentaires, le **basilic** constitue aussi l'assaisonnement de base du pistou provençal et du pesto italien.



La **menthe** donne une saveur fraîche à de nombreux mets sucrés ou salés, dont l'agneau. Son huile essentielle aromatisé aussi friandises, liqueurs et produits divers.



Aromate très apprécié en Scandinavie, en Russie, en Europe centrale et en Afrique du Nord, l'**aneth** parfume vinaigres, cornichons, ainsi que des poissons.

## LES ÉPICES

Les épices sont des substances aromatiques provenant de plantes qui poussent dans les régions tropicales. Leur saveur est plus ou moins parfumée et piquante. Les épices sont obtenues à partir de graines (poivre, noix de muscade, cumin), de fleurs (clou de girofle, safran), de fruits (piment), de rhizomes (curcuma) ou encore d'écorces (cannelle).



La saveur piquante des **piments** provient de la capsaïcine qu'ils contiennent. Cette substance fait saliver et elle active la digestion.



La saveur de la **noix de muscade**, qui se marie bien avec les produits laitiers, s'estompe vite une fois la noix moulue. Son enveloppe rouge, le macis, s'utilise aussi comme épice.



La couleur des grains de **poivre** varie selon le stade de mûrissement. Le poivre noir est le plus piquant.



Bouton floral séché du giroflier, le **clou de girofle** est utilisé entier dans des plats mijotés ou moulu dans le pain d'épices.



Épice la plus coûteuse, le **safran** est le stigmate de la fleur de crocus, cueilli à la main et séché. Il est indispensable à la paella et à la bouillabaisse.



Le **curcuma** est tiré d'un rhizome semblable à celui du gingembre. Il est réduit en poudre après cuisson. Jaune vif, il sert à colorer la moutarde américaine.



Écorce séchée du cannellier, vendue en bâtonnet, en poudre ou en huile essentielle, la **cannelle** est souvent associée aux friandises, aux mets sucrés et aux boissons chaudes.

# Les ingrédients d'origine végétale

*Des extraits végétaux savoureux*

Les ingrédients d'origine végétale tels que les sucres, les huiles végétales et les farines sont abondamment utilisés dans l'alimentation, non seulement pour leur valeur nutritionnelle et pour leur saveur, mais aussi comme agent de texture, pour épaissir ou lier une préparation par exemple. Le cacao est lui aussi un ingrédient d'origine végétale très utilisé en cuisine, essentiellement dans les desserts et les friandises.

## LES FARINES

Les farines sont obtenues par la mouture de céréales, et parfois d'autres végétaux, comme les pommes de terre. Les caractéristiques de la céréale utilisée déterminent la farine obtenue. Ainsi, la farine de blé tendre est tout indiquée pour la confection de gâteaux, tandis que la farine de blé dur est réservée à la confection de pains et de pâtes.



Formée d'un mélange de blé dur et de blé tendre moulus, la **farine tout usage** est utilisée de façon variée, notamment pour lier les sauces et pour faire le pain et les pâtisseries.



La **farine d'avoine** ne lève pas à la cuisson. On la combine à la farine de blé pour préparer pains et autres aliments levés. Ces produits sont plutôt massifs.



On incorpore la **farine de maïs** aux crêpes, gâteaux, muffins ou pains. Pour obtenir des préparations qui lèvent, on doit la combiner à de la farine de blé.

## LES HUILES VÉGÉTALES

Les huiles végétales sont des corps gras obtenus par pressage de graines (arachide, soja, maïs) ou de fruits (olive). Le plus souvent liquides à température ambiante, les huiles végétales sont utilisées pour cuire, assaisonner, lier ou conserver des aliments. La couleur, la saveur et les propriétés nutritionnelles d'une huile végétale dépendent de la plante dont elle provient.



L'**huile d'arachide**, très résistante à la chaleur et de saveur peu prononcée, convient aussi bien aux fritures qu'aux salades.



L'huile d'olive est extraite de la **pulpe** des olives.

L'**huile d'olive**, typique des cuisines méditerranéennes, contient surtout des acides gras monoinsaturés, des molécules bénéfiques pour la santé quand elles sont consommées avec modération.



Relativement inodore et sans saveur, l'**huile de maïs** est très utilisée en Amérique du Nord, autant pour la cuisson et la friture que comme assaisonnement.

## LES SUCRES

Les sucres sont des substances alimentaires de saveur douce tirées de certains végétaux, comme la canne à sucre ou la betterave sucrière. Ils se présentent sous la forme de cristaux ou de sirops. Le miel entre aussi dans la catégorie des sucres.



La **canne à sucre** est une graminée tropicale cultivée pour ses tiges dont on extrait du sucre brut, par la suite raffiné (débarrassé de ses impuretés).



Le **sirop d'érable** est obtenu par réduction de la sève de l'érable à sucre. On l'utilise pour préparer divers desserts, arroser les crêpes ou encore cuire les œufs et le jambon.



La **mélasse** est un liquide dense et visqueux, résidu du traitement de la canne à sucre pour en extraire le sucre.




La **cassonade** est composée de fins cristaux de sucre peu raffinés qui contiennent encore de la mélasse. Son goût est plus prononcé que celui du sucre blanc.



Le **sucré granulé** est le plus couramment utilisé en cuisine. Il s'agit d'un sucre blanc, c'est-à-dire complètement raffiné, présenté en petits cristaux. Il provient de la canne à sucre ou de la betterave sucrière.



Substance fabriquée par les abeilles à partir du nectar des fleurs, le **miel** possède un pouvoir édulcorant plus élevé que le sucre.



Principalement utilisé dans la cuisine asiatique, le **sucré de palme** provient de la sève de certaines espèces de palmiers ou du jus de la canne à sucre.

## LE CACAO

Le cacao est l'ingrédient de base du chocolat. Il est extrait des fèves du cacaoyer (ou cacaotier). Les fèves sont transformées en une pâte qui est ensuite pressée afin de séparer le beurre de cacao, matière grasse jaune pâle, de la poudre de cacao. Le cacao est une excellente source de cuivre, de potassium, de vitamine B12 et de fer. Il contient aussi des excitants : la théobromine et la caféine.



graines de cacao



poudre de cacao

# Les boissons

## Infusions et alcools

De nombreuses boissons sont tirées des végétaux. Les infusions sont des boissons aromatiques extraites de grains moulus (café) ou de plantes séchées (thé, tisanes) sous l'action d'eau bouillante. Le café et le thé contiennent de la caféine, une substance stimulante qui, consommée en excès, peut provoquer une accoutumance ainsi que d'autres effets néfastes. L'action des tisanes est plus diverse et moins bien connue. Les boissons alcoolisées, quant à elles, sont issues de la fermentation des sucres contenus dans des fruits ou dans des graines. Elles contiennent de l'éthanol, une molécule responsable de leur effet psychotrope.

### LE THÉ

Le thé est la boisson la plus consommée dans le monde après l'eau. Il est préparé par infusion des feuilles séchées du théier (*Camellia sinensis*), un arbuste tropical originaire d'Asie du Sud-Est. La qualité du thé dépend de l'âge des feuilles récoltées. Les meilleurs thés proviennent du bourgeon terminal, dit « pekoe », et des deux feuilles suivantes. Le terme « pekoe » ne désigne donc pas une variété de thé, mais bien la partie de la plante dont il provient. Les différentes variétés de thé dépendent en fait des traitements préalables appliqués aux feuilles de thé.



Produit à partir de feuilles de thé fermentées puis séchées, le **thé noir** représente plus de 98 % de la production mondiale.



Le **thé oolong** est un thé à demi fermenté qui possède une saveur plus prononcée que celle du thé vert, mais plus délicate que celle du thé noir.



Le **thé vert** est produit sans fermentation. Immédiatement après avoir été cueillies, les feuilles de thé sont chauffées à la vapeur, roulées et séchées. Plus astringent que le thé noir, le thé vert est très apprécié en Chine, au Japon et dans les pays musulmans.

### LES TISANES

Les tisanes sont des boissons préparées par infusion de plantes comestibles ou d'herbes aromatiques séchées. On leur attribue des vertus apaisantes, digestives, toniques ou curatives.



Les feuilles et les fleurs séchées du **tilleul** permettent de préparer des tisanes aux propriétés calmantes, sédatives et adoucissantes.

### LE CAFÉ

Le café est une boisson très populaire, reconnue pour son action stimulante. Le café est préparé à partir des grains du caféier, un arbuste tropical originaire d'Afrique, du genre *Coffea*. Le caféier produit un fruit charnu qui renferme deux noyaux disposés face à face, les grains de café. Les grains sont récoltés verts puis torréfiés, c'est-à-dire rôtis à sec et à haute température. La torréfaction leur donne une coloration brune et accentue leur arôme. Les grains sont ensuite moulus et infusés dans l'eau bouillante pour préparer le café.

Deux espèces de caféiers sont cultivées pour la production de café : *Coffea arabica* (75 % de la production environ) et *Coffea canephora* (robusta). Les grains de *Coffea arabica* sont plus longs et ils contiennent moins de caféine (1 % contre 2 % pour le robusta). Ils produisent un café au goût doux, fin et parfumé.



grains de café  
torréfiés



Les **grains verts** peuvent se conserver plusieurs années, alors que les grains torréfiés perdent rapidement leur saveur.

# LES BOISSONS FERMENTÉES

Les boissons fermentées sont des boissons alcoolisées qui résultent de la fermentation de fruits ou de graines. La fermentation consiste en la transformation des sucres contenus dans les fruits ou les graines en éthanol (alcool). Elle est réalisée par des champignons microscopiques, les levures.

Les principales boissons fermentées sont le vin, issu de la fermentation du fruit de la vigne, le raisin, et la bière, obtenue par fermentation de malt (grains d'orge partiellement germés) et de fleurs de houblon. Le riz peut aussi servir à la préparation de boissons fermentées.



raisin



orge



riz

Alcool japonais issu de la fermentation du riz, le **saké** possède un degré d'alcool de 15 % environ.

La **fermentation** du jus extrait du raisin a lieu dans des cuves de ciment, d'acier ou de bois.

La **bière** est obtenue à partir d'eau, de malt (orge partiellement germée) et de houblon. Les différentes variétés de bières se distinguent par leur couleur, qui varie du blond pâle au brun presque noir, et par leur goût.



xérès



porto

Les **vins vinés**, comme le xérès et le porto, sont des vins auxquels de l'alcool a été ajouté avant, pendant ou après la fermentation.



vin rouge



vin blanc

Le **vin** est obtenu par la fermentation de raisins. Les peaux et les pépins, conservés pendant la fermentation du vin rouge, lui donne sa couleur. Ils sont au contraire généralement séparés du jus avant la fermentation du vin blanc.



La **distillation** traditionnelle est réalisée dans un alambic.



Le **cognac** est une eau-de-vie portant le nom d'une ville française et provenant de la distillation de vins blancs sélectionnés.

## LE DEGRÉ D'ALCOOL

Le degré d'alcool d'une boisson correspond au pourcentage d'éthanol qu'elle contient, en terme de volume.

### bières

de 4 à 7 %, parfois jusqu'à 13 %

### vins


le plus souvent autour de 12 %, parfois jusqu'à 20 % dans le cas des vins vinés

### spiritueux


de 40 à 60 %


## LES SPIRITUEUX

Les spiritueux sont des boissons très concentrées en alcool, obtenues par la distillation de boissons fermentées, moins alcoolisées. La distillation consiste à chauffer la boisson fermentée à environ 80 °C afin que son alcool s'évapore. Une petite quantité d'eau, liée à l'alcool, s'évapore aussi à cette température. Les vapeurs d'alcool concentré sont conduites vers un autre récipient. En refroidissant, elles se condensent sous la forme d'un liquide très concentré en alcool.



Qu'ont en commun un fauteuil Louis XV, une paire de jeans, des bonbons pour la gorge et une affiche publicitaire ? Ils proviennent tous de végétaux. Les plantes sont en effet **exploitées depuis des millénaires** pour la fabrication d'objets de la vie quotidienne. Des fibres végétales servent à la production de textiles, des substances sécrétées par certaines plantes se retrouvent dans des préparations pharmaceutiques ou dans le caoutchouc, tandis que **le bois des arbres connaît d'innombrables utilisations**. Les applications industrielles des végétaux sont infiniment variées, et beaucoup restent encore à inventer.





# Les plantes industrielles

- 116 **L'industrie du bois**  
*Les multiples applications des produits forestiers*
- 118 **La fabrication du papier**  
*Des arbres transformés en feuilles*
- 120 **Le caoutchouc naturel**  
*Un matériau polyvalent extrait de l'hévéa*
- 121 **Les plantes médicinales**  
*Des remèdes ancestraux*
- 122 **Les plantes textiles**  
*Des fibres végétales pour le tissage*

# L'industrie du bois

## Les multiples applications des produits forestiers


Les produits du bois sont extrêmement variés. Le bois sert de matériau de construction, mais aussi de combustible et de matière première pour la fabrication du papier. Parmi les implications écologiques de l'exploitation industrielle du bois, on constate que les forêts naturelles régressent au profit des forêts plantées.

### LES ESSENCES DE BOIS

Chaque espèce d'arbre fournit une essence de bois distincte, possédant des caractéristiques propres. Les conifères, comme le sapin, le pin ou l'épicéa (épinette), fournissent des bois habituellement tendres. Les feuillus, quant à eux, donnent le plus souvent des bois durs, ou bois francs. Ce sont par exemple le chêne, l'érable ou encore le hêtre. L'industrie forestière distingue aussi les bois tropicaux, issus d'arbres feuillus poussant dans la zone intertropicale, comme l'acajou.



Entre autres utilisations, le bois blanc et tendre de l'**épicéa (épinette)** sert massivement à la production de bois d'œuvre et de papier.



Le bois de **chêne**, de couleur jaune à brun clair, connaît de multiples applications (menuiserie, construction navale, traverses de chemins de fer, tonneaux...).



L'**acajou** est exploité en Amérique du Sud, aux Antilles et en Afrique. Il fournit un bois rougeâtre et dur, très prisé en ébénisterie.

### LES PRODUITS DU BOIS


Indépendamment de l'essence du bois, les produits du bois sont classés en quatre catégories, selon leur utilisation finale : les bois ronds, incluant le bois d'œuvre ; les panneaux dérivés du bois ; les pâtes de bois, issues de la transformation des fibres de bois ; et les papiers et cartons (papiers et cartons d'imprimerie, d'emballage et d'usage domestique), fabriqués à partir des pâtes de bois.

#### LES BOIS RONDS

Cette catégorie regroupe tout le bois retiré des forêts, que ce soit les arbres abattus ou les déchets des activités de coupe, soit plus de 3,3 milliards de m<sup>3</sup> de bois par an. On distingue les combustibles ligneux, qui sont brûlés pour produire de l'énergie, et les bois ronds industriels, sciés en planches (bois d'œuvre) ou transformés en panneaux ou en pâtes de bois.




#### utilisations des bois ronds



La production mondiale de **bois ronds industriels** s'élève à près de 1,6 milliard de m<sup>3</sup> par année. Les principales régions de production sont l'Amérique du Nord (environ 640 millions de m<sup>3</sup>) et l'Europe (environ 490 millions de m<sup>3</sup>).

## LE BOIS D'ŒUVRE

Le bois d'œuvre désigne le bois qui arrive à la scierie sous forme de grumes (troncs) et qui est transformé afin de servir dans les domaines de la construction (charpentes, lambris), de la menuiserie (escaliers, parquets) et de l'ameublement (mobilier industriel et ébénisterie).



## LES PANNEAUX DÉRIVÉS DU BOIS

Ces matériaux sont obtenus par la transformation du bois rond ou par l'assemblage ou l'agglomération de divers éléments du bois. Les panneaux dérivés du bois sont utilisés comme matériau de construction, par exemple comme sous-plancher.



# La fabrication du papier

## *Des arbres transformés en feuilles*

Le papier est fabriqué à partir de fibres végétales, principalement celles du bois. Les fibres du bois servent à la préparation de la pâte à papier, qui est ensuite transformée en une multitude de produits différents, des papiers graphiques aux cartons d'emballage en passant par le papier journal et les papiers domestiques. Le processus de transformation des copeaux de bois en feuilles de papier dure moins d'une journée.

### LA PÂTE À PAPIER

Le bois est composé de fibres (de 70 à 85 %, selon l'essence de bois), reliées entre elles par une substance rigide, la lignine. La fabrication de la pâte à papier consiste à extraire les fibres du bois et à les mettre en suspension dans l'eau pour former une pâte très liquide.

Le bois est débarrassé de son écorce ❶ puis déchiqueté en copeaux ❷. Il est ensuite transporté jusqu'à l'usine de pâte à papier. Là, les copeaux de bois peuvent être réduits en fragments plus petits par meulage (procédé mécanique ❸), ou cuits dans une solution contenant des réactifs chimiques capables de dissoudre la lignine (procédé chimique ❹). Des additifs chimiques permettent d'éliminer davantage de lignine, ce qui blanchit la pâte ❺. La pâte blanchie passe dans un raffineur ❻ : les fibres du bois, mises en suspension dans l'eau, gonflent, ramollissent et s'enchevêtrent, de façon à fournir des papiers plus résistants. Des pâtes de différentes qualités (neuve et recyclée, par exemple) sont ensuite mélangées ❼ à divers additifs, comme des colorants, selon le type de papier désiré. Enfin, la pâte est déshydratée par pressage. Les blocs de pâte déshydratée ❽ sont expédiés vers l'usine de papier où ils seront transformés en feuilles.

Le **bois** utilisé pour la fabrication du papier provient d'arbres adultes et, de plus en plus, des résidus de l'industrie du bois d'œuvre.

Le **procédé chimique** a un rendement moyen (100 t de bois produisent 50 t de pâte), mais il altère moins les fibres et permet d'éliminer la lignine, donc d'obtenir des papiers plus résistants et plus blancs. Les trois quarts des pâtes à papier sont aujourd'hui des pâtes chimiques. Elles ont de multiples utilisations, des papiers d'impression aux papiers d'emballage.

Le **procédé mécanique** offre un bon rendement : 100 t de bois donnent 90 t de pâte mécanique. Mais ces pâtes contiennent beaucoup de lignine et fournissent des papiers qui ont tendance à jaunir. On les utilise pour produire du papier journal.

**copeaux grossiers**

Les copeaux de bois sont transportés par **camion** de la scierie à l'usine de pâte à papier.


Le recyclage nécessite le **désencrage** des vieux papiers.

De **vieux papiers** arrivent à l'usine de pâte à papier pour y être recyclés.

La **pâte écrue** contient encore beaucoup de lignine.

**pâte blanchie**

Les fibres sont traitées dans une machine rotative, le **raffineur**.



## LES VÉGÉTAUX À L'ORIGINE DE LA PÂTE À PAPIER

Près de 95 % des pâtes à papier produites aujourd'hui proviennent du bois des arbres, aussi bien de conifères que de feuillus, dans des proportions qui varient selon le pays producteur. Bien que la tendance soit au recyclage des papiers et des cartons, les pâtes faites de fibres neuves représentent encore environ 50 % des pâtes à papier.

Les pâtes de fibres recyclées comptent pour près de 45 % de la production de pâtes à papier. Elles sont surtout utilisées pour la fabrication de papier journal et de papiers et cartons d'emballage.

Les pâtes tirées d'autres fibres que le bois représentent moins de 5 % de la production. Les pâtes chiffon, obtenues à partir de chiffons de lin, de chanvre ou de coton, étaient autrefois très utilisées. Elles sont maintenant réservées à la fabrication de papiers spéciaux très durables, pour l'édition de luxe notamment.



**bouleau**

Les **feuillus** comme le bouleau et le peuplier, aux fibres courtes, donnent des papiers opaques et lisses adaptés à l'imprimerie.




**épicéa (épinette)**

Les **conifères** comme l'épicéa (épinette) et le pin possèdent des fibres longues et fournissent des papiers résistants.

## DE LA PÂTE AU PAPIER

La pâte à papier arrive déshydratée à l'usine de papier. Elle est diluée dans l'eau ❶, puis versée dans la caisse d'arrivée ❷ de la machine à papier. Elle est projetée sur la toile de formation ❸, une toile poreuse rotative qui permet d'égoutter la pâte. Dans la section des presses ❹, la pâte est amincie et essorée entre des cylindres recouverts de feutre absorbant. Elle est ensuite séchée entre les cylindres chauffants de la sécherie ❺, puis sort de la machine sous la forme d'une mince feuille de papier. Le papier peut ensuite être couché ❻, c'est-à-dire enduit d'une sauce de couchage, une solution pigmentée qui améliore ses propriétés d'impression. Le papier est alors lissé par calandrage ❼, puis enroulé en bobines pesant plusieurs tonnes. Ces bobines ❽ sont finalement découpées.

Sur les **machines à papier** les plus récentes, la feuille de papier mesure jusqu'à 10 m de largeur, 250 m de longueur (de la caisse d'arrivée à l'enrouleuse), et elle circule à près de 90 km/h.



# Le caoutchouc naturel

*Un matériau polyvalent extrait de l'hévéa*

Le caoutchouc est un matériau élastique, imperméable et résistant, très largement utilisé dans l'industrie. Le caoutchouc naturel, qui représente environ 40 % de la production mondiale de caoutchouc, est fabriqué à partir du latex, une substance laiteuse extraite d'un arbre tropical, l'hévéa.

## L'HÉVÉACULTURE


Le caoutchouc naturel provient du latex, un liquide qui circule sous l'écorce de certains végétaux. Plus de 7 500 espèces végétales produisent du latex, mais la seule exploitée à grande échelle pour la production de caoutchouc est *Hevea brasiliensis*, dont le latex est blanc. L'exploitation de cet arbre originaire d'Amazonie commence lorsque sa circonférence atteint 50 cm à 1 m du sol ; l'arbre est alors âgé de trois à six ans. Pendant environ 30 ans, l'arbre fournira assez de latex pour fabriquer 5 kg de caoutchouc par an.



La quasi-totalité du caoutchouc naturel provient des **plantations d'hévéas** d'Asie du Sud-Est.

## LA RÉCOLTE DU LATEX


Le latex est produit par le manteau lactifère. Son rôle biologique est encore mal connu, mais il pourrait participer à la défense de l'arbre : lorsque l'écorce de l'arbre est endommagée, le latex s'écoule de la blessure, se coagule et finit par former un bouchon qui empêche l'entrée d'agents pathogènes dans l'arbre. Cette propriété est exploitée en hévéaculture. Le tronc des hévéas est incisé tôt le matin et le latex est récolté dans un godet. Au bout de deux à cinq heures, le latex se coagule et obstrue l'incision. Celle-ci est rouverte le lendemain, ce qui stimule à nouveau la production de latex.



La **profondeur de l'incision** est généralement inférieure à 10 mm.

## LES APPLICATIONS INDUSTRIELLES DU CAOUTCHOUC

Rapidement après la récolte, le latex se coagule : les minuscules particules de caoutchouc qu'il contient s'agglomèrent et forment le caoutchouc brut. Celui-ci présente peu d'intérêt industriel : collant en été, cassant en hiver, il se déchire facilement et n'est pas élastique. Pour être utilisable, il doit subir une vulcanisation, une transformation qui consiste à ajouter du soufre au caoutchouc brut et à le cuire brièvement. Le caoutchouc vulcanisé est élastique et résistant à la chaleur et à l'étirement. Il est abondamment utilisé dans l'industrie, pour la fabrication de pneumatiques, de joints, de ballons, de jouets... Il est aussi utilisé dilué pour l'imperméabilisation de tissus, la fabrication de gants, d'adhésifs et de peintures.



# Les plantes médicinales

## Des remèdes ancestraux

Une plante médicinale est une plante dont une partie, par exemple la feuille ou la fleur, possède des propriétés curatives. Les plantes médicinales sont utilisées depuis des millénaires. La phytothérapie, ou la médecine par les plantes, fait aujourd'hui appel à près de 2 000 plantes différentes. Elles doivent être utilisées avec précaution car selon la dose, certaines peuvent être toxiques.

### L'AIL (*Allium sativum*)

L'ail est une plante herbacée dont les bulbes sont employés en cuisine comme condiment. Le bulbe d'ail est une tige souterraine qui contient plusieurs composés chimiques, dont l'allicine. Certains de ces composés sont réputés pour réduire la pression artérielle et le taux de cholestérol et pour fluidifier le sang. On lui prête aussi des propriétés stimulantes et antiseptiques. L'ingestion d'une gousse d'ail frais chaque jour permettrait de protéger son système vasculaire, mais cela expose aussi à des troubles digestifs.



bulbe d'ail

### L'ANIS (*Pimpinella anisum*)

L'anis est une plante herbacée cultivée comme plante condimentaire pour ses feuilles et ses graines aromatiques. L'infusion de ses graines produit une tisane aux propriétés stimulantes et digestives. L'anis est réputé en phytothérapie, mais aussi dans l'industrie des liqueurs, où il sert à préparer l'anisette, un apéritif très parfumé.



graines d'anis



### LA CAMOMILLE (*Chamaemelum nobile*)

La camomille est une plante herbacée dont les tiges sont velues et les fleurs réunies en capitule. Les fleurs de camomille auraient diverses propriétés curatives, connues depuis l'époque romaine. Elles sont notamment utilisées en tisane pour traiter les spasmes digestifs douloureux et en onguent pour soigner l'inflammation de la peau et des muqueuses.



fleurs de camomille

### L'EUCALYPTUS (*Eucalyptus* spp.)

L'eucalyptus est un arbre de grande taille originaire d'Océanie. Il est cultivé pour son bois qui sert à produire de la pâte à papier. Ses feuilles bleutées et très odorantes contiennent de l'eucalyptol. Cette substance est utilisée comme antiseptique et anti-inflammatoire des voies respiratoires. L'eucalyptus s'administre en tisane, en inhalation ou encore en huile essentielle.



feuille d'eucalyptus

# Les plantes textiles

*Des fibres végétales pour le tissage*

Les plantes textiles sont des plantes qui produisent des fibres allongées se prêtant bien à la filature et au tissage. Elles étaient déjà utilisées il y a plus de 7 000 ans, notamment en Asie, au Moyen-Orient et en Amérique du Sud. Aujourd'hui encore, malgré le développement des fibres synthétiques, les fibres d'origine végétale restent très utilisées par l'industrie textile. Une dizaine de plantes textiles sont cultivées dans le monde, notamment le cotonnier.

## LE COTON

Le coton provient du cotonnier (plusieurs espèces du genre *Gossypium*), un petit arbuste dont il existe de nombreuses variétés. Le cotonnier est une plante tropicale qui exige un climat chaud et humide. Il est cultivé principalement en Inde, en Chine, en Amérique du Nord et au Moyen-Orient. Le fruit du cotonnier est une capsule contenant des graines enveloppées de poils fibreux de 2 à 3 cm de long, le coton. Les graines sont utilisées pour la production d'huile alimentaire et de nourriture pour le bétail.

Résistante, la fibre de coton est très appréciée de l'industrie textile, car elle se tisse et se colore facilement. La qualité du coton dépend principalement de la couleur et de la longueur des fibres, qui elles-mêmes dépendent de la variété de cotonnier cultivée. Le coton est aussi très utilisé dans le domaine médical pour son pouvoir d'absorption des liquides.




Le **cotonnier** est la plante textile la plus cultivée dans le monde : la production annuelle de coton dépasse 23 millions de tonnes.



① capsule de coton

## L'ÉGRENAGE DU COTON

À maturité, les capsules de coton ① éclatent, permettant la récolte des graines enveloppées de fibres de coton. La récolte ② se fait le plus souvent mécaniquement. Dans une usine d'égrenage, les fibres sont séparées des graines et des débris de la capsule par une égreneuse ③. Les fibres sont ensuite compressées sous forme de balles ④ pour être expédiées vers une usine de filature.





sacs de café en jute

## LE JUTE

Le jute provient des vaisseaux du phloème d'une plante tropicale du genre *Corchorus*. Cette plante, qui mesure de 3 à 4 m de hauteur, est cultivée principalement en Inde et au Bangladesh. Raides et ligneuses, les fibres de jute servent surtout à fabriquer des sacs pour le transport de denrées. Bien que ses applications soient moins variées que celles du coton, le jute est produit en grandes quantités, soit 2,7 millions de tonnes chaque année.



champ de lin

## LE LIN

Le lin (*Linum usitatissimum*) est une plante herbacée de 40 à 80 cm de hauteur. Il est cultivé pour ses graines, utilisées en boulangerie et pour la production d'huile, et pour les fibres de ses tiges, qui servent à fabriquer des tissus appelés toiles de lin. Le lin sert à la confection de vêtements et de linge de maison, ainsi que de matériaux isolants pour l'industrie de la construction.




plant de chanvre

## LE CHANVRE

Le chanvre (*Cannabis sativa*) mesure environ 2 m de hauteur. Connus pour ses propriétés psychotropes, le chanvre est aussi cultivé pour les fibres de ses tiges. Autrefois, ces fibres servaient à confectionner des vêtements ou des draps. Aujourd'hui, le chanvre a été remplacé par le lin et le coton, moins grossiers, et par les fibres synthétiques, au tissage plus régulier. Comme les fibres de chanvre résistent bien à la putréfaction, elles restent utilisées pour la fabrication de cordages, de voiles à bateaux et de filets de pêche. Il est aussi utilisé comme isolant.

## LA FILATURE DU COTON

Les balles de fibres de coton arrivent à l'usine de filature par camion. Avant de pouvoir être filé, le coton brut est démêlé dans une **cardeuse** ①, une machine qui nettoie les fibres et les oriente parallèlement les unes aux autres. Les rubans de carde obtenus sont affinés entre des cylindres de caoutchouc ② tournant de plus en plus vite. Le coton est finalement filé sur un **métier à filer** ③ : plusieurs rubans de coton sont rassemblés puis étirés et tordus sur une bobine rotative ④ afin de former un fil continu. Les fils de coton peuvent être tissés ou tricotés. Les textiles non tissés, quant à eux, sont constitués non pas de fils, mais de fibres compressées ou traitées chimiquement.



# Glossaire

**abscission**

Rupture normale du pétiole des feuilles mortes ou du pédoncule des fruits mûrs, entraînant leur chute.

**adaptation**

Ajustement d'une espèce aux conditions de son milieu de vie, ce qui augmente ses chances de survie et de reproduction dans ce milieu.

**adventif**

Se dit d'un organe végétal qui se développe sur un autre organe, en dehors du processus normal de ramification.

**agronomie**

Science qui a pour objet l'étude des relations entre les plantes cultivées, le sol, le climat et les techniques agricoles.

**amidon**

Sucre complexe formé par l'assemblage de molécules plus simples, mis en réserve sous forme de grains dans de nombreux tissus végétaux.

**autotrophie**

Se dit d'un organisme capable de produire ses propres molécules organiques à partir d'éléments minéraux et d'énergie solaire.

**azote**

Gaz inodore et incolore qui constitue 78 % du volume de l'atmosphère terrestre. L'azote entre dans la composition de la matière organique, notamment les protéines.

**biodiversité**

Variété des espèces vivantes qui peuplent un milieu donné.

**botanique**

Science qui a pour objet l'étude des végétaux.

**cambium**

Tissu de croissance contenu dans les racines et les tiges et qui en assure l'accroissement en diamètre. Le cambium n'est présent que chez les conifères et les plantes à fleurs dicotylédones vivaces.

**coagulation**

Transformation d'une substance liquide en une matière solide.

**combustible**

Se dit d'une matière capable de brûler au contact de l'oxygène.

**concentration**

Quantité de matière d'un corps dissous par rapport au volume de la solution dans laquelle il est dissous.

**cône**

Inflorescence des conifères formée d'écaillés portant des ovules. De rares angiospermes, comme le houblon, possèdent aussi des organes reproducteurs en forme de cônes.

**cotylédon**

Partie de l'embryon qui, lors de la germination, permet à la plantule de s'alimenter avant l'apparition des premières feuilles.

**courant océanique**

Déplacement de grandes masses d'eau océanique selon une trajectoire stable et à une vitesse régulière. Les courants océaniques influencent les formations végétales, car ils transportent la chaleur d'une région à l'autre.

**division cellulaire**

Duplication d'une cellule donnant naissance à deux cellules filles identiques à la cellule mère. La division cellulaire assure la croissance des plantes.

**dormance**

État d'un organe dont le développement est momentanément arrêté. La levée de la dormance nécessite une stimulation extérieure, comme l'allongement de la durée du jour au printemps qui provoque la reprise du développement des bourgeons.

**écosystème**

Système, de taille très variable, formé d'un milieu naturel et de l'ensemble des organismes qui y vivent.

**épiderme**

Couche de cellules la plus externe des organes végétaux, dont les cellules possèdent souvent des parois épaisses et sont recouvertes d'une pellicule imperméable. L'épiderme compte parfois plusieurs couches de cellules.

**espèce**

À l'intérieur de la classification des êtres vivants, subdivision qui regroupe des individus aux caractéristiques semblables et qui sont capables de se reproduire entre eux.

**évaporation**

Passage de l'eau de l'état liquide à l'état gazeux.

**feuillu**

Arbre du groupe des plantes à fleurs dont les feuilles, le plus souvent caduques, présentent un limbe large, par opposition aux aiguilles des conifères.

**flagelle**

Long filament mobile fixé à certains types de cellules et qui leur permet de se déplacer en nageant.

**gaz carbonique**

Gaz incolore et inodore qui représente 0,03 % du volume de l'atmosphère terrestre et qui intervient dans les processus de photosynthèse et de respiration.

**glande**

Organe dont les cellules sécrètent un liquide possédant une fonction biologique particulière.

**huile essentielle**

Mélange complexe de substances aromatiques extraites d'organes végétaux, le plus souvent par distillation ou pression. Aussi appelée essence.

# Glossaire

**latitude**

Distance angulaire d'un point sur Terre par rapport à l'équateur.

**liège**

Tissu protecteur produit par l'écorce de certains arbres, formé de cellules mortes remplies d'air et imprégnées de subérine, une molécule imperméable.

**lignine**

Molécule complexe imprégnant la paroi des cellules de certains tissus, leur conférant cohésion et solidité mais limitant le métabolisme.

**lumière visible**

Rayonnement électromagnétique dont la longueur d'onde est comprise entre 400 et 700 nm. La lumière visible est la source d'énergie des plantes vertes et elle influence divers phénomènes comme la croissance, la floraison, la germination et l'ouverture et la fermeture des stomates.

**minéral**

Se dit d'un composé chimique dépourvu de carbone.

**molécule**

Particule composée de plusieurs atomes.

**mucilage**

Substance végétale translucide, visqueuse et sucrée, produite par divers tissus végétaux.

**nectar**

Liquide sucré plus ou moins visqueux produit par des glandes, appelées nectaires, de certaines fleurs. Les abeilles en font du miel.

**organe**

Partie d'un être vivant constituée de plusieurs tissus différents, qui possède une forme déterminée et qui exerce une fonction particulière.

**organique**

Se dit d'une substance contenant du carbone.

**organite**

Chacun des éléments différenciés de la cellule.

**oxygène**

Gaz incolore et inodore qui constitue 21 % du volume de l'atmosphère terrestre. L'oxygène est indispensable à la respiration des végétaux et des animaux.

**parenchyme**

Tissu formé de cellules peu différenciées, typiquement allongées, remplissant des fonctions variées (photosynthèse, réserves nutritives, conduction des gaz, remplissage...).

**pathogène**

Qui peut causer une maladie.

**pigment**

Substance responsable de la coloration d'un tissu. La pigmentation des fleurs et des fruits attire les animaux, favorisant la pollinisation et la dissémination des graines.

**plancton**

Ensemble des organismes animaux (zooplancton) et végétaux (phytoplancton) vivant en suspension dans l'eau de mer et dont les déplacements sont déterminés par les courants marins.

**protéine**

Grosse molécule organique formée par l'enchaînement de molécules plus petites, les acides aminés, riches en azote.

**psychotrope**

Se dit d'une substance d'origine naturelle ou artificielle capable de modifier l'activité du système nerveux central et du psychisme.

**résine**

Produit collant et très visqueux sécrété par certains arbres, jouant un rôle dans la cicatrisation de l'écorce. Les conifères produisent une résine dont on tire l'essence de térébenthine, utilisée dans la fabrication de peintures.

**sucre**

Molécule organique composée de carbone, d'hydrogène et d'oxygène, servant de source d'énergie aux êtres vivants. Les plantes produisent des sucres par photosynthèse.

**tissu**

Ensemble homogène de cellules différenciées qui exercent une fonction particulière. Tous les tissus végétaux dérivent de groupes de cellules juvéniles, non différenciées, les méristèmes.

**tourbe**

Matière riche en substances organiques, résultant d'une décomposition lente et incomplète de végétaux dans un milieu humide. La tourbe est utilisée comme combustible et comme engrais.

**végétatif**

Qui se rapporte aux fonctions vitales d'un végétal (nutrition, croissance), à l'exception de ce qui concerne la reproduction sexuée.

**vitamine**

Molécule organique, sans valeur énergétique, indispensable en petite quantité au fonctionnement des organismes incapables d'en faire la synthèse. Les plantes alimentaires sont d'excellentes sources de vitamines pour l'être humain.

**volubile**

Se dit d'une plante grimpante dont la tige, grêle, ne peut s'élever qu'en s'enroulant en spirale autour d'un support.

**zygote**

Cellule formée par la fusion de deux gamètes.

# Index

## A

abscission [c] 48  
absorption racinaire **30**, 68  
acacia 86  
adventif, organe [c] **20**, **61**  
agrume 104  
aiguille 22, 49  
AIRE PROTÉGÉE 94  
akène 58  
albumen **56**, 106  
alcool 113  
ALGUE 8, **12**, 16, 108  
altitude 89  
amidon [c] 11, 65  
anabolisme 66  
ANATOMIE 26  
anémophile 53  
angiosperme 8, 29  
anthère **40**, 52  
aperture 54  
apothécie 16  
appareil de Golgi 10  
appareil reproducteur 26, 29, 40  
appareil végétatif 26, 98  
AQUATIQUE, PLANTE **92**  
aquatique, milieu 12, 92  
arborescente, plante 9, 20, 21, 28  
ARBRE 22, 46  
arbre résineux 8, **22**  
arbres, taille des 76  
arbrisseau 76  
arbuste 76  
aridité 90  
aromatique, plante 109  
artificielle, pollinisation 53  
asexuée, reproduction 13, 19, 21, 61  
autopollinisation 52  
autotrophe, organisme [c] 13, **64**  
azote [c] 33, 67, 72

## B

baie 59  
baobab 86  
bière 113  
biodiversité [c] 84, 94  
biosphère, Réserve de la 94  
blé 58, 106, 110  
BOIS 27, 46, 74, 116, 118  
bois d'œuvre 22, 117  
BOISSON 112  
bouleau 119  
bourgeon 26, 75  
branche 46  
bulbe 35, **61**

## C

cacao 111  
cactus 36, 38, **90**  
caduque, feuille 47, 88  
café 112  
caféine 111, 112  
calice 41  
cambium [c] 31, 34, 74, 76  
canopée 84  
CAOUTCHOUC 120  
capitule 45, 100  
capsule (fruits) 58  
capsule (mousses) 18  
carnivore, plante 72  
carton 118  
caryopse 58, 106  
catabolisme 66  
CELLULE 10  
cellule compagne 69  
cellule de garde 66  
CÉRÉALE 106  
cerne 74  
CHAMPIGNON 8, **14**, 16, 70  
CHAMPIGNON COMESTIBLE 15, **108**  
champignon vénéneux 15  
chanvre 119, 123  
chêne 28  
chevelu racinaire 30  
CHLOROPHYLLE 13, 37, **64**  
chloroplaste 11, **65**  
chromosome 11  
chute des feuilles 48  
CLASSIFICATION 8  
coiffe 30  
collenchyme 37  
cône [c] 23  
CONIFÈRE 8, **22**, 49, 88  
CONSERVATION DES ESPÈCES 94  
corolle 41  
corymbe 44  
coton 122  
cotylédon [c] 28, **56**, 60  
CROISSANCE 17, 74  
croissance de la racine 31  
croissance des inflorescences 44  
crosse 20  
cultivée, fleur 43  
cuticule 34, 37, 91, 92  
cylindre central 31, 34  
cyme 45  
cytoplasme 10

## D

déforestation 95  
déhiscent, fruit sec 58  
désert 83

diagramme floral 41  
dicotylédone 9, 28, 35  
dionée 73  
dioxyde de carbone 64, 66  
dissémination des graines 23, 29, 60  
distillation 113  
division cellulaire [c] 30, 78  
drosera 72  
drupe 59

## E

eau 65, 67, 92  
écaïlle 49  
échanges gazeux 66  
écorce 34, 74  
écosystème [c] 92, 94  
embryon 28, 56  
endémique 94  
endoderme 31  
énergie 66  
énergie lumineuse 64  
entomophile 52  
épi 44  
épice 109  
épicéa 22, 49, 88, 116, 119  
épiderme [c] 31, 34, 37  
épine 22, 36, 38, 90  
épinette 22, 49, 88, 116, 119  
épiphyte 85  
ÉQUATORIALE, FORÊT 82, 84  
espèce [c] 8  
espèce menacée 95  
ESPÈCES, CONSERVATION DES 94  
essence de bois 116  
étamine 29, **41**, 52  
évaporation [c] **66**, 68, 90, 113  
évolution **9**, 42, 53, 91  
exine 54  
extinction 95

## F

famille 9, 42  
farine 106, 110  
fasciculée, racine 30  
FÉCONDATION 13, 15, 19, 21, 23, 29, **54**  
fermentation 112  
feuillage 46  
FEUILLE 26, **37**  
feuille caduque **47**, 88  
feuille de papier 119  
feuille persistante 22, **49**  
feuilles, chute des 48  
feuilles, transpiration des 48, **66**, 68  
feuilles, types de 38  
feuillu [c] 88

fibre du bois 116, 118  
fibre textile 122  
filament 14, 16, 70  
filet 40  
FINES HERBES 109  
flagelle [c] 19, 21  
FLEUR 8, 26, 29, **40**  
fleur cultivée 43  
follicule 58  
FORÊT 82  
forêt boréale 82, **88**  
forêt mixte 88  
FORÊT TEMPÉRÉE 83, **88**  
FORÊT ÉQUATORIALE 82, **84**  
FORMATION VÉGÉTALE 82  
FOUGÈRE 8, **20**  
fronde 12, 20  
fraisier 36, 45, 61  
FRUIT 8, 29, **57**  
FRUIT (aliment) 103

## G

gamète 13, 19, 21, 23, 54  
gaz carbonique [c] 64, 66  
gazeux, échanges 66  
gemma 56, 60  
gène 8, 53  
genre 9  
géotropisme 79  
germination d'une spore 15, 19, 21  
germination de la graine 23, 29, **60**  
germination du grain de pollen 29, **55**  
gingko 95  
gousse 58  
grain d'amidon 11, 65  
grain de pollen 23, 29, 52, **54**  
GRAINE 8, 23, 29, **56**, 60  
Graminées 86, 106  
grappe 44  
gravité 79  
gui 71  
Gulf Stream 89

## H

haptère 13  
haricot 79, 98, 102  
herbacée, plante 9, **27**  
HERBES, FINES 109  
HÉTÉROTROPHE 14, **70**  
hévée 120  
HORMONE 78  
huile végétale 110  
humide, milieu 12, 18, 20  
hyphe 14

## IJK

indéhiscant, fruit sec 58  
INDUSTRIE DU BOIS 116  
INFLORESCENCE 44  
insecte 52, 72  
intine 54

## L

labelle 42  
lacune 93  
lamelle 14  
latex 120  
LÉGUME 98  
LÉGUMINEUSE 33, **102**  
levure 14, 113  
LICHEN **16**, 70  
lignée 8  
ligneuse, plante 9, **27**, 46  
lignine [c] **27**, 46, 74, 118  
lilas 76  
limbe 20, 37  
lin 123  
lumière [c] 64

## M

machine à papier 119  
maïs 32, 107  
manteau lactifère 120  
maquis 83  
matière organique 64  
maturation de la graine 56  
maturation du fruit 29  
MÉDICINALE, PLANTE 121  
membrane cellulaire 10  
méristème 75  
mésophylle 37  
métabolisme 66  
micropyle 54  
milieu aquatique 12, **92**  
milieu sec 90  
minéraux [c] 67, 103, 106  
mitochondrie 10, 66  
moelle 34  
monocotylédone 9, 28, 35  
MOUSSE 8, 18  
mucilage [c] 72  
MULTIPLICATION VÉGÉTATIVE  
35, **61**, 92  
mycélium 14  
mycorhize 70

## N

nectar [c] 52, 73, 111  
nervation 38  
nervure 13, 28, **37**, 38  
nodosité 33  
nœud 26  
noyau (cellule) 10, 54  
noyau (fruit) 59

nutration 79  
NUTRITION 64  
nutritives, réserves 33, 35,  
56, **61**, 101, 106  
nymphéa 38, **92**

## O

œuf 21  
oignon 35  
ombelle 44  
oosphère 54  
orchidée 28, 42  
ordre 9  
organe [c] 11, 20, 26  
organique, substance [c] 68  
organisme 8  
organite [c] 10  
ostiole 66  
ovaire 29, **40**, 54  
ovule 23, 29, **40**, 54  
oxygène [c] 64, 66

## P

palmier 28  
PAPIER 116, **118**  
parasite 14, **71**  
parenchyme [c] 31, 34, 37, 91  
paroi 10  
pâte à papier 116, **118**  
pathogène [c] 120  
pédoncule 29, 40, 57  
pépin 59  
péricarpe 57  
péricycle 31  
persistante, feuille 22, **49**  
pétale 40  
pétiole 20, 37  
phloème 31, 34, 37, **69**  
PHOTOSYNTÈSE 13, **64**  
phototropisme 79  
phytohormone 78  
phytothérapie 121  
pièce florale 41  
pigment [c] 12, 17, 37, 64  
pistil 29, **41**, 52  
pivotante, racine 30  
plancton [c] 12  
plante 23, **60**  
PLANTE À FLEURS 8, **26**  
PLANTE AQUATIQUE 92  
plante aromatique 109  
plante carnivore 72  
plante chlorophyllienne 8, 37,  
64  
plante grimpante 32, 36, 79  
PLANTE MÉDICINALE 121  
PLANTE SUCCULENTE 90  
PLANTE TEXTILE 122  
plante tropicale 49, 105  
plantule 23, 29, **60**

pluricellulaire 12  
pneumatophore 33  
poil absorbant 30  
point végétatif 30  
pollen 23, 29, 52, **54**  
POLLINISATION 29, **52**  
pollinisation croisée 53  
pollution 17, 76, 95  
pomme de terre 35, 101  
port d'un arbre 47  
poussée racinaire 68  
prairie 82  
printemps 47, 76  
pulpe 59

## R

racinaire, absorption **30**, 68  
RACINE 8, 26, **30**  
racine adventive 20, 30, **61**  
racine latérale 26, 30  
racine principale 26, 28, 30,  
46  
racine traçante 22, 91  
racines, types de 32  
radicelle 30, 46  
radicule 56, 60  
rameau 22, 26, 46  
ramification 30  
rayon médullaire 74  
réceptacle 13, **40**, 58, 59  
reproducteur, appareil 26, 29,  
40  
reproduction asexuée 13, 19,  
21, 61  
reproduction sexuée 13, 15,  
19, 21, 23, 29  
réserves nutritives 33, 35, 56,  
**61**, 101, 106  
résine [c] 22  
respiration 66  
rhizome 20, 35, **61**, 92  
riz 107  
rosier 36, 43

## S

sac embryonnaire 54  
saison 47, 76, 87  
samare 58  
sapin 49, 88  
SAVANE 83, **86**  
sécheresse 90  
sels minéraux 67  
sépal 40  
séquoia 77  
SÈVE 67  
sève, vaisseau conducteur de  
8, 28, 31, 34, 37, **69**  
sexuée, reproduction 13, 15,  
19, 21, 23, 29  
silique 58

soie 18  
sol 67, 84  
son 106  
sous-bois 20, 85, 88  
spadice 45  
spermatozoïde 21  
spore 14, 19, 21  
steppe 83  
stigmate **40**, 52  
stolon 36, **61**  
stomate 37, **66**, 93  
style 40  
SUCCULENTE, PLANTE 36, **90**  
suçoir 16, 71  
sucre [c] 64, 111  
symbiose 14, 16, **70**  
système racinaire 26, 28, **30**,  
46

## T

taïga 88  
tégument 56  
textile, fibre 122  
thalle 12, 16  
thé 112  
thigmotropisme 79  
thylakoïde 65  
TIGE 26, **34**  
tige succulente 36, 90  
tigelle 56, 60  
tiges, types de 35  
tissu [c] 11, 26, 78  
toundra 83  
trachéides 69  
transpiration foliaire 48, **66**,  
68  
tronc 27, 46  
tropicale, forêt 82, 84  
TROPIQUE 79  
tube criblé 69  
tube pollinique 29, 55  
tubercule 33, 35, **61**

## UVW

unicellulaire 12, 14  
vacuole 10  
vaisseau conducteur de sève  
8, 28, 31, 34, 37, **69**  
végétatif, appareil [c] 26, 98  
VÉGÉTATIVE, MULTIPLICATION  
35, **61**, 92  
vent 53  
vigne 36, 113  
vin 113  
vivace 27

## XYZ

xylème 31, 34, 37, **69**, 74  
zygote [c] 13, 19, 54

# Crédits photographiques

## La diversité des végétaux

page 17

**Rhizocarpon, cladonie des rennes, Letharia vulpina** : Einar Timdal, Natural History Museum, University of Oslo

## Les plantes à fleurs

page 32

**Ficus tropical** : © National Tropical Botanical Garden

**Maïs** : USDA Photo by Bob Nichols

**Lierre** : Brian Klimowski

page 33

**Coriandre** : Shannon Kaplan

**Soja** : Lynn Betts/USDA NRCS

**Palétuviers** : Christoph Schmidt

page 40

**Lis** : Dr. Kazuo Yamasaki

page 49

**Plantes tropicales** : François Fortin

**Houx** : René Schuster

## La reproduction des plantes à fleurs

page 60

**Pissenlit** : Christian Roux

## Nutrition et croissance

page 71

**Cuscute** : Michael E. Runyan

**Gui** : www.Sanat.ch

page 79

**Tournesols** : Dr. Kazuo Yamasaki

## Les plantes et leur milieu

page 82

**Forêt boréale** : Mélanie Morin

**Forêt tropicale humide** :

CRDI/E. George

**Prairie tempérée** : Jean-Marc Abel

page 83

**Forêt tempérée** : Michel Claquin

**Maquis** : <http://patrick.verdier.free.fr>

**Toundra** : Nick Seifert/Bureau of Land Management

**Steppe** : Guido Bauer

**Savane** : Stéphanie Lancôt

**Désert** : Jean-Claude Corbeil

page 85

**Épiphytes** : Hélène Gauthier

page 86

**Imperata cylindrica** : Dr. Kazuo Yamasaki

**Acacia, arbre à saucisses** : Stéphanie Lancôt

**Baobab** : Michael Duits

page 88

**Forêt de feuillus** : Michel Claquin

**Forêt boréale** : Centre d'études

nordiques

**Forêt mixte, couleurs** : François Fortin

page 94

**Parc national du Groenland** : © 2005 Shunya

**Parc national de Yellowstone** : NPS Photo Yellowstone

page 95

**Ginkgo** : The Arboretum of Penn State Behrend

**Impatiens letouzeyi** : Benedict Pollard Royal Botanic Gardens

**Lichen** : Einar Timdal, Natural History Museum, University of Oslo

**Arbre concombre** : Tony Miller, Royal Botanic Garden Edinburgh

**Tanzanie** : Pierre-Bernard Demoulin

**Ayers Rock** : Jean-Marc Boutellier/<http://Planetphoto.free.fr>

**Chutes Victoria** : John Walker

## Les plantes industrielles

page 116

**Grumes de bois** : David Cantone

page 120

**Hévées** : Antoine Vu

page 121

**Camomille** : © Jean Tosti

**Eucalyptus** : © J.S. Peterson. USDA NRCS NPDC

**Feuille d'eucalyptus** : Carmen Ulloa Ulloa Missouri Botanical Garden

page 122

**Cotonnier** : USDA/NRCS Photo by David Nance

page 123

**Lin** : Jerome W. Walter

**Cannabis** : Peter Hollinger

**Jute** : François Fortin



Le monde des plantes est d'une diversité épatante. Après trois milliards d'années d'évolution, on trouve aujourd'hui plus de 380 000 espèces végétales sur notre planète.

À l'aide d'illustrations saisissantes, *Les Plantes* explore le monde fascinant des végétaux. Des algues marines unicellulaires aux plantes à fleurs les plus complexes, découvrez le foisonnement de la vie végétale et trouvez des réponses à d'innombrables questions.

## Qu'est-ce que la photosynthèse ?

Comment se nomment les différentes parties du fruit ?

De quelle façon les plantes se reproduisent-elles ?

Comment les plantes carnivores piègent-elles leurs proies ?

Combien d'espèces végétales sont aujourd'hui menacées d'extinction ?

Destinés à tous les lecteurs curieux, les *Guides de la connaissance* permettent de jeter un regard éclairé sur des phénomènes complexes et passionnants.

