

## CHAPITRE 12

### MALADIES SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES ET SIDA

*Salif Ndiaye*

À la suite de l'enregistrement des premiers cas de sida en 1986 au Burkina Faso, le Ministère de la Santé, de l'Action sociale et de la Famille, a mis en place un Comité national de Lutte contre le Sida (CNLS). Ce Comité avait pour charge la lutte contre la transmission du VIH par voie sexuelle, par le sang et de la mère à l'enfant en menant un travail d'information et de sensibilisation des populations et de promotion de la recherche en vue d'une prévention efficace. Le CNLS devait également appuyer la prise en charge hospitalière et sociale des personnes malades et la surveillance épidémiologique.

Malgré les efforts enregistrés dans la collecte des données pour pouvoir mieux apprécier la situation, il demeure encore des zones d'ombre sur diverses questions relatives à la prévalence, à l'évolution de la transmission du virus, aux implications de la maladie, etc. Cependant, il ne fait pas de doute, qu'au Burkina comme dans la majorité des pays africains, la transmission du virus du sida se fait presque exclusivement par voie sexuelle.

En 1993, l'EDSBF-I avait déjà collecté de nombreuses informations sur la connaissance du sida (existence, mode de transmission, moyens de prévention, etc.), mais aussi sur les comportements sexuels, qui en dernier ressort, déterminent les niveaux de prévalence. Les informations ainsi collectées ont été essentielles à l'ajustement des programmes en place, et en particulier, à l'organisation de campagnes d'information, d'éducation et de communication appropriées sur le sida. Les données de l'EDSBF-II permettent de mettre à jour et d'approfondir celles de la première enquête.

Trois sujets abordés par l'enquête seront traités ici :

- C le comportement sexuel des enquêtés;
- C la connaissance, la "prévalence" et le comportement vis-à-vis des MST;
- C la connaissance, la perception du risque et la prévention du sida;
- C et la connaissance et l'utilisation du condom en tant que moyen de protection.

#### 12.1 COMPORTEMENT SEXUEL

Une bonne connaissance du comportement de la population face au sida est essentielle pour l'information et la sensibilisation de celle-ci. Des renseignements portant sur le nombre de partenaires sexuels, les rapports avec des partenaires occasionnels et ceux faisant l'objet d'une gratification permettent de mieux connaître le comportement sexuel de la population et ainsi de pouvoir mettre en place des programmes d'information et d'éducation efficaces.

##### 12.1.1 Nombre de partenaires sexuels des femmes

Le tableau 12.1.1 présente la répartition des femmes selon le nombre d'hommes avec lesquels elles ont eu des rapports sexuels au cours des douze derniers mois ayant précédé l'enquête. Plus des trois quarts des femmes en union (78 %, soit 99 % des femmes ayant eu des rapports sexuels) n'ont eu qu'un seul partenaire (en moyenne 0,8 partenaires par femme). Quelle que soit la caractéristique socio-démographique considérée, une très faible proportion (2 % ou moins) de femmes ont déclaré avoir eu deux partenaires ou

Tableau 12.1.1. Nombre de partenaires sexuels : femmes

Répartition (en %) des femmes par nombre de personnes avec qui elles ont eu des rapports sexuels dans les 12 mois ayant précédé l'enquête, selon certaines caractéristiques socio-démographiques, EDSBF-II Burkina Faso 1998-99

Caractéristique	Femmes en union						Femmes qui ne sont pas en union											
	Nombre de partenaires (y compris le conjoint)			Nombre de partenaires (non compris le conjoint)			Nombre de partenaires			Effectif de femmes en union								
	0	1	Total <sup>1</sup>	0	1	Total	0	1	2+	0	1	2+	Total <sup>1</sup>	Nombre moyen de partenaires	Effectif de femmes en union	Nombre moyen de partenaires	Effectif de femmes en union	
<b>Groupe d'âges</b>																		
15-19	8,5	89,0	2,3	100,0	1,0	97,7	1,2	1,1	100,0	0,0	488	80,1	15,6	3,7	100,0	0,2	955	
20-24	20,4	78,6	0,4	100,0	0,8	99,6	0,3	0,1	100,0	0,0	1 023	51,1	42,5	6,4	100,0	0,6	136	
25-29	21,5	77,8	0,6	100,0	0,8	99,4	0,4	0,2	100,0	0,0	1 017	47,6	45,4	4,9	100,0	0,6	38	
30-39	22,0	77,0	0,6	100,0	0,8	99,3	0,7	0,0	100,0	0,0	1 626	65,5	33,6	1,0	100,0	0,4	58	
40-49	27,2	72,1	0,2	100,0	0,7	99,8	0,2	0,0	100,0	0,0	1 027	85,7	11,9	0,0	100,0	0,1	77	
<b>Durée de l'union (en années)</b>																		
Célibataire	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0-4	13,1	85,2	1,2	100,0	0,9	98,8	0,6	0,6	100,0	0,0	1 078	56,2	43,8	0,0	100,0	0,4	30	
5-9	22,8	76,4	0,5	100,0	0,8	99,5	0,5	0,0	100,0	0,0	1 061	*	*	*	*	*	23	
10-14	21,5	77,1	1,0	100,0	0,8	99,0	0,8	0,2	100,0	0,0	898	*	*	*	*	*	14	
15 ou +	24,7	74,7	0,3	100,0	0,8	99,6	0,4	0,0	100,0	0,0	2 145	81,0	17,3	0,0	100,0	0,2	110	
<b>Milieu de résidence</b>																		
Urbain	10,1	88,2	1,2	100,0	0,9	98,7	1,1	0,2	100,0	0,0	653	65,5	30,0	4,2	100,0	0,4	433	
Rural	22,9	76,1	0,6	100,0	0,8	99,4	0,4	0,2	100,0	0,0	4 528	81,0	14,8	3,4	100,0	0,2	831	
<b>Niveau d'instruction</b>																		
Aucun	22,3	76,9	0,5	100,0	0,8	99,4	0,4	0,1	100,0	0,0	4 692	81,2	14,8	3,2	100,0	0,2	839	
Primaire	16,8	80,5	2,4	100,0	0,9	97,7	1,6	0,7	100,0	0,0	334	72,6	24,1	3,0	100,0	0,3	206	
Secondaire ou plus	2,7	94,8	1,3	100,0	1,0	98,7	1,3	0,0	100,0	0,0	155	57,4	35,9	6,1	100,0	0,5	219	
Ensemble des femmes	21,3	77,6	0,6	100,0	0,8	99,3	0,5	0,2	100,0	0,0	5 181	75,7	20,0	3,7	100,0	0,3	1 264	

<sup>1</sup> Y compris les "non-déterminés"

\* Basé sur trop peu de cas

plus. Les femmes urbaines (89 % ayant eu, au moins, un partenaire) ont déclaré avoir eu plus fréquemment que les femmes du milieu rural un partenaire sexuel (77 %). De même, les femmes les plus instruites ont été plus nombreuses à avoir eu des partenaires : 77 % des femmes non scolarisées, 83 % de celles de niveau primaire et 96 % pour le niveau secondaire ou plus.

Lorsqu'on examine ces données sans tenir compte du mari, on constate que les relations sexuelles avec des partenaires autres que les époux sont pratiquement inexistantes : moins de 1 % d'entre elles ont déclaré avoir eu des relations sexuelles avec un ou plusieurs hommes autres que leur époux.

Parmi les femmes qui ne sont pas en union (célibataires, divorcées et veuves), les trois quarts (76 %) n'ont jamais eu de partenaire sexuels ou n'en ont pas eu au cours des douze derniers mois. Environ une femme sur quatre (24 %) a eu, au moins, un partenaire, seulement 4 % en ont eu deux ou plus. Parmi ces femmes, celles de 15-19 ans (19 %), celles de 40-49 ans (12 %), les célibataires (24 %), les divorcées et les veuves dont la durée de l'union remonte à plus de 15 ans (17 %), les femmes du milieu rural et celles n'ayant pas d'instruction sont, proportionnellement, les moins nombreuses à avoir eu des partenaires sexuels. En outre, parmi ces femmes non en union, les jeunes de moins de 20 ans (3,7 %), les célibataires (4,3 %), les urbaines (4,2 %) et les femmes de niveau secondaire ou plus (6,1 %), sont celles qui ont eu le plus fréquemment deux partenaires sexuels ou plus au cours des 12 derniers mois. Cependant, le nombre moyen de partenaires sexuels (0,3 par femme) reste très faible, même parmi les femmes non mariées.

### **12.1.2 Nombre de partenaires sexuelles des hommes**

Le tableau 12.1.2 présente les mêmes informations que précédemment mois, concernant, cette fois-ci, les hommes de 15-59 ans. La majorité des hommes en union (82 %) ont eu une seule partenaire et seulement 6 % en ont eu deux ou plus.

Les hommes dont l'union dure moins de 10 ans et surtout, moins de 5 ans, ceux du milieu urbain et les plus instruits sont, proportionnellement, plus nombreux à avoir eu des partenaires sexuelles. En particulier, tous les hommes de niveau secondaire ou plus, ont eu, au moins, une partenaire sexuelle au cours des douze derniers mois. Ce sont ces mêmes hommes qui ont eu le plus grand nombre de partenaires. Pour une moyenne d'une partenaire par homme dans l'ensemble, les hommes mariés au cours des cinq dernières années, les urbains et ceux du niveau secondaire ou plus, ont eu entre 1,1 et 1,3 partenaires.

Cependant, si on exclut l'épouse ou les épouses, un homme en union a eu, en moyenne, seulement 0,1 partenaires; 93 % d'entre eux n'ont eu aucune partenaire autre que leur épouse. Alors que 0,7 % seulement des femmes ont déclaré avoir eu des partenaires sexuels autre que leur époux, chez les hommes, cette proportion est de 7 %. Les partenaires sexuels "extra-conjugaux" sont plus fréquents parmi les plus jeunes, les urbains et les instruits.

La majorité des hommes non en union (61 %) n'ont pas eu de partenaires sexuelles. Cependant, 13 % en ont eu 2 ou 3, et 5 % en ont eu 4 ou plus. En moyenne, un homme non marié a eu 0,8 partenaires sexuelles au cours des douze derniers mois. Comme pour les femmes, la multiplicité des partenaires est plus fréquente dans les villes (25 % ont eu deux partenaires ou plus, contre 15 % en milieu rural) et parmi les hommes instruits (23 % chez les hommes de niveau secondaire ou plus, contre 16 % chez les non instruits).

Tableau 12.1.2 Nombre de partenaires sexuelles : hommes

Répartition (en %) des hommes par nombre de personnes avec qui ils ont eu des rapports sexuels dans les 12 mois ayant précédé l'enquête, selon certaines caractéristiques socio-démographiques, EDSBF-II Burkina Faso 1998-99

Caractéristique	Hommes en union										Hommes qui ne sont pas en union				Effectif qui ne sont pas en union		
	Nombre de partenaires (y compris l'(les) épouse(s))					Nombre de partenaires (non compris l'(les) épouse(s))					Nombre de partenaires						
	0	1	2-3	4+	Total	0	1	2+	Total	0	1	2-3	4+	Total			
<b>Groupe d'âges</b>																	
15-19	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
20-24	14,4	73,9	10,1	1,7	100,0	88,3	7,2	4,5	100,0	0,2	84	12,4	8,4	2,4	100,0	0,4	590
25-29	9,6	74,1	14,2	1,8	100,0	83,5	10,0	6,5	100,0	0,3	221	27,0	18,3	5,4	100,0	1,0	311
30-39	10,0	84,1	4,3	0,7	100,0	93,3	4,3	2,5	100,0	0,1	505	31,9	21,8	12,0	100,0	1,5	153
40-49	8,5	87,1	2,8	0,5	100,0	96,1	2,2	1,7	100,0	0,1	412	33,0	20,7	8,7	100,0	1,5	53
50-59	16,0	79,9	2,4	0,0	100,0	97,6	1,5	0,9	100,0	0,0	275	*	*	*	*	*	16
																	12
<b>Durée de l'union</b> (en années)																	
Célibataire	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0-4	7,5	81,9	8,9	1,0	100,0	88,8	7,8	3,5	100,0	0,2	269	20,2	13,3	4,7	100,0	0,8	1 085
5-9	9,2	80,5	8,7	0,8	100,0	89,2	6,5	4,2	100,0	0,2	328	*	*	*	*	*	13
10-14	12,5	81,2	4,2	1,0	100,0	94,2	3,8	2,1	100,0	0,1	237	*	*	*	*	*	8
15 ou +	12,4	83,4	2,6	0,4	100,0	96,5	1,8	1,7	100,0	0,1	670	*	*	*	*	*	12
																	17
<b>Milieu de résidence</b>																	
Urbain	6,3	80,3	8,3	2,6	100,0	88,3	7,3	4,4	100,0	0,2	240	26,6	19,4	5,8	100,0	1,1	341
Rural	11,7	82,6	4,7	0,4	100,0	94,1	3,6	2,3	100,0	0,1	1 265	17,9	10,8	4,5	100,0	0,7	795
<b>Niveau d'instruction</b>																	
Aucun	11,9	82,6	4,0	0,6	100,0	94,5	3,6	1,9	100,0	0,1	1 247	64,4	11,1	5,1	100,0	0,7	695
Primaire	8,1	80,0	9,5	1,6	100,0	88,9	4,1	7,0	100,0	0,2	173	58,4	15,6	4,3	100,0	0,9	200
Secondaire ou plus	0,0	81,0	16,0	1,5	100,0	81,7	12,8	5,5	100,0	0,3	85	52,0	18,0	4,7	100,0	0,9	242
Ensemble des hommes	10,8	82,2	5,3	0,7	100,0	93,2	4,2	2,7	100,0	0,1	1 505	60,7	13,4	4,9	100,0	0,8	1 136

<sup>1</sup> Y compris les "non-déterminés"

\* Basé sur trop peu de cas

### 12.1.3 Rapports sexuels avec gratification

On a demandé aux femmes et aux hommes ayant eu des rapports sexuels au cours des 12 derniers mois, si elles/ils avaient reçu ou donné de l'argent, des cadeaux ou des faveurs, en échange de rapports sexuels (tableau 12.2). En ce qui concerne l'ensemble des femmes, seulement 2 % ont déclaré avoir reçu quelque chose de quelque nature que ce soit en échange de relations sexuelles. Par contre, parmi les femmes qui ne sont pas en union, la proportion est cinq fois plus élevée (10 %); parmi les femmes en union, le pourcentage correspondant est de 1 %.

Les rapports sexuels avec gratification semblent être plus fréquents chez les femmes du milieu rural, en particulier parmi celles qui sont mariées, (16 %, contre 3 % des urbaines), chez les plus jeunes (20 % chez les non mariées de 15-19 ans), et chez les femmes n'ayant jamais fréquenté l'école (plus de 13 %).

Tableau 12.2 Paiement pour rapports sexuels

Parmi les femmes et les hommes qui ont eu des rapports sexuels au cours des 12 derniers mois, pourcentage de ceux qui ont donné ou reçu de l'argent, des cadeaux ou des faveurs pour des rapports sexuels selon l'état matrimonial et selon certaines caractéristiques socio-démographiques, EDSBF-II Burkina Faso 1998-99

Caractéristique	Femmes						Hommes					
	En union		Pas en union		Ensemble		En union		Pas en union		Ensemble	
	%	Eff.	%	Eff.	%	Eff.	%	Eff.	%	Eff.	%	Eff.
<b>Groupe d'âges</b>												
15-19	4,0	488	19,8	220	8,9	708	*	9	28,1	162	27,2	171
20-24	1,3	1 023	1,2	96	1,3	1 119	10,4	84	29,7	196	23,9	280
25-29	1,2	1 017	0,0	35	1,1	1 052	9,4	221	32,0	123	17,5	343
30-39	0,8	1 626	3,3	58	0,9	1 684	4,2	505	17,7	46	5,3	551
40-49	0,1	1 027	3,2	74	0,3	1 101	2,8	412	*	15	2,9	427
50-59	-	-	-	-	-	-	0,5	275	*	10	0,5	285
<b>Milieu de résidence</b>												
Urbain	1,1	653	3,3	214	1,6	867	5,6	240	16,8	218	11,0	458
Rural	1,2	4 528	15,6	269	2,0	4 797	4,0	1 265	34,7	334	10,4	1 599
<b>Niveau d'instruction</b>												
Aucun	1,1	4 692	13,4	287	1,8	4 979	4,0	1 247	35,5	305	10,1	1 552
Primaire	2,7	334	9,3	79	4,0	413	6,3	173	23,6	100	12,6	273
Secondaire ou plus	0,4	155	2,7	117	1,4	272	4,4	85	14,2	148	10,6	233
Ensemble	1,2	5 181	10,1	483	1,9	5 665	4,3	1 505	27,6	553	10,5	2 058

\* Basé sur trop peu de cas

Parmi l'ensemble des hommes, plus d'un sur dix (11 %) a déclaré avoir donné ou reçu de l'argent, des cadeaux ou des faveurs, en échange de rapports sexuels. Ce type de relation est beaucoup plus fréquent chez les hommes qui ne sont pas en union (28 %) que chez les hommes en union (4 %). En outre, on constate, aussi bien chez les hommes que chez les femmes qui ne sont pas en union, que les rapports sexuels avec gratification sont beaucoup plus fréquents en milieu rural qu'en milieu urbain (35 % contre 17 % chez les hommes) et (16 % contre 3 % chez les femmes). Chez les enquêtés actuellement en union, au contraire, les pourcentages de femmes et d'hommes ayant eu de telles relations ne diffèrent pas selon le milieu. Pour les non mariés et quelque soit le sexe, la fréquence de ces relations décroît nettement avec le niveau d'instruction : de 13 % pour les femmes et 35 % pour les hommes chez les non instruits, elle tombe respectivement à 3 % et 14% chez celles et ceux ayant un niveau secondaire ou plus. Par contre, chez les

mariés, cette pratique semble plus fréquente parmi les personnes de niveau d'instruction primaire. Le pourcentage de femmes ayant reçu ou donné de l'argent, des cadeaux ou des faveurs, en échange de rapports sexuels, relativement élevé à 15-19 ans, surtout parmi les non mariées, devient très faible, au-delà de 20 ans. À l'inverse, chez les hommes, ce pourcentage reste élevé jusqu'à 29 ans (32 % à 25-29 ans), avant d'amorcer une baisse après 30 ans.

#### **12.1.4 Dernières partenaires sexuelles des hommes**

On a demandé, à chaque homme, quelle était la dernière personne avec qui il avait eu ses derniers rapports sexuels, à savoir, son épouse ou l'une de ses épouses, une partenaire régulière, une personne de rencontre ou quelqu'un qu'il avait payé (tableau 12.3). Près des trois quarts des hommes (72 %) ont déclaré avoir eu comme dernière partenaire leur épouse, 14 % une partenaire régulière et 1 % une personne de rencontre ou une femme qu'ils avaient payée. Les hommes se comportent différemment selon qu'ils sont en union ou non. Parmi les hommes en union, la grande majorité (96 %) ont déclaré avoir eu leurs derniers rapports avec une épouse, 2 % avec une partenaire régulière et, moins de 2 % avec une personne de rencontre. Par contre, pour seulement 6 % des hommes qui ne sont pas en union, les derniers rapports sexuels ont eu lieu avec une épouse (avant la rupture de la dernière union) et pour 46 % d'entre eux, c'était avec une partenaire régulière. Les derniers rapports sexuels ont eu lieu dans 45 % des cas avec une personne de rencontre.

Le même tableau montre que, dans l'ensemble, la proportion des hommes ayant eu leurs derniers rapports sexuels avec leurs épouses augmente avec l'âge entre 20 et 59 ans, cela aussi bien chez les hommes en union que chez ceux qui ne le sont pas. Chez les hommes en union, quelle que soit la caractéristique socio-démographique retenue, la majorité a eu ses derniers rapports sexuels avec son épouse. Par contre, chez les hommes qui ne sont pas en union, de nettes variations sont observées. Ainsi, parmi les hommes non en union, 52 % des non scolarisés (soit plus de la moitié), ont eu leurs derniers rapports sexuels avec des femmes autres que leurs épouses ou partenaires régulières; cette proportion est de 49 % parmi les hommes de niveau primaire et de 37 % parmi ceux de niveau secondaire ou plus. Cependant, les hommes les plus instruits sont, proportionnellement, les plus nombreux à avoir eu leur dernier rapport sexuel avec une partenaire régulière. Autrement dit, le pourcentage d'hommes ayant eu leur dernier rapport sexuel avec une partenaire régulière augmente avec le niveau d'instruction. À l'inverse, la fréquence des derniers rapports sexuels avec des femmes autres que les épouses et les partenaires régulières diminue quand le niveau d'instruction augmente. En ce qui concerne le milieu de résidence, il apparaît qu'en milieu rural, les hommes qui ne sont pas en union ont eu plus fréquemment qu'en milieu urbain leurs derniers rapports sexuels avec leur épouse (8 % contre 3 %). Par ailleurs, en milieu urbain, pour 61 % des hommes qui ne sont pas en union, la dernière personne avec qui ils ont eu leurs derniers rapports sexuels est une partenaire régulière; en milieu rural cette proportion est seulement de 37 %. Ce résultat est cohérent avec celui observé pour le niveau d'instruction, l'urbanisation et la scolarisation étant positivement corrélées. Les hommes non en union dont les dernières partenaires étaient des femmes qui ont été payées (rapport sexuel avec gratification) sont relativement plus nombreux en milieu rural et parmi les non scolarisés.

Ainsi, on peut dire que, parmi les hommes en union, ceux du milieu urbain et ceux qui sont instruits ont plus fréquemment que les autres des comportements sexuels à risque alors que, parmi les hommes qui ne sont pas en union, ce sont ceux sans instruction qui ont le plus fréquemment des comportements sexuels à risque.

Tableau 12.3 Dernière personne avec laquelle les hommes ont eu des rapports sexuels

Répartition (en %) des hommes qui ont déjà eu des rapports sexuels selon le type de personne avec qui ils ont eu leurs derniers rapports sexuels, par caractéristiques socio-démographiques, EDSBF-II Burkina Faso 1998-99

Caractéristique	Hommes en union						Hommes qui ne sont pas en union						Ensemble des hommes						
	Épouse(s)	Partenaire régulier	Quelqu'un payé	Quelqu'un d'autre	Total <sup>1</sup>	Effectif	Épouse	Partenaire régulier	Quelqu'un payé	Quelqu'un d'autre	Total <sup>1</sup>	Effectif	Épouse(s)	Partenaire régulier	Quelqu'un payé	Quelqu'un d'autre	Total <sup>1</sup>	Effectif	
<b>Groupe d'âges</b>																			
15-19	*	*	*	*	*	9	1,9	47,5	1,7	48,9	100,0	162	6,9	45,1	1,6	46,4	100,0	171	
20-24	94,9	3,7	0,0	1,4	100,0	84	0,3	48,1	3,7	46,6	100,0	196	28,6	34,8	2,6	33,1	100,0	280	
25-29	89,7	4,2	0,5	5,6	100,0	221	2,5	53,0	3,1	41,4	100,0	123	58,5	21,6	1,5	18,4	100,0	343	
30-39	96,7	1,4	0,0	1,9	100,0	505	17,5	40,3	5,4	36,8	100,0	46	90,1	4,7	0,4	4,8	100,0	551	
40-49	97,8	1,9	0,0	0,2	100,0	412	*	*	*	*	*	15	96,1	2,3	0,0	1,4	100,0	427	
50-59	97,9	1,7	0,0	0,4	100,0	275	*	*	*	*	*	10	97,3	1,6	0,0	1,1	100,0	285	
<b>Milieu de résidence</b>																			
Urbain	94,3	2,9	0,0	2,6	100,0	240	2,6	61,3	1,5	34,6	100,0	218	50,6	30,7	0,7	17,8	100,0	458	
Rural	96,4	2,0	0,1	1,5	100,0	1 265	7,5	36,9	3,9	50,9	100,0	334	77,9	9,3	0,9	11,8	100,0	1 599	
<b>Niveau d'instruction</b>																			
Aucun	96,4	2,3	0,1	1,2	100,0	1 247	8,4	38,6	4,7	47,5	100,0	305	79,1	9,4	1,0	10,3	100,0	1 552	
Primaire	95,5	1,2	0,0	3,4	100,0	173	1,9	49,4	0,6	48,0	100,0	100	61,1	18,9	0,2	19,8	100,0	273	
Secondaire ou plus	92,6	2,3	0,0	4,3	100,0	85	2,2	61,1	1,0	35,8	100,0	148	35,3	39,6	0,6	24,3	100,0	233	
Ensemble des hommes	96,1	2,1	0,1	1,6	100,0	1 505	5,6	46,5	3,0	44,5	100,0	553	71,8	14,1	0,9	13,1	100,0	2 058	

<sup>1</sup> Y compris les "non-déterminés"

\* Basé sur trop peu de cas

## 12.2 MALADIES SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES

Dans la mesure où les maladies sexuellement transmissibles (MST) favorisent la transmission du virus du sida, la prévention de ces maladies constitue une priorité dans la lutte contre la propagation du sida en Afrique. Aussi, à l'EDSBF-II, a-t-on cherché à mesurer les niveaux de connaissance et de prévalence des MST au sein de la population.

### 12.2.1 Connaissance des MST

Pour estimer le niveau de connaissance des MST des femmes et des hommes enquêtés, on leur a demandé s'ils avaient déjà entendu parler de maladies qui "peuvent se transmettre sexuellement", et, si oui, lesquelles ils connaissaient.

Parmi les femmes, le niveau de connaissance des MST est assez faible, malgré les campagnes d'information et de sensibilisation (tableau 12.4). En effet, 48 % d'entre elles ont déclaré n'avoir entendu parler d'aucune de ces maladies. Par contre, chez les hommes, le niveau de connaissance de ces maladies est relativement élevé : seulement 12 % d'entre eux n'en connaissent aucune. Chez les femmes, c'est le sida qui a été le plus souvent cité (49 %) ; il est suivi de loin par la gonorrhée/blennorrhagie (12 %) et ensuite par la syphilis (8 %). Les autres MST ont été rarement citées. Les femmes les plus jeunes (15-19 ans) et les plus âgées (45-49 ans) connaissent moins fréquemment les MST que les autres. Il en est de même des femmes sexuellement inactives et des célibataires. C'est selon le milieu de résidence et le niveau d'instruction que l'on constate les différences les plus importantes. Les femmes n'ayant jamais entendu parler des MST sont plus de trois fois plus nombreuses en milieu rural (54 %) qu'en milieu urbain (16 %). Alors que 78 % des femmes urbaines connaissent le sida, cette proportion est de seulement 43 % en milieu rural. En milieu urbain, la proportion de femmes qui ont déclaré connaître la syphilis et la gonorrhée est de respectivement 30 % et 43 % ; en milieu rural, cette proportion est très faible (moins de 7 %). Au niveau régional, la syphilis et la gonorrhée ne sont d'ailleurs connues qu'à Ouagadougou (respectivement, 35 % et 40 %) et dans une moindre mesure dans la région Ouest (20 % des femmes ont cité la gonorrhée). En ce qui concerne la connaissance du sida, bien que Ouagadougou soit encore largement en tête (79 %), suivi de la région Ouest (58 %), le niveau de connaissance est relativement élevé dans toutes les autres régions (plus de 40 %). De plus, quelle que soit la MST, le niveau de connaissance augmente nettement avec le niveau d'instruction. Si 52 % des femmes non scolarisées n'ont jamais entendu parler des MST, la proportion est de 32 % parmi celles de niveau primaire et de seulement 3 % parmi celles ayant atteint, au moins, le niveau secondaire ou plus. Moins d'une femme non instruite sur deux connaît le sida ; on en compte près de deux sur trois (64 %) parmi les femmes de niveau primaire. La presque totalité des femmes de niveau d'instruction secondaire ou plus (95 %) connaissent le sida.

Pour toutes les MST et quelle que soit la caractéristique socio-démographique considérée, les niveaux de connaissance sont nettement plus élevés chez les hommes que chez les femmes. En effet, 86 % des hommes ont cité le sida, 41 % la gonorrhée et 26 % la syphilis.

Comme pour les femmes, le niveau de connaissance des MST varie selon l'âge. En général, ce sont les hommes les plus jeunes (15-19 ans) qui connaissent le moins ces maladies : à 15-19 ans, un homme sur quatre (25 %) a déclaré n'en connaître aucune. Du point de vue de l'état matrimonial, les hommes non célibataires et ceux qui sont sexuellement actifs sont les mieux informés. Par ailleurs, le milieu de résidence fait apparaître des écarts importants, mais moins importants que ceux constatés chez les femmes. Le niveau de connaissance du sida chez les hommes du milieu rural (84 %, contre 95 % chez les urbains) est plus élevé que celui des femmes urbaines (78 %). Ouagadougou mis à part, le niveau de connaissance des MST, en particulier du sida, varie peu d'une région à une autre. Il faut signaler, cependant, que la syphilis a été moins souvent citée (17 %) dans la région Ouest que dans les autres ; à l'inverse, la gonorrhée y a été plus souvent

Tableau 12.4. Connaissance des Maladies Sexuellement Transmissibles (MST)

Pourcentage de femmes et d'hommes qui connaissent certaines Maladies Sexuellement Transmissibles (MST), par MST spécifique et selon certaines caractéristiques socio-démographiques, EDSBF-II Burkina Faso 1998-99

Caractéristique	Femmes						Hommes						
	Syphilis	Blen-norrhagie	Sida	Condylome/ Tumeur génitale	Autre	Ne connaît aucune MST	Syphilis	Blen-norrhagie	Sida	Condylome/ Tumeur génitale	Autre	Ne connaît aucune MST	Effectif
<b>Groupe d'âges</b>													
15-19	5,8	7,7	41,5	0,5	2,2	57,2	11,1	20,3	73,4	0,1	4,4	25,4	599
20-24	9,2	14,5	50,8	1,0	5,3	45,6	28,1	45,4	86,0	1,1	10,9	12,1	395
25-29	9,1	15,2	53,5	1,0	8,1	42,8	38,0	48,5	91,3	1,2	20,2	5,7	374
30-39	9,0	14,1	51,7	1,5	6,3	43,8	31,9	52,6	91,8	1,1	15,7	6,0	558
40-49	5,0	9,1	49,4	1,4	5,6	46,7	30,6	46,5	91,2	2,0	19,0	6,2	428
50-59	-	-	-	-	-	-	22,8	35,2	87,1	0,0	21,7	11,3	287
<b>État matrimonial</b>													
Actuel, en union	6,5	11,1	49,2	1,1	5,6	47,1	28,9	46,0	91,6	1,0	18,6	6,7	1 505
Union rompue	15,0	21,5	54,6	1,7	9,9	39,9	30,4	54,4	85,6	1,5	21,2	11,6	51
Célibataire	12,2	15,2	47,9	1,0	3,1	50,4	22,5	32,8	78,5	0,8	7,8	19,0	1 085
- A eu des rap. sexuels	25,3	31,9	70,9	2,4	7,5	25,4	35,6	47,4	90,3	1,1	10,7	6,9	502
- N'a jamais eu de rap. sex.	7,0	8,6	38,9	0,4	1,4	60,2	11,3	20,2	68,4	0,4	5,4	29,4	583
<b>Milieu de résidence</b>													
Urbain	30,3	42,7	77,7	2,5	11,2	15,8	52,1	69,9	94,9	1,9	11,1	2,4	581
Rural	3,1	5,8	43,4	0,8	4,2	53,9	19,0	32,5	83,6	0,6	15,1	14,5	2 060
<b>Région</b>													
Ville de Ouagadougou	35,4	40,0	78,8	2,5	13,4	11,1	58,0	72,8	94,9	2,0	12,9	2,4	294
Nord	6,6	8,5	46,2	0,3	7,0	49,8	22,9	30,9	83,2	1,0	10,6	15,4	380
Est	3,2	6,3	42,1	1,2	2,1	55,9	20,4	24,0	84,6	0,9	27,6	13,5	729
Ouest	6,3	20,0	58,1	0,5	6,8	40,1	16,9	60,3	84,9	0,5	8,1	14,5	646
Centre/Sud	5,2	4,2	40,9	1,3	4,0	55,3	30,4	30,4	86,7	0,7	7,4	9,4	593
<b>Niveau d'instruction</b>													
Aucun	3,8	7,5	44,7	0,8	4,7	52,0	18,9	33,6	83,2	0,4	14,9	14,7	1 942
Primaire	13,2	22,1	63,7	1,7	7,9	31,6	29,4	47,3	92,0	0,7	11,1	6,5	373
Secondaire ou plus	57,2	64,6	94,9	4,3	11,1	2,8	66,6	75,7	96,6	4,1	14,1	1,1	327
Ensemble	7,7	12,1	49,2	1,1	5,4	47,5	26,3	40,7	86,1	0,9	14,2	11,9	2 641

mentionnée (60 %). Bien que le niveau de connaissance augmente avec l'instruction, la variation est plus faible que chez les femmes, surtout pour le sida.

### 12.2.2 Épisodes déclarés de MST

Lors de l'EDSBF-II, on a demandé aux femmes et aux hommes s'ils avaient eu une MST au cours des 12 derniers mois et, si oui, quelle MST ils avaient eue. Cependant, étant donné que certaines personnes peuvent avoir des MST sans le savoir, ou sans en reconnaître le type, mais aussi, du fait que certaines personnes avouent difficilement, surtout à l'occasion d'une enquête de type démographique, avoir eu de telles maladies souvent considérées comme honteuses surtout chez les femmes, il faut analyser les résultats présentés ici avec précaution. Les niveaux observés ne peuvent donc pas être considérés comme des mesures de la prévalence réelle des MST. Par ailleurs, au cours de l'enquête auprès des hommes, après leur avoir demandé s'ils avaient eu une MST et, si oui, laquelle, on leur a demandé si, au cours des 12 derniers mois, ils avaient eu un écoulement urétral et/ou un ulcère génital. Ces questions supplémentaires n'ont pas été posées aux femmes du fait de la difficulté pour ces dernières à distinguer ces symptômes d'autres manifestations non associées à des MST.

**Tableau 12.5 Maladies Sexuellement Transmissibles (MST) au cours des 12 derniers mois**

Pourcentage de femmes et d'hommes qui ont déclaré avoir eu une/des Maladies Sexuellement Transmissibles (MST) au cours des 12 mois ayant précédé l'enquête selon certaines caractéristiques socio-démographiques, EDSBF-II Burkina Faso 1998-99

Caractéristique	Femmes		Hommes	
	N'importe quelle MST	Effectif	N'importe quelle MST	Effectif
<b>Groupe d'âges</b>				
15-19	0,3	1 444	1,9	599
20-24	0,5	1 159	2,9	395
25-29	1,5	1 055	3,8	374
30-39	0,7	1 684	2,5	558
40-49	0,6	1 103	1,4	428
50-59	-	-	0,9	287
<b>État matrimonial</b>				
Actuel. en union	0,8	5 181	1,9	1 505
Union rompue	0,0	177	6,6	51
Célibataire	0,4	1 087	2,5	1 085
<b>Milieu de résidence</b>				
Urbain	2,1	1 086	4,3	581
Rural	0,4	5 359	1,7	2 060
<b>Région</b>				
Ville de Ouagadougou	2,8	544	6,2	294
Nord	0,7	904	1,1	380
Est	0,3	1 761	2,6	729
Ouest	0,9	1 489	2,2	646
Centre/Sud	0,2	1 748	0,5	593
<b>Niveau d'instruction</b>				
Aucun	0,5	5 531	2,0	1 942
Primaire	1,6	540	3,7	373
Secondaire ou plus	1,9	374	2,2	327
Ensemble	0,7	6 445	2,2	2 641

Note: Basé sur les déclarations des personnes enquêtées.

Dans le tableau 12.5 figurent les proportions de femmes et d'hommes qui ont déclaré avoir eu une MST au cours des 12 mois ayant précédé l'enquête. Aussi bien chez les hommes que chez les femmes, la prévalence des MST au cours des douze derniers mois est extrêmement faible : moins de 1 % des femmes et 2 % des hommes ont déclaré avoir eu une MST au cours des douze derniers mois.

### 12.2.3 Comportement face aux MST

Aux enquêtés ayant déclaré avoir eu une MST, on a posé d'autres questions afin de mieux cerner leur comportement et de connaître les mesures qu'ils avaient prises pour éviter d'infecter leurs partenaires. Notons cependant, que les effectifs de femmes (44) et d'hommes (59) concernés sont extrêmement réduits et ne permettent pas de tirer de conclusions, notamment au niveau différentiel. Les commentaires se limiteront donc aux effectifs globaux. Le tableau 12.6 montre que 71 % des femmes atteintes de MST ont cherché des traitements et que 85 % d'entre elles ont informé leurs partenaires de leur état. À l'opposé, plus de 47 % des femmes n'ont pris aucune mesure et seulement 14 % ont cessé les rapports sexuels pour éviter d'infecter leurs partenaires.

**Tableau 12.6 Maladies Sexuellement Transmissibles (MST) et comportement**

Parmi les femmes et les hommes qui ont déclaré avoir eu une/des Maladies Sexuellement Transmissibles (MST) au cours des 12 mois ayant précédé l'enquête, pourcentage de celles/ceux qui ont cherché des conseils ou un traitement, pourcentage de celles/ceux qui ont informé leur(s) partenaire(s) et pourcentage de celles/ceux ayant pris des mesures spécifiques pour éviter d'infecter leur partenaire, EDSBF-II Burkina Faso 1998-99

Caractéristique	% qui ont cherché conseils/traitement auprès d'un service de santé ou professionnel de la santé	% qui ont informé leur(s) partenaire(s)	Mesures prises pour éviter d'infecter le(s) partenaire(s)						Effectif avec MST
			A évité les rapports sexuels	A utilisé des condoms	A pris des médicaments	Autres	Aucune mesure : partenaire déjà infecté	Aucune mesure	
Ensemble des femmes	71,4	84,5	14,4	2,5	29,3	0,0	9,1	47,2	44
Ensemble des hommes	58,7	36,3	18,5	11,4	17,0	1,1	2,4	44,7	59

Globalement, il semble que les femmes ont eu un meilleur comportement que les hommes face aux MST. En effet, au cours de leur maladie, si 59 % des hommes ont recherché un traitement, seulement 36 % d'entre eux, (contre 85 % des femmes), ont informé leur partenaire de leur maladie. Environ 45 % des hommes malades n'ont rien fait et seulement 11 % ont utilisé le condom. Près de 19 % des hommes ont cessé d'avoir des rapports sexuels pour éviter d'infecter leurs partenaires.

## 12.3 CONNAISSANCE, PERCEPTION DU RISQUE ET PRÉVENTION DU SIDA

### 12.3.1 Connaissance du sida et sources d'information

Dans la section 12.2.1, la connaissance des MST, y compris du sida, a été abordée. Il s'agissait là seulement de la connaissance spontanée, c'est-à-dire du pourcentage de personnes qui ont déclaré spontanément connaître une MST spécifique. Aux personnes qui n'avaient pas mentionné le sida, on a posé une question supplémentaire : "Avez-vous déjà entendu parler d'une maladie appelée sida ?" Les personnes ayant répondu "oui" à cette question sont également prises en compte pour évaluer le niveau de connaissance du sida. Dans la section qui suit, la connaissance du sida se réfère donc à l'une ou l'autre source.

Les tableaux 12.7.1 et 12.7.2 montrent que la population burkinabè est relativement bien informée de l'existence du sida (87 % des femmes et 96 % des hommes), cela suite aux efforts conjugués d'information et de sensibilisation du Ministère de la Santé, du Comité national de Lutte contre le Sida (CNLS), d'associations et d'autres organisations non gouvernementales.

Des écarts dans le niveau de connaissance du sida sont observés entre les hommes et les femmes. En effet, 96 % des hommes et 87 % des femmes ont déclaré connaître ou avoir entendu parler de cette maladie<sup>1</sup>. Malgré ce niveau de connaissance global relativement élevé, certains groupes demeurent sensiblement moins favorisés. Il s'agit notamment des adolescentes de 15-19 ans (80 %), des femmes célibataires (81 %), des femmes du milieu rural (85 %), des femmes sans instruction (86 %) et des femmes résidant dans les régions Nord et Est (respectivement, 84 % et 83 %). Chez les hommes, quelle que soit la catégorie, plus de neuf hommes sur dix ont déclaré connaître le sida.

On a également demandé aux enquêtés, les canaux par lesquels ils avaient été informés de l'existence de cette maladie. Chez les femmes, les principales sources d'information sur le sida sont, par ordre d'importance, la radio (56 %), les amis et parents (54 %), les services et agents de santé (16 %), la télévision (13 %). Les autres sources n'interviennent que dans environ 5 % des cas. En moyenne, les femmes ont cité 1,7 différentes sources d'information. Ce sont les femmes ayant un niveau secondaire ou plus et celles vivant en milieu urbain qui ont cité le plus grand nombre de sources d'information (respectivement, 2,5 et 3,1 en moyenne). À l'opposé, les femmes du milieu rural et celles sans instruction en ont citées le moins (1,6 dans chaque cas). Les sources d'information sont différentes d'un groupe à un autre. Si la radio et les personnels de santé ont joué un rôle prépondérant parmi les femmes adultes (20 à 39 ans), les non célibataires, en milieu urbain et parmi les femmes instruites, il n'en est pas de même de la télévision qui a davantage touché les femmes les plus jeunes et les non mariées. Cette dernière source a été également plus fréquemment citée par les urbaines et les femmes instruites, celles de niveau secondaire ou plus notamment, que par leurs homologues du milieu rural et que par celles n'ayant pas d'instruction. Comme on pouvait s'y attendre, les journaux et autres affiches ainsi que l'école, ont eu plus d'impact sur les femmes urbaines et sur celles qui sont scolarisées. La source d'information la plus commune à tous les groupes est la communication *interpersonnelle* (amis, parents et autres relations), même si chez les célibataires, souvent plus jeunes, à Ouagadougou et dans la région Nord, et parmi les femmes de niveau secondaire ou plus, ce mode de circulation de l'information a été moins fréquemment cité.

Comme pour les femmes, les principales sources d'information des hommes sont : la radio (81 %), les amis et parents (69 %), les services et agents de santé (22 %), et la télévision (32 %). Les autres sources jouent un rôle mineur, mais néanmoins plus important que chez les femmes : journaux (10 %), affiches (5 %), et école (5 %). Les hommes ont, en outre, plus fréquemment accès aux différentes sources d'information (en moyenne, 2,6 sources d'information différentes, contre 1,7 chez les femmes). Par ailleurs, à ce sujet, la population masculine est plus homogène : le nombre moyen de sources différentes varie peu d'un groupe à un autre, même si les sources sont plus diverses chez les hommes du milieu urbain (plus de 3, en moyenne) et chez ceux de niveau d'instruction secondaire ou plus (plus de 4).

Les sources d'information sont différentes selon certaines caractéristiques socio-démographiques. Les hommes adultes (20 à 49 ans), ceux du milieu urbain, ceux de la Ouagadougou et les plus instruits sont ceux qui ont mentionné le plus de sources d'information. Par contre, ce que nous appelons *la communication interpersonnelle* est plus fréquente en milieu rural, parmi les non scolarisés et, dans une moindre mesure, chez ceux n'ayant que le niveau primaire. Excepté la ville de Ouagadougou, les régions, de l'Est et du Nord sont celles où la radio, la télévision, les journaux et affiches, et *la communication interpersonnelle*

---

<sup>1</sup> Selon le tableau 11.4, 49 % des femmes et 86 % des hommes avaient cité spontanément le sida comme une MST.

Tableau 12.7.1 Connaissance du sida par les femmes

Pourcentage de femmes qui connaissent le sida et pourcentage de celles qui ont entendu parler du sida selon les principales sources d'information, selon certaines caractéristiques socio-démographiques, EDSBF-II Burkina Faso 1998-99

Caractéristique	Connaît le sida	Sources d'information sur le sida											Nombre moyen de sources	
		Radio	TV	Journaux/ Magazines	Dépliants/ Affiches	Agent de santé	Mosquée/ Église	École	Réunion d'association	Amis parents	Lieu de travail	Autres		Effectif
<b>Groupe d'âges</b>														
15-19	80,1	46,1	17,9	2,5	0,7	7,4	0,7	4,8	1,5	49,0	0,1	5,5	1 444	1,7
20-24	89,3	61,7	15,9	2,7	0,5	16,3	0,6	2,6	1,8	54,2	0,8	4,6	1 159	1,8
25-29	90,6	60,5	13,0	2,1	1,3	21,9	0,7	0,2	2,8	54,2	0,6	5,3	1 055	1,8
30-39	90,2	60,1	10,9	2,0	0,6	19,4	0,6	0,2	2,7	55,6	0,5	5,1	1 684	1,7
40-49	86,4	51,0	6,1	0,6	0,7	15,7	0,9	0,0	3,8	55,8	0,9	6,2	1 103	1,6
<b>État matrimonial</b>														
Actuel. en union	88,5	57,0	9,3	1,1	0,6	17,7	0,6	0,3	2,6	55,2	0,4	5,0	5 181	1,7
Union rompue	85,7	58,0	21,5	4,1	0,4	16,1	1,7	0,0	2,1	48,1	2,1	7,0	177	1,9
Jamais en union	81,1	49,7	28,5	5,7	1,2	7,6	0,9	8,4	2,1	47,5	0,9	6,6	1 087	2,0
<b>Milieu de résidence</b>														
Urbain	98,7	83,1	57,2	10,2	1,8	21,4	1,3	8,0	3,1	50,9	2,1	8,5	1 086	2,5
Rural	84,9	50,2	3,9	0,3	0,5	14,8	0,6	0,3	2,3	54,2	0,2	4,7	5 359	1,6
<b>Région</b>														
Ville de Ouagadougou	98,9	86,7	63,6	14,4	2,8	21,9	2,1	9,0	2,9	38,0	1,8	8,0	544	2,5
Nord	84,0	55,1	6,7	1,4	0,4	11,7	0,2	1,2	1,7	43,3	0,5	4,7	904	1,5
Est	82,6	42,5	5,4	0,8	1,0	19,0	0,8	1,0	3,8	53,8	0,6	6,1	1 761	1,6
Ouest	90,5	55,6	15,8	1,2	0,5	13,1	0,5	0,9	1,1	68,1	0,1	6,3	1 489	1,8
Centre/Sud	87,0	60,0	5,4	0,3	0,2	15,6	0,6	0,7	2,6	51,5	0,4	3,2	1 748	1,6
<b>Niveau d'instruction</b>														
Aucun	85,5	52,0	6,5	0,2	0,4	14,9	0,5	0,0	2,2	54,3	0,3	4,7	5 531	1,6
Primaire	95,5	72,5	33,5	3,1	0,6	21,8	1,6	3,7	2,5	54,9	1,4	6,8	540	2,1
Secondaire ou plus	99,7	86,6	76,9	27,5	5,5	22,5	2,1	22,4	6,4	43,2	2,9	12,5	374	3,1
Ensemble des femmes	87,2	55,8	12,9	2,0	0,7	15,9	0,7	1,6	2,5	53,7	0,5	5,3	6 445	1,7

Note : Le nombre moyen de sources est basé sur les enquêtés qui connaissent le sida.

**Tableau 12.7.2 Connaissance du sida par les hommes**

Pourcentage d'hommes qui connaissent le sida et pourcentage de ceux qui ont entendu parler du sida selon les principales sources d'information, selon certaines caractéristiques socio-démographiques, EDSBF-II Burkina Faso 1998-99

Caractéristique	Connait le sida	Sources d'information sur le sida											Nombre moyen de sources	
		Radio	TV	Journaux/ Magazines	Dépliants/ Affiches	Agent de santé	Mosquée/ Église	École	Réunion d'association	Amis parents	Lieu de travail	Autres		Effectif
<b>Groupe d'âges</b>														
15-19	91,2	64,6	34,6	7,6	4,1	13,2	1,6	12,0	2,8	61,4	1,0	9,1	599	2,3
20-24	96,4	82,1	42,4	12,1	4,9	18,4	3,4	10,8	4,9	68,4	2,1	13,1	395	2,7
25-29	98,3	89,5	40,9	14,4	7,9	23,1	1,5	4,5	3,5	71,3	2,5	14,4	374	2,8
30-39	97,9	89,4	31,7	10,0	5,4	24,7	2,9	0,9	6,0	72,1	3,1	13,3	558	2,7
40-49	98,8	86,3	25,7	10,5	4,0	33,0	4,9	0,8	3,9	72,7	3,9	12,5	428	2,6
50-59	96,8	74,6	13,5	4,3	2,1	21,4	3,5	0,0	6,6	72,2	1,5	13,9	287	2,2
<b>État matrimonial</b>														
Actuel. en union	98,2	85,9	26,0	8,0	4,2	26,8	3,4	1,0	5,5	73,1	2,8	13,6	1 505	2,6
Union rompue	95,4	77,6	39,9	13,0	5,3	14,6	4,6	1,3	0,0	65,2	1,5	8,4	51	2,4
Célibataire	93,5	73,4	40,7	12,2	5,6	15,5	2,1	11,5	3,3	63,7	1,8	11,0	1 085	2,6
<b>Milieu de résidence</b>														
Urbain	99,8	92,8	77,8	35,0	15,8	20,2	4,1	15,5	6,0	57,2	9,1	24,2	581	3,6
Rural	95,3	77,2	19,5	2,8	1,7	22,4	2,5	2,5	4,0	72,5	0,5	9,1	2 060	2,3
<b>Région</b>														
Ville de Ouagadougou	99,8	93,6	77,9	32,5	9,7	14,6	4,0	12,6	3,3	48,2	6,0	20,1	294	3,2
Nord	96,6	82,0	30,8	5,7	0,9	20,6	4,2	3,6	8,2	58,7	1,1	9,9	380	2,3
Est	93,7	65,7	17,1	3,8	2,0	22,8	3,0	4,2	4,6	71,2	0,9	12,9	729	2,2
Ouest	97,1	83,8	41,9	14,3	10,2	19,6	3,2	6,7	3,6	77,7	5,0	17,4	646	2,9
Centre/Sud	96,4	88,1	19,0	3,9	2,3	27,8	1,0	2,6	3,4	74,1	0,2	4,2	593	2,4
<b>Niveau d'instruction</b>														
Aucun	95,1	77,7	20,4	1,7	1,5	20,8	2,5	0,2	3,6	72,1	1,3	9,7	1 942	2,2
Primaire	98,9	87,4	49,1	14,3	6,7	24,9	4,7	4,9	6,3	68,8	5,1	15,1	373	2,9
Secondaire ou plus	100,0	90,3	83,7	53,3	22,0	25,3	3,1	36,0	7,4	51,7	5,6	25,6	327	4,1
Ensemble des hommes	96,2	80,6	32,3	9,9	4,8	21,9	2,9	5,3	4,5	69,1	2,4	12,4	2 641	2,6

Note : Le nombre moyen de sources est basé sur les enquêtés qui connaissent le sida.

ont le moins servi à informer les populations de l'existence du sida. Il en est de même de la région Centre/Sud pour la télévision, les journaux et affiches. Enfin, les hommes non mariés, ont été plus souvent informés que les mariés par la télévision, les journaux et affiches, et l'école.

Toutes les sources d'information inventoriées ont été plus souvent citées par les hommes que par les femmes. En particulier, les journaux et affiches sont vraisemblablement de très mauvais canaux pour atteindre les femmes. Par ailleurs, contrairement à ce qu'on pourrait penser, du fait de leur contact plus fréquent avec les services de santé (consultations prénatales et postnatales, vaccination, etc.), les femmes ont moins souvent cité les personnels de santé comme source d'information (16 %, contre 22 % pour les hommes).

Par rapport à 1993 (EDSBF-I) qui avait déjà révélé des niveaux de connaissance élevés du sida (84 % des femmes et 94 % des hommes), les progrès sont assez faibles (respectivement, 87 et 96 % à l'EDSBF-II). Par contre, des succès significatifs sont enregistrés dans la diversification des sources d'information. Aussi bien chez les femmes que chez les hommes, la réception d'information à la radio et/ou à la télévision (respectivement, 40 % et 58 % en 1993) a nettement augmenté. Les améliorations les plus importantes ont été observées au niveau des personnels de santé, surtout pour les hommes. En effet, de 6 %

des femmes et 7 % des hommes qui avaient reçu des informations des personnels de santé en 1993, on est passé à, respectivement, 16 % et 21 % en 1998-99. En outre, *la communication interpersonnelle* sur le sida est devenue nettement plus fréquente chez les hommes (69 % contre 30 % en 1993), contrairement aux femmes parmi lesquelles l'augmentation a été bien plus lente (48 % contre 54 %).

### 12.3.2 Connaissance des moyens de prévention du sida

On a demandé aux femmes et aux hommes connaissant le sida, si elles/ils connaissaient des moyens pour éviter de le contracter (tableaux 12.8.1 et tableaux 12.8.2). Selon les résultats présentés dans ce tableau, 9 % des femmes pensent que rien ne peut être fait pour éviter de contracter le sida et 30 % n'ont cité aucun moyen spécifique d'éviter de contracter cette maladie. On peut donc dire que, dans l'ensemble, 39 % des femmes ne savent pas comment se protéger du sida.

Les moyens de protection que les femmes ont le plus fréquemment cités sont la fidélité, c'est-à-dire avoir un seul partenaire (49 %), l'utilisation du condom (24 %) et l'abstinence sexuelle (7 %). Éviter les transfusions sanguines (3 %) et les injections (moins de 2 %) et éviter de fréquenter les prostituées (1 %) n'ont été que très rarement cités comme moyens de prévention du sida. Les femmes qui ont le plus souvent déclaré qu'il n'existe aucun moyen de prévention sont, celles du milieu rural (10 %, contre 5 % en milieu urbain), celles des régions Nord (10 %, contre 7 % à Ouagadougou) et du Centre/Sud (10 %), et les femmes non instruites ou de niveau primaire (plus de 8 %). Les moyens spécifiques de prévention ont été cités avec des fréquences très variables dans les différentes sous-populations. L'abstinence a été plus souvent citée par les femmes de 15-19 ans (12 %), les célibataires (16 %), les urbaines (12 % contre 5 % en milieu rural), les résidentes de Ouagadougou (16 %) et les femmes de niveau secondaire ou plus (20 %). Le condom, comme moyen de prévention, a été très peu cité par les femmes âgées de 45-49 ans (moins de 15 %), les femmes actuellement en union (21 %, contre plus de 30 % chez les non en union), celles du milieu rural (16 %, contre 59 % en milieu urbain), celles de la région Est (moins de 16 %, contre plus de 20 % dans les autres régions) et les femmes sans instruction (moins de 18 % contre 76 % chez celles de niveau secondaire ou plus). En ce qui concerne le moyen de prévention le plus cité, à savoir la fidélité ou avoir un seul partenaire, sa fréquence augmente avec l'âge. La proportion de femmes évoquant la fidélité est, en outre, plus élevée parmi celles en union, celles résidant dans les régions Est (57 %) et Ouest (53 %). D'autres moyens spécifiques de prévention rarement cités en général, (éviter les prostituées, l'injection et la transfusion) concernent surtout le milieu urbain et les femmes de niveau secondaire ou plus. Enfin, il faut signaler que les moyens de prévention associés à des modes de transmission comme les piqûres de moustique n'ont pratiquement pas été mentionnés.

Par rapport aux femmes, les hommes ont été proportionnellement moins nombreux à déclarer qu'on ne pouvait éviter le sida (5 % contre 9 % chez les femmes) (tableau 12.8.2 et graphique 12.1). Par ailleurs, alors que 30 % des femmes ont été incapables de citer un moyen de prévention spécifique quelconque du sida, la proportion n'est que de 16 % chez les hommes.

Contrairement aux femmes qui ont plus fréquemment cité la fidélité, les hommes ont plus fréquemment mentionné le condom, en tant que moyen de protection contre le sida (57 %). Ensuite, viennent dans l'ordre, la fidélité (53 %) et l'abstinence sexuelle (13 %). Comme pour les femmes, les autres moyens éviter les prostituées (3 %), éviter les transfusions (4 %), éviter les injections (2 %) ont été rarement cités. La connaissance du condom est surtout le fait des plus jeunes (67 % à 20-24 ans), des célibataires (62 %), de ceux vivant en milieu urbain (79 %), à Ouagadougou (77 %) et des hommes de niveau secondaire ou plus (88 %). Il faut signaler cependant, que même en milieu rural, un homme sur deux a cité le condom (contre seulement 16 % des femmes). Les écarts les plus importants entre les hommes et les femmes sont surtout observés en milieu rural et chez les non instruits. Chez les hommes également, la proportion de ceux qui ont

Tableau 12.8.1 Connaissance par les femmes des moyens d'éviter de contracter le sida

Parmi les femmes qui connaissent le sida, pourcentage de celles qui connaissent différents moyens d'éviter de contracter le sida selon les caractéristiques socio-démographiques, EDSBF-II Burkina Faso 1998-99

Caractéristique	Ne peut être évité	S'abstenir de rapports sexuels	Utiliser les condoms	Avoir un partenaire	Éviter les prostituées	Éviter les transfusions	Éviter les injections	Éviter les piqûres de moustiques	Autres moyens	Ne connaît aucun moyen	Pourcentage ayant de mauvaises informations	Effectif de femmes connaissant le sida
<b>Groupe d'âges</b>												
15-19	10,3	11,7	27,1	35,5	1,0	2,5	1,5	0,2	20,2	34,8	20,4	1 156
20-24	8,6	5,8	30,2	50,4	1,4	4,2	2,1	0,2	23,4	26,3	23,7	1 035
25-29	8,0	5,1	27,9	51,2	0,9	4,1	1,0	0,0	23,9	27,1	23,9	956
30-39	9,6	5,4	20,8	52,3	0,8	3,3	1,6	0,2	20,1	29,7	20,2	1 519
40-49	7,9	5,5	14,4	54,5	1,0	2,5	1,0	0,0	20,5	30,9	20,5	953
<b>État matrimonial</b>												
Actuellement en union	9,3	4,9	21,2	51,8	0,9	3,0	1,2	0,1	20,7	29,6	20,8	4 586
Union rompue	7,6	7,1	30,3	39,4	0,5	2,9	2,1	0,0	25,0	35,4	25,0	152
Jamais en union	7,9	16,1	36,9	34,3	1,6	4,6	2,7	0,3	24,7	30,1	24,9	882
<b>Résidence</b>												
Urbain	4,8	12,4	58,7	48,8	2,5	9,9	6,0	0,3	37,0	11,9	37,3	1 071
Rural	10,0	5,4	15,8	48,7	0,6	1,7	0,4	0,1	17,8	34,1	17,9	4 547
<b>Région</b>												
Ville de Ouagadougou	6,8	15,9	61,4	35,5	1,9	6,0	3,8	0,4	33,1	12,9	33,5	537
Nord	10,2	7,4	23,6	38,3	0,3	0,5	0,1	0,0	13,1	37,5	13,1	759
Est	7,8	5,4	15,8	56,7	0,8	0,4	0,2	0,1	14,1	29,1	14,1	1 454
Ouest	8,9	5,7	22,4	53,4	2,1	10,0	3,9	0,1	29,1	32,1	29,2	1 348
Centre/Sud	10,4	5,3	20,0	46,7	0,2	0,5	0,4	0,2	21,8	30,8	21,9	1 520
<b>Niveau d'instruction</b>												
Aucun	9,6	5,5	17,5	49,2	0,8	2,4	0,8	0,1	18,6	33,2	18,7	4 731
Primaire	8,3	8,6	45,5	44,4	1,1	5,2	3,1	0,0	28,8	17,5	28,8	515
Secondaire ou plus	2,9	19,9	75,7	47,9	2,8	12,5	7,7	0,6	47,5	4,5	48,2	373
Ensemble des femmes	9,0	6,7	23,9	48,7	1,0	3,3	1,5	0,2	21,5	29,9	21,6	5 619

Note: Le pourcentage avec de "mauvaises informations" comprend les catégories suivantes: éviter d'embrasser, éviter de vivre avec un sidéen, chercher la protection des guérisseurs traditionnels, de Dieu, éviter de boire/manger dans la même vaisselle qu'un sidéen, etc.


Tableau 12.8.2 Connaissance par les hommes des moyens d'éviter de contracter le sida

Parmi les hommes qui connaissent le sida, pourcentage de celles qui connaissent différents moyens d'éviter de contracter le sida selon les caractéristiques socio-démographiques, EDSBF-II Burkina Faso 1998-99

Caractéristique	Ne peut être évité	S'abstenir de rapports sexuels	Utiliser les condoms	Avoir un partenaire	Éviter les prostituées	Éviter les transfusions	Éviter les injections	Éviter les piqûres de moustiques	Autres moyens	Ne connaît aucun moyen	Pourcentage ayant de mauvaises informations	Effectif d'hommes connaissant le sida
<b>Groupe d'âges</b>												
15-19	5,2	13,8	55,6	29,5	1,6	2,7	0,8	0,2	29,5	26,3	29,7	546
20-24	3,9	15,2	66,7	47,3	4,8	5,4	2,5	0,2	43,4	13,1	43,7	381
25-29	5,4	13,9	65,5	54,4	2,2	5,6	4,8	0,3	43,6	11,2	43,6	368
30-39	5,3	10,8	59,8	65,7	3,9	5,3	2,6	0,2	43,1	10,6	43,7	546
40-49	4,9	10,2	52,3	68,3	2,4	4,4	1,9	0,3	38,2	11,5	38,2	423
50-59	6,1	10,8	32,9	58,9	4,7	1,3	1,7	0,0	33,4	19,4	33,4	278
<b>État matrimonial</b>												
Actuellement en union	5,7	9,8	52,9	65,2	3,7	3,8	2,1	0,2	38,6	13,0	38,9	1 478
Union rompue	9,9	12,6	56,1	46,8	4,9	5,3	2,7	0,0	40,9	18,1	40,9	49
Jamais en union	4,0	16,3	61,9	36,0	2,2	4,7	2,6	0,2	38,0	19,1	38,1	1 015
<b>Résidence</b>												
Urbain	1,8	18,3	78,8	47,8	3,0	7,4	6,1	0,0	57,5	5,1	57,7	579
Rural	6,1	10,7	50,0	54,8	3,2	3,3	1,2	0,3	32,8	18,6	33,0	1 963
<b>Région</b>												
Ville de Ouagadougou	2,0	22,8	77,4	37,3	3,1	6,9	6,7	0,0	51,0	5,1	51,4	293
Nord	3,9	21,4	49,9	53,0	2,7	5,9	1,1	0,2	32,3	19,0	32,3	367
Est	2,6	15,3	54,0	57,9	3,3	1,6	1,2	0,3	29,5	12,0	29,5	683
Ouest	8,8	4,6	53,2	56,3	4,7	4,1	1,9	0,0	48,0	22,3	48,4	627
Centre/Sud	6,4	6,6	57,0	52,5	1,5	5,1	2,5	0,4	36,1	15,6	36,3	572
<b>Niveau d'instruction</b>												
Aucun	6,1	9,7	49,5	55,4	3,4	2,4	1,2	0,2	33,0	18,7	33,2	1 847
Primaire	4,3	14,4	63,8	47,7	2,1	5,2	3,7	0,3	43,8	12,5	44,1	368
Secondaire ou plus	0,6	25,9	88,0	47,1	2,9	13,2	6,9	0,0	62,8	1,4	63,0	327
Ensemble des hommes	5,1	12,5	56,6	53,2	3,1	4,2	2,3	0,2	38,4	15,5	38,6	2 542

Note: Le pourcentage avec de "mauvaises informations" comprend les catégories suivantes: éviter d'embrasser, éviter de vivre avec un sidéen, chercher la protection des guérisseurs traditionnels, de Dieu, éviter de boire/manger dans la même vaisselle qu'un sidéen, etc.

**Graphique 12.1**  
Moyens d'éviter le sida cités par les femmes  
et les hommes connaissant le sida



EDSBF-II 1998-99

citée “ se limiter à une partenaire ” augmente avec l’âge; elle est moins élevée en milieu urbain (48 % contre 55 % en milieu rural), à Ouagadougou (37 % contre plus de 52 % ailleurs) et chez les hommes instruits (47-48 % contre 55 % chez les non scolarisés). L’abstinence sexuelle a été plus fréquemment citée par les plus jeunes (qui comptent aussi plus de célibataires), en milieu urbain (18 % contre 11 % en milieu rural), dans la ville de Ouagadougou (23 %) et du Nord (21 %), et enfin par les hommes de niveau secondaire ou plus (26 %).

La connaissance de trois moyens de prévention appropriés (utilisation du condom, fidélité, éviter les prostituées) a différemment varié entre 1993 (EDSBF-I) et 1998-99 (EDSBF-II). Des progrès très significatifs ont été enregistrés dans l’identification du condom comme moyen de prévention aussi bien chez les femmes (17 % en 1993 et 24 % en 1998-99) que chez les hommes (37 % et 57 %, respectivement, aux deux dates). Par contre, la fréquence de la fidélité a, à peine, augmenté chez les femmes (45 % et 49 %) et, elle a peut-être diminuer chez les hommes (56 % et 53 %). Enfin, le fait d’éviter les prostituées a été moins cité en 1998-99 qu’en 1993 (respectivement, 1 et 3 % chez les femmes et 3 et 12 % chez les hommes).

### 12.3.3 Perception du sida

Des questions sur la perception du sida ont également été posées à toutes les personnes ayant déclaré connaître ou avoir entendu parler du sida. En ce qui concerne les femmes (tableau 12.9.1), on constate que seulement 49 % d’entre elles, soit près d’une femme sur deux, pensent qu’une personne apparemment en bonne santé peut être porteuse du VIH. Là encore, les femmes urbaines (78 %), celles de Ouagadougou (79 %) et celles ayant un niveau d’instruction secondaire ou plus (91 %) sont beaucoup mieux informées que leurs consœurs du milieu rural (42 %), des autres régions (moins de 50 %), et de celles n’ayant pas d’instruction (44 %). Le pourcentage de femmes sachant qu’un porteur du virus peut paraître sain augmente nettement avec le niveau d’instruction. Il faut cependant noter que 33 % des femmes ont déclaré ne pas avoir d’opinion sur la question. Cela est surtout fréquent en milieu rural et chez les femmes sans instruction (respectivement, 38 % et 37 %).

Tableau 12.9.1 Perception du sida par les femmes

Répartition (en %) des femmes qui connaissent le sida selon leur opinion sur l'apparence des malades, sur la létalité du sida, sur la possibilité de guérison du sida et selon leur connaissance de la transmission du sida mère/enfant et pourcentage de femmes connaissant quelqu'un ayant le sida ou mort du sida, par caractéristiques socio-démographiques, EDSBF-II Burkina Faso 1998-99

Caractéristique	Personne qui paraît en bonne santé peut avoir le sida			Le sida est mortel			Personne avec le sida peut être guérie			Transmission mère/enfant			Pourcentage connaissant une personne ayant le sida/morte du sida		Effectif de femmes connaissant le sida				
	Non	Oui	NSP	Presque			Oui	Non	NSP	Total	Non	Oui	NSP	Total		Total			
				Total	Presque jamais	Parfois											toujours	Total	Total
<b>Groupe d'âges</b>																			
15-19	22,5	46,6	30,9	100,0	0,4	8,6	81,5	9,3	100,0	86,5	3,0	10,5	100,0	14,6	48,2	37,0	100,0	37,3	1 156
20-24	19,6	53,5	26,7	100,0	0,2	7,4	83,5	8,8	100,0	88,1	2,8	9,0	100,0	12,6	59,8	27,4	100,0	39,0	1 035
25-29	17,5	50,5	31,9	100,0	0,4	8,1	82,7	8,5	100,0	87,0	2,6	10,4	100,0	10,1	59,0	30,6	100,0	39,3	956
30-39	16,4	49,1	34,5	100,0	0,3	7,2	82,0	10,4	100,0	85,9	2,4	11,4	100,0	9,9	56,9	33,2	100,0	37,8	1 519
40-49	16,8	43,7	39,5	100,0	0,2	5,2	82,1	12,5	100,0	84,0	1,4	14,5	100,0	10,3	52,4	37,2	100,0	41,9	953
<b>État matrimonial</b>																			
Actuellement en union	18,6	47,3	34,0	100,0	0,3	6,8	82,5	10,3	100,0	85,9	2,3	11,7	100,0	11,5	54,9	33,5	100,0	38,3	4 586
Union rompue	11,3	55,7	33,0	100,0	0,0	9,9	81,6	8,5	100,0	84,6	4,3	10,6	100,0	11,9	58,8	28,9	100,0	43,8	152
Jamais en union	19,4	54,6	26,0	100,0	0,6	10,0	81,2	8,1	100,0	88,7	3,0	8,3	100,0	11,4	56,4	31,9	100,0	40,8	882
<b>Milieu de résidence</b>																			
Urbain	9,8	78,0	12,1	100,0	0,4	9,3	87,7	2,4	100,0	94,2	2,4	3,3	100,0	3,0	86,8	10,0	100,0	54,6	1 071
Rural	20,6	41,8	37,6	100,0	0,3	6,9	81,0	11,7	100,0	84,4	2,5	13,0	100,0	13,5	47,8	38,6	100,0	35,2	4 547
<b>Région</b>																			
Ville de Ouagadougou	11,1	78,5	10,3	100,0	0,8	12,0	84,3	2,6	100,0	91,8	3,8	4,2	100,0	2,9	88,9	8,1	100,0	53,9	537
Nord	20,8	41,7	37,6	100,0	0,9	5,9	78,4	14,8	100,0	81,6	2,8	15,4	100,0	12,1	46,4	41,1	100,0	33,6	759
Est	22,0	43,2	34,6	100,0	0,2	5,6	86,2	7,8	100,0	87,0	2,0	10,9	100,0	12,7	51,1	36,2	100,0	38,0	1 454
Ouest	21,7	48,8	29,5	100,0	0,2	5,3	82,0	12,5	100,0	87,2	1,7	10,9	100,0	13,9	57,1	29,0	100,0	39,8	1 348
Centre/Sud	13,8	46,9	39,3	100,0	0,1	10,0	80,1	9,7	100,0	85,2	2,8	11,8	100,0	10,9	50,1	38,8	100,0	36,2	1 520
<b>Niveau d'instruction</b>																			
Aucun	19,3	43,5	37,2	100,0	0,3	6,6	81,9	11,2	100,0	84,8	2,4	12,6	100,0	12,8	49,6	37,4	100,0	35,6	4 731
Primaire	19,7	65,9	14,3	100,0	0,6	9,0	85,6	4,8	100,0	92,6	2,5	4,8	100,0	6,1	77,5	16,3	100,0	55,0	515
Secondaire ou plus	6,4	91,4	2,2	100,0	0,6	15,2	83,2	0,8	100,0	96,2	2,8	1,0	100,0	2,2	95,6	2,3	100,0	57,3	373
Ensemble des femmes	18,5	48,7	32,7	100,0	0,3	7,4	82,3	9,9	100,0	86,3	2,5	11,1	100,0	11,5	55,2	33,1	100,0	38,9	5 619

Tableau 12.9.2 Perception du sida par les hommes

Répartition (en %) des hommes qui connaissent le sida selon leur opinion sur l'apparence des malades, sur la létalité du sida, sur la possibilité de guérison du sida et selon leur connaissance de la transmission du sida mère/enfant et pourcentage d'hommes connaissant quelqu'un ayant le sida ou mort du sida, par caractéristiques socio-démographiques, EDSBF-II Burkina Faso 1998-99

Caractéristique	Personne qui paraît en bonne santé peut avoir le sida			Le sida est mortel			Personne avec le sida peut être guérie			Transmission mère/enfant			Pourcentage connaissant une personne ayant le sida/morte du sida		Effectif d'hommes connaissant le sida					
	Non	Oui	NSP	Total	Presque jamais	Parfois	Presque toujours	NSP	Total	Non	Oui	NSP	Total	Non		Oui	NSP	Total		
																			Total	Total
<b>Groupe d'âges</b>																				
15-19	13,4	63,5	22,9	100,0	0,5	11,0	82,6	5,9	100,0	90,4	3,0	6,6	100,0	9,7	54,2	35,6	100,0	37,6	546	
20-24	10,7	74,8	14,1	100,0	0,0	10,0	86,1	3,9	100,0	92,3	2,8	4,4	100,0	6,0	71,0	21,5	100,0	48,4	381	
25-29	9,7	78,5	11,3	100,0	0,2	13,6	83,7	2,6	100,0	94,7	2,6	2,3	100,0	8,1	68,0	23,0	100,0	49,8	368	
30-39	8,6	76,7	14,7	100,0	0,7	9,1	85,4	4,7	100,0	94,8	2,3	2,8	100,0	4,9	72,6	21,9	100,0	56,8	546	
40-49	8,8	75,6	14,8	100,0	0,0	8,2	89,0	2,8	100,0	94,9	1,9	2,9	100,0	7,9	67,8	23,6	100,0	57,1	423	
50-59	13,6	57,9	28,1	100,0	0,7	7,4	83,2	8,7	100,0	91,0	3,4	5,7	100,0	9,4	52,3	37,5	100,0	49,7	278	
<b>État matrimonial</b>																				
Actuellement																				
en union	10,2	72,6	16,7	100,0	0,3	8,5	86,5	4,7	100,0	94,3	2,3	3,3	100,0	7,2	66,4	25,6	100,0	54,1	1 478	
Union rompue	7,5	75,7	16,7	100,0	1,6	14,2	82,8	1,3	100,0	97,0	3,0	0,0	100,0	7,7	74,7	16,2	100,0	51,8	49	
Jamais en union	11,5	69,9	18,3	100,0	0,4	11,9	82,9	4,8	100,0	91,1	3,1	5,5	100,0	8,0	61,8	29,3	100,0	43,2	1 015	
<b>Milieu de résidence</b>																				
Urbain	4,8	88,3	6,4	100,0	0,7	17,8	79,0	2,6	100,0	91,9	4,7	2,7	100,0	2,6	89,1	7,3	100,0	54,8	579	
Rural	12,4	66,7	20,6	100,0	0,3	7,7	86,8	5,3	100,0	93,4	2,0	4,5	100,0	9,0	57,5	32,7	100,0	48,2	1 963	
<b>Région</b>																				
Ville de																				
Ouagadougou	4,9	88,5	5,8	100,0	1,1	27,1	69,0	2,9	100,0	89,1	7,1	2,9	100,0	2,2	90,7	5,5	100,0	56,1	293	
Nord	14,0	56,0	29,1	100,0	0,6	8,0	88,7	2,7	100,0	90,1	2,2	7,7	100,0	8,8	56,2	33,5	100,0	40,0	367	
Est	13,7	65,9	20,5	100,0	0,1	5,9	90,6	3,4	100,0	94,2	1,8	3,9	100,0	5,8	63,2	30,4	100,0	47,4	683	
Ouest	12,6	73,3	13,4	100,0	0,0	2,5	94,7	2,7	100,0	94,6	2,5	2,5	100,0	8,9	63,3	26,9	100,0	44,8	627	
Centre/Sud	5,8	77,9	16,3	100,0	0,5	15,5	73,6	10,4	100,0	93,9	1,7	4,4	100,0	10,1	60,3	29,5	100,0	60,8	572	
<b>Niveau d'instruction</b>																				
Aucun	12,2	66,3	21,2	100,0	0,3	7,7	86,3	5,7	100,0	93,1	2,0	4,9	100,0	9,3	56,9	32,9	100,0	46,0	1 847	
Primaire	9,8	78,5	11,7	100,0	0,0	10,1	86,6	3,3	100,0	92,8	3,7	3,3	100,0	5,0	75,7	19,1	100,0	59,2	368	
Secondaire ou plus	3,3	93,7	2,0	100,0	1,0	22,5	76,0	0,4	100,0	93,1	5,3	0,6	100,0	0,8	96,7	1,7	100,0	59,9	327	
Ensemble des hommes	10,7	71,6	17,3	100,0	0,4	10,0	85,0	4,6	100,0	93,0	2,6	4,1	100,0	7,6	64,7	26,9	100,0	49,7	2 542	

Cependant, la grande majorité des femmes (82 %) pensent que le sida est une maladie presque toujours mortelle; 7 % pensent qu'elle l'est parfois. Il est intéressant de noter ici, qu'il n'y a presque pas de variation selon les variables socio-démographiques. De même, 86 % d'entre elles ont déclaré que le sida ne se guérit pas; moins de 3 % pensent qu'il peut être soigné et 11 % n'en savent rien. Du point de vue des possibilités de guérison, on ne constate des écarts notables que selon la résidence et le niveau d'instruction : les femmes du milieu urbain (94 %, contre 84 % en milieu rural), celles de Ouagadougou (92 %) et celles qui ont, au moins, un niveau d'instruction secondaire (96 %) ont plus fréquemment déclaré que le sida ne pouvait être guéri.

Plus de la moitié des femmes (55 %) ont déclaré connaître la transmission mère/enfant, 12 % ont déclaré que cela était impossible, mais un tiers d'entre elles (33 %) n'en ont aucune idée. Le niveau d'instruction et le milieu de résidence font apparaître des écarts importants dans la connaissance de ce mode de transmission. Ce sont les femmes ayant un niveau d'instruction secondaire ou plus (96 %), celles vivant à Ouagadougou (89 %) et en milieu urbain en général (87 %) qui ont le plus fréquemment déclaré connaître l'existence de ce mode de transmission. Enfin, près de quatre femmes sur dix (39 %) ont déclaré connaître ou avoir connu personnellement quelqu'un ayant eu le sida ou qui en est décédé. Cette réponse a été plus fréquente en milieu urbain (55 %, contre 35 % en milieu rural), à Ouagadougou (54 %) et parmi les femmes les plus instruites (57 %).

Les hommes ont été proportionnellement plus nombreux que les femmes à déclarer qu'une personne apparemment en bonne santé pouvait être porteuse du VIH (72 % contre 49 % des femmes). Les adolescents de 15-19 ans, les hommes de 50-59 ans, les célibataires, ceux vivant en milieu rural et ceux n'ayant pas d'instruction ont moins fréquemment déclaré qu'une personne en bonne santé pouvait, en fait, être atteinte du sida. On note aussi que 85 % des hommes pensent que le sida est presque toujours mortel et 93 % pensent qu'il est incurable. Environ deux hommes sur trois (65 % des hommes contre 55 % des femmes) ont déclaré connaître la transmission du sida de la mère à l'enfant. La connaissance de ce mode de transmission est plus répandue chez les hommes ayant un niveau secondaire ou plus (97 %, contre 57 % chez les non instruits) et ceux résidant à Ouagadougou (91 %) ou, en général, en milieu urbain (89 %). Par ailleurs, les hommes ayant déclaré connaître ou avoir connu quelqu'un atteint ou décédé du sida (50 %) sont, proportionnellement, plus nombreux que les femmes (39 %).

Enfin, par rapport à 1993 (EDSBF-I), le pourcentage d'enquêtés ayant déclaré qu'une personne apparemment en bonne santé pouvait être porteuse du VIH, a sensiblement augmenté, mais davantage chez les hommes (54 % en 1993, contre 72 % en 1998-99) que chez les femmes (38 % en 1993 contre 49 % en 1998-99). Par contre, le pourcentage d'enquêtés ayant déclaré savoir que la transmission du VIH de la mère à l'enfant était possible a progressé à peu près au même rythme chez les deux sexes : de 46 % en 1993, cette proportion est passée à 55 % en 1998-99 chez les femmes; chez les hommes, 56 % avaient déclaré connaître ce moyen de transmission en 1993; cette proportion est de 65 % en 1998-99.

### **12.3.3 Perception du risque de contracter le sida**

Dans l'ensemble, la perception des hommes du risque de contracter le sida est assez différente de celle des femmes. Ainsi, 36 % des femmes et 22 % des hommes connaissant le sida estiment qu'ils ne courent aucun risque de contracter cette maladie. Par ailleurs, 45 % des femmes et 57 % des hommes pensent que leurs risques sont minimes; respectivement, 9 % et 7 % ont déclaré que leurs risques étaient importants (tableau 12.10 et graphique 12.2).

Tableau 12.10 Perception du risque de contracter le sida

Répartition (en %) des femmes et des hommes connaissant le sida par perception du risque de contracter le sida, par caractéristiques socio-démographiques, EDSBF-II Burkina Faso 1998-99

Caractéristique	Femmes					Effectif de femmes	Hommes					Effectif d'hommes
	Risques de contracter le sida				Total <sup>1</sup>		Risques de contracter le sida				Total <sup>1</sup>	
	Aucun	Minime	Modéré	Important			Aucun	Minime	Modéré	Important		
<b>Groupe d'âges</b>												
15-19	44,3	37,6	6,9	7,7	100,0	1 156	35,8	53,0	6,4	4,4	100,0	546
20-24	32,6	45,6	9,9	10,1	100,0	1 035	23,3	57,5	11,5	7,6	100,0	381
25-29	33,7	45,9	9,6	9,9	100,0	956	13,8	60,7	16,5	9,0	100,0	368
30-39	32,0	47,2	8,4	10,1	100,0	1 519	13,0	57,3	17,3	12,3	100,0	546
40-49	37,8	46,9	4,4	8,3	100,0	953	18,1	59,4	17,4	5,2	100,0	423
50-59	-	-	-	-	-	-	27,4	55,3	12,8	4,4	100,0	278
<b>État matrimonial</b>												
Actuel. en union	34,5	46,5	7,8	9,1	100,0	4 586	17,4	58,3	16,1	8,2	100,0	1 478
Union rompue	38,0	34,5	7,8	18,3	100,0	152	17,4	55,4	16,8	10,4	100,0	49
Jamais en union	42,7	36,7	8,6	8,8	100,0	882	28,8	55,3	9,6	6,0	100,0	1 015
<b>Nombre de partenaires dans les 12 derniers mois</b>												
0	36,6	44,5	7,7	8,9	100,0	5 297	23,7	57,5	12,4	6,3	100,0	1 995
1	23,0	50,0	9,9	15,9	100,0	262	15,5	54,9	18,3	11,3	100,0	294
2-3	24,7	31,4	23,1	16,8	100,0	49	15,7	54,4	18,4	11,5	100,0	187
4 +	*	*	*	*	*	2	17,6	58,2	10,6	13,5	100,0	59
<b>Milieu de résidence</b>												
Urbain	28,1	42,2	13,6	15,1	100,0	1 071	21,0	56,2	11,5	11,1	100,0	579
Rural	37,7	45,2	6,6	7,9	100,0	4 547	22,3	57,3	14,1	6,3	100,0	1 963
<b>Région</b>												
Ville de Ouagadougou	22,4	39,3	19,2	17,6	100,0	537	17,3	49,7	15,3	17,7	100,0	293
Nord	33,8	40,6	14,2	5,7	100,0	759	7,0	71,2	11,9	9,6	100,0	367
Est	37,1	55,0	3,8	2,1	100,0	1 454	30,9	41,0	18,8	9,2	100,0	683
Ouest	38,9	44,2	3,6	12,7	100,0	1 348	30,1	60,9	4,4	4,5	100,0	627
Centre/Sud	38,0	39,1	8,5	11,9	100,0	1 520	14,4	66,6	17,2	1,7	100,0	572
<b>Niveau d'instruction</b>												
Aucun	37,5	45,0	6,8	8,0	100,0	4 731	22,0	57,2	14,0	6,7	100,0	1 847
Primaire	29,0	45,9	12,1	12,7	100,0	515	20,5	58,5	12,7	8,1	100,0	368
Secondaire ou plus	24,6	38,1	16,2	21,0	100,0	373	23,7	54,5	11,4	10,4	100,0	327
Ensemble <sup>2</sup>	35,9	44,7	7,9	9,3	100,0	5 619	22,0	57,0	13,5	7,4	100,0	2 542


<sup>1</sup> Y compris les "non-déterminés" et 2,2 % de femmes et 0,1 % d'hommes ayant déclaré avoir le sida

<sup>2</sup> Y compris les "non-déterminés"

\* Basé sur trop peu de cas

Parmi les femmes, ce sont les plus jeunes (44 % des 15-19 ans) et les plus âgées (38 % des 40-49 ans), les célibataires (43%) qui ont le plus fréquemment déclaré qu'elles ne couraient aucun risque de contracter le sida. Par ailleurs, les femmes rurales (38 %, contre 28 % en milieu urbain) et les non instruites sont, proportionnellement, les plus nombreuses à se considérer à l'abri de ce risque. À l'opposé, la proportion la plus élevée de femmes considérant qu'elles courent des risques importants concerne les femmes en union rompue (18 %), les femmes urbaines (15 %, contre 8 % en milieu rural), les femmes résidant à Ouagadougou (18 %) dans les régions, de l'Ouest (13 %) et du Centre/Sud (12 %, contre moins de 6 % dans les deux autres régions), ainsi que les femmes de niveau d'instruction secondaire ou plus (21 %, contre 8 % des sans instruction).

Graphique 12.2  
Perception du risque de contracter le sida par les femmes et les hommes connaissant le sida



Le nombre de partenaires influe également sur cette perception du risque de contracter le sida. Ainsi, les femmes qui n'ont pas d'autre partenaire sexuel que leur mari sont, proportionnellement, les plus nombreuses à considérer ne courir aucun risque (37 %) et les moins nombreuses à penser courir un risque important (9 %).

Chez les hommes, on constate également des variations dans la perception du risque de contracter la maladie. Ainsi, comme chez les femmes, les plus jeunes et les plus âgés sont ceux qui ont le plus fréquemment déclaré qu'ils pensaient être à l'abri de la maladie. Du point de vue de l'état matrimonial, les célibataires (29 %) sont, proportionnellement, plus nombreux que les mariés, divorcés et veufs à considérer qu'ils ne courent aucun risque (17 %). Les proportions d'hommes qui considèrent ne courir aucun risque ne varient pas selon le milieu de résidence, ni, non plus, selon le niveau d'instruction. Il faut cependant remarquer que, comparativement aux autres régions, cette proportion est particulièrement faible dans la région Nord (7 % contre environ 30 % à l'Ouest et à l'Est). Pour ce qui est de la perception du risque important, comme chez les femmes, ce sont les hommes du milieu urbain (11 %, contre 6 % en rural), ceux de Ouagadougou (18 %, contre moins de 10 % dans les autres régions) et ceux ayant un niveau secondaire ou plus (10 % contre 8 % ou moins) qui estiment plus fréquemment qu'ils courent un risque important. De même, les hommes ayant des partenaires sexuelles autres que leurs épouses, ont déclaré plus fréquemment que les autres, courir des risques importants.

Dans près de deux couples sur cinq (37 %), les deux conjoints ont la même perception du risque qu'ils courent de contracter le sida : dans 7 % des cas, l'homme et la femme pensent ne courir aucun risque; dans 27 % des cas, ils pensent courir des risques minimes et dans moins de 3 % des cas, ils pensent courir des risques modérés ou importants (tableau 12.11). Dans les cas où la perception de la femme et celle de l'homme divergent, on note que lorsque l'homme pense ne courir aucun risque, dans 8 % des couples, la femme pense courir des risques minimes et, dans moins de 2 % des cas, elle pense même courir des risques modérés ou importants. À l'opposé, lorsque la femme pense ne courir aucun risque, dans 19 % des couples, l'homme considère courir des risques faibles et, dans 10 % des cas, il considère courir des risques modérés ou importants.

**Tableau 12.11 Perception du risque de contracter le sida par les couples**

Répartition (en %) des couples qui ont entendu parler du sida par la perception de l'homme et de la femme du risque de contracter le sida, EDSBF-II Burkina Faso 1998-99

	Risques de contracter le sida selon l'homme				Ensemble <sup>1</sup>	Nombre de couples dans lesquels les 2 conjoints connaissent le sida <sup>1</sup>
	Aucun	Minime	Modéré	Important		
<b>Risques de contracter le sida selon la femme</b>						
Aucun	7,2	18,7	6,7	3,1	35,6	544
Minime	7,9	27,1	7,1	3,1	45,3	691
Modéré	0,8	5,1	1,7	0,6	8,2	125
Important	0,6	6,1	1,6	0,7	9,0	138
Ensemble <sup>1</sup>	16,7	58,3	17,3	7,6	100,0	-
Nombre de couples dans lesquels les 2 conjoints connaissent le sida <sup>1</sup>	255	890	264	117	-	1 527

<sup>1</sup> Y compris les "non-déterminés" et 1 femme et 1 homme ayant déclaré avoir le sida

#### 12.3.4 Raisons de la perception des risques

Les enquêtés qui pensent qu'ils ne courent aucun risque, ou qu'ils courent seulement un risque minime de contracter le sida, n'ont pas souvent réussi à donner des raisons spécifiques à cette appréciation de leur niveau de risque : 78 % des femmes et 63 % des hommes ont fourni des arguments autres que ceux communément considérés comme valables (tableau 12.12). Cela a été le cas surtout chez les femmes en union (86 %). Deux raisons spécifiques essentielles ont été avancées par les femmes pour expliquer le fait qu'elles considèrent courir seulement des risques faibles ou pas de risques du tout : un seul partenaire ou limiter le nombre de partenaires (28 %) et l'abstinence sexuelle (12 %). Seulement 3 % d'entre elles ont mentionné l'utilisation du condom : parmi les célibataires et les femmes en rupture d'union, respectivement 12 % et 5 % ont cité le condom. La fidélité au(x) partenaire(s) a été citée par 32 % des femmes en union alors que pour 60 % des célibataires et 44 % des femmes divorcées et veuves, c'est l'abstinence sexuelle qui a été citée comme principale raison. Le fait que le conjoint n'ait pas d'autres partenaires sexuelles explique la perception du risque faible pour 1 % des femmes. Aucune femme n'a avancé des raisons telles que "éviter les transfusions et les injections" ou "éviter les rapports homosexuels".

Concernant les hommes, on constate, comme pour les femmes, que la principale raison citée pour justifier leur perception de faible risque de contracter le sida est le nombre limité de partenaires (31 %). Les hommes en union ont été proportionnellement les plus nombreux à donner cette réponse (40 %, contre 19 % parmi les célibataires). Dans 25 % des cas, s'abstenir de rapports sexuels a été cité comme raison. Comme on pouvait s'y attendre, ce sont surtout les célibataires (54 %), les veufs et les divorcés (31 %) qui ont avancé ce type de raison. Seulement, 16 % des hommes ont mentionné le condom, ce qui est largement plus élevé que les 3 % observés chez les femmes. Ici également, ce sont les célibataires (23 %) et les divorcés et veufs (17 %) qui l'ont le plus fréquemment cité. Il faut noter par ailleurs, qu'un pourcentage non négligeable d'hommes mariés (10 %) justifie sa perception de risque faible ou nul par l'utilisation du condom.

**Tableau 12.12 Raisons pour lesquelles les risques de contracter le sida sont perçus comme nuls/minimes**

Parmi les femmes et les hommes qui pensent ne courir aucun risque ou courir des risques minimes de contracter le sida, raisons de la perception de ces risques, selon l'état matrimonial, EDSBF-II Burkina Faso 1998-99

	S'abstient de rapports sexuels	Utilise le condom	Un seul/ nombre limité de partenaires	(Conjoint) n'a pas autre partenaire	Évite les prostituées	Pas de transfusion	Pas d'injections	Autres	Effectif
<b>Femmes</b>									
Célibataire	60,0	11,5	13,3	0,2	0,0	0,8	0,4	36,0	700
Actuel. en union	1,8	1,4	31,6	1,7	0,0	0,6	0,2	86,2	3 717
Union rompue	44,0	4,6	11,5	1,6	0,0	0,0	1,0	56,8	110
Ensemble des femmes	11,8	3,0	28,3	1,4	0,0	0,6	0,2	77,7	4 527
<b>Hommes</b>									
Célibataire	54,4	23,4	18,2	0,0	3,6	0,8	0,4	33,3	854
Actuel. en union	1,9	9,9	40,2	1,6	3,2	0,9	0,5	85,6	1 119
Union rompue	31,2	17,1	18,8	0,0	0,0	0,0	3,7	67,5	35
Ensemble des hommes	24,7	15,8	30,5	0,9	3,3	0,8	0,5	63,0	2 008

Les autres raisons concernant la fréquentation des prostituées (3 %), les autres partenaires sexuels du conjoint (1 %), le recours aux transfusions (moins de 1 %) et aux injections (moins de 1 %) n'ont été que marginalement mentionnées.

Le tableau 12.13 présente les pourcentages de femmes et d'hommes qui estiment courir des risques modérés/importants selon les raisons de cette perception. Pour les femmes, le fait que le conjoint ait d'autres partenaires (44 %) est la raison principale pour laquelle elles pensent courir des risques modérés/importants de contracter le sida. Cette raison a été surtout évoquée par les femmes en union (51 %).

La deuxième raison citée par les femmes est la non utilisation du condom (20 %); elle concerne surtout les femmes en union (21%). On relève que 7 % de l'ensemble des femmes justifient leur perception du risque par la multiplicité de leurs partenaires sexuels. La fréquence de cette réponse est très variable selon la situation matrimoniale : 6 % chez les femmes en union et 14 % chez les célibataires. Les transfusions (moins de 7 %) et les injections (moins de 5 %) ont été rarement évoquées.

Parmi les hommes, la multiplicité des partenaires (38 %) constitue la raison principale pour laquelle ils pensent courir des risques modérés/importants de contracter le sida; pour 14 % d'entre eux, c'est la non utilisation du condom qui explique leur perception. Le fait que la conjointe ait d'autres partenaires a été évoqué par 8 % des hommes. Ici également, les transfusions (moins de 10 %) et les injections (moins de 4 %) ont été les raisons les moins fréquemment citées.

**Tableau 12.13 Raisons pour lesquelles les risques de contracter le sida sont perçus comme modérés/importants**

Parmi les femmes et les hommes qui pensent avoir des risques modérés/importants de contracter le sida, raisons de la perception de ces risques, selon l'état matrimonial, EDSBF-II Burkina Faso 1998-99

	N'utilise pas le condom	Plus d'un/ nombreux partenaires sexuels	Conjoint a d'autres partenaires	Fréquente les prostituées	A des transfusions	A des injections	Autres	Effectif
<b>Femmes</b>								
Jamais en union	16,5	14,1	14,4	0,0	14,7	8,5	70,9	153
Actuel. en union	21,1	5,5	50,6	0,0	5,6	4,4	42,4	772
Union rompue	6,6	14,2	21,2	0,0	1,4	0,0	74,5	40
Ensemble des femmes	19,7	7,2	43,7	0,0	6,9	4,9	48,2	965
<b>Hommes</b>								
Jamais en union	10,3	29,3	6,2	0,7	10,2	5,8	66,7	158
Actuel. en union	15,2	41,6	8,5	0,5	9,3	3,6	59,2	359
Union rompue	*	*	*	*	*	*	*	13
Ensemble des hommes	14,0	37,8	8,1	0,6	9,5	4,3	60,8	530

\* Basé sur trop peu de cas

### 12.3.5 Changement de comportement pour éviter de contracter le sida

Malgré les risques que peuvent faire courir certains comportements, 47 % des femmes ont déclaré n'avoir rien changé à leur comportement sexuel depuis qu'elles ont entendu parler du sida (tableau 12.14.1). Cette proportion est, en outre, relativement élevée parmi les femmes en union (51 %), en milieu rural (51 %) et chez les non instruites (50 %).

Les changements de comportement sexuel consistent essentiellement en la limitation à un seul partenaire (34 %); les femmes en union ont été de loin, proportionnellement, les plus nombreuses à avoir déclaré ce changement. Plus de 10 % se sont contentées de demander à leur conjoint d'être fidèle. C'est dans les régions de Ouagadougou et du Centre/Sud que ce pourcentage est le plus élevé (respectivement 14 % et 18 % contre 7 % ou moins dans les autres régions). Moins de 4 % ont déclaré avoir utilisé le condom. Cette option a été surtout le fait des adolescentes de moins de 20 ans (6 %), des urbaines (12 %, contre 2 % en milieu rural), des résidentes de Ouagadougou (14 %, contre 3 % ou moins ailleurs) et des femmes de niveau secondaire ou plus (22 %, contre moins de 2 % des sans instruction). Celles qui ont décidé de s'abstenir de rapports sexuels (1 % dans l'ensemble) sont, proportionnellement, plus nombreuses chez les femmes divorcées ou veuves (17 %); ce type de changement de comportement est aussi un peu plus fréquent en milieu urbain (2 % contre 1 % en milieu rural), à Ouagadougou (3 %, contre 1,5 % ou moins ailleurs) et chez les femmes de niveau secondaire ou plus (2 %).

Le changement de comportement, après avoir entendu parler du sida, a été de manière générale plus fréquent chez les hommes que chez les femmes. Ainsi, alors que près de la moitié des femmes n'ont rien modifié, 78 % des hommes ont déclaré avoir changé de comportement pour éviter de contracter le sida (tableau 12.14.2). Pour les hommes, modifier son comportement a consisté, par ordre d'importance, en la limitation à une seule partenaire (29 %), à l'utilisation du condom (19 %) et en la réduction du nombre de partenaires sexuelles (19 %).

Tableau 12.14.1 Comportement des femmes pour éviter de contracter le sida

Pourcentage de femmes par changement de comportement pour éviter de contracter le sida selon certaines caractéristiques socio-démographiques, EDSBF-II Burkina Faso 1998-99

Caractéristique	Pas de changement de comportement sexuel	Changement du comportement sexuel										Effectif		
		N'a pas commencé les rapports sexuels	A arrêté les rapports sexuels	A commencé à utiliser le condom	A limité rapports à 1 seul partenaire	A limité le nombre de partenaires	A demandé au partenaire d'être fidèle	Autres changements sexuels	Autres changements sexuels	Autres changements non sexuels	Autres changements sexuels			
<b>Groupe d'âges</b>														
15-19	38,4	30,3	0,9	6,1	19,9	1,1	4,9	0,5	52,2	1 156				
20-24	44,3	2,5	0,8	5,9	39,4	1,6	12,5	0,1	53,1	1 035				
25-29	45,8	0,4	0,4	2,4	42,1	2,0	12,7	0,3	52,2	956				
30-39	50,6	0,1	0,5	1,9	38,1	1,0	11,8	0,3	57,7	1 519				
40-49	55,8	0,6	3,2	1,0	31,3	0,9	9,9	0,1	60,4	953				
<b>État matrimonial</b>														
Actuel, en union	50,5	0,2	0,4	1,6	38,5	1,1	11,9	0,2	56,6	4 586				
Union rompue	47,0	1,5	16,8	9,1	21,6	3,6	3,4	0,0	57,3	152				
Jamais en union	29,0	42,4	1,5	12,0	13,3	2,1	3,3	0,6	47,8	882				
<b>Milieu de résidence</b>														
Urbain	30,1	13,8	2,0	11,6	35,9	2,6	11,7	0,6	48,7	1 071				
Rural	51,0	5,2	0,8	1,5	33,7	1,0	10,0	0,2	56,8	4 547				
<b>Région</b>														
Ville de Ouagadougou	31,1	12,0	2,9	13,7	30,7	3,2	14,1	1,2	57,0	537				
Nord	61,1	4,7	0,5	2,9	22,6	1,8	7,2	0,7	70,5	759				
Est	56,1	5,6	0,7	1,3	31,5	0,6	5,8	0,2	60,6	1 454				
Ouest	48,2	7,2	0,5	2,3	37,0	1,0	6,8	0,1	55,1	1 348				
Centre/Sud	35,8	7,1	1,5	3,1	41,0	1,2	18,1	0,0	42,0	1 520				
<b>Niveau d'instruction</b>														
Aucun	50,4	5,1	1,0	1,5	33,8	1,0	10,3	0,2	56,6	4 731				
Primaire	35,0	14,1	1,3	7,9	36,5	2,2	10,4	0,9	48,8	515				
Secondaire ou plus	20,3	19,8	1,9	21,6	35,0	3,9	11,2	0,5	47,3	373				
Ensemble des femmes <sup>1</sup>	47,0	6,9	1,1	3,4	34,1	1,3	10,3	0,3	55,3	5 619				

<sup>1</sup> Y compris les "non-déterminés"

Tableau 12.14.2. Comportement des hommes pour éviter de contracter le sida

Pourcentage d'hommes par changement de comportement pour éviter de contracter le sida selon certaines caractéristiques socio-démographiques, EDSBF-II Burkina Faso 1998-99

Caractéristique	Pas de changement de comportement sexuel	Changement du comportement sexuel										Effectif	
		N'a pas commencé les rapports sexuels	A arrêté les rapports sexuels	A commencé à utiliser le condom	A limité à 1 seul partenaire	A limité le nombre de partenaires	A demandé au partenaire d'être fidèle	Évite les prostituées	Autres changements sexuels	Autres changements sexuels non			
<b>Groupe d'âges</b>													
15-19	19,5	53,3	1,2	13,0	8,2	6,0	2,5	2,1	0,1	39,6	546		
20-24	13,8	21,9	2,3	30,9	25,7	17,1	6,8	5,6	0,2	34,9	381		
25-29	12,2	7,2	1,2	33,9	40,4	18,4	12,7	5,2	0,0	31,9	368		
30-39	21,3	1,0	0,4	21,8	40,0	26,0	20,7	7,1	0,1	41,1	546		
40-49	26,5	0,0	0,3	10,4	36,9	27,0	25,4	4,9	0,7	47,1	423		
50-59	45,3	0,0	0,4	4,9	22,9	24,8	17,4	1,9	0,2	56,2	278		
<b>État matrimonial</b>													
Actuel, en union	25,9	0,2	0,0	15,1	39,5	24,0	21,4	5,1	0,3	44,1	1 478		
Union rompue	24,8	2,4	6,2	30,1	23,0	28,7	0,0	11,5	1,3	48,3	49		
Jamais en union	16,0	39,7	2,1	24,9	13,2	12,0	3,8	3,6	0,1	36,5	1 015		
<b>Milieu de résidence</b>													
Urbain	12,2	17,6	2,7	38,0	32,6	16,5	5,4	5,0	0,8	51,0	579		
Rural	24,8	15,5	0,5	13,7	27,6	20,1	16,5	4,5	0,1	38,3	1 963		
<b>Région</b>													
Ville de Ouagadougou	10,0	14,6	3,1	42,1	36,8	16,4	6,7	6,9	1,3	43,7	293		
Nord	24,4	18,6	0,5	17,6	20,6	25,3	6,7	1,8	0,0	38,3	367		
Est	32,9	14,7	1,3	12,9	27,0	13,3	10,4	4,4	0,1	41,7	683		
Ouest	19,4	15,5	0,6	17,2	30,8	21,4	13,7	5,4	0,0	52,0	627		
Centre/Sud	16,3	17,0	0,1	18,6	29,5	21,8	26,9	4,5	0,2	29,1	572		
<b>Niveau d'instruction</b>													
Aucun	25,3	13,6	0,6	13,6	28,2	20,6	16,3	4,7	0,2	40,0	1 847		
Primaire	14,7	22,3	1,1	25,8	30,6	18,6	11,0	4,7	0,0	37,8	368		
Secondaire ou plus	11,4	22,2	2,7	43,9	29,2	12,8	3,9	3,5	0,8	51,7	327		
Ensemble des hommes <sup>1</sup>	22,0	16,0	1,0	19,3	28,7	19,3	14,0	4,6	0,2	41,2	2 542		

<sup>1</sup> Y compris les "non-déterminés"

Comme pour les femmes, le pourcentage d'hommes n'ayant pas changé de comportement sexuel est plus élevé parmi ceux qui sont en union ou qui l'étaient (respectivement, 26 % et 25 % contre 16 % chez les célibataires), ceux qui vivent en milieu rural (25 % contre 12 % en urbain) et parmi ceux sans instruction (25 % contre 11 % chez ceux de niveau, au moins, secondaire).

En ce qui concerne l'âge, on constate que la tendance à modifier son comportement pour limiter les risques de contracter le sida diminue au fur et à mesure que l'âge augmente : en effet, à 25-29 ans, seulement 12 % des hommes ont déclaré n'avoir pas changé de comportement, contre 21 % à 30-39 ans et 45 % à 50-59 ans. Le fort pourcentage d'adolescents de 15-19 ans (20 %) n'ayant pas changé de comportement s'explique probablement, en partie, par leur activité sexuelle très limitée.

L'utilisation du condom a été surtout le fait des jeunes (20-29 ans : plus de 30 %), des célibataires (25 %) et des veuves et divorcées (30 %), des urbains (38 %, contre 14 % en milieu rural) et des hommes de niveau secondaire ou plus (44 %, contre 14 % chez les non instruits). Le pourcentage d'hommes ayant mentionné la restriction du nombre de partenaires à un seul, ne varie pratiquement pas selon le niveau d'instruction (entre 28 et 31 %). Il est, par contre, plus élevé chez les hommes du milieu urbain (33 %, contre 28 % en milieu rural) et chez les hommes en union (40 % contre 13 % chez les célibataires). Enfin, 14 % des hommes ont demandé à leur(s) conjointe(s) d'être fidèle(s). Il s'agit là essentiellement des hommes en union (21 % contre moins de 4 % des célibataires), des hommes du milieu rural (17 %, contre 5 % en milieu urbain) et des non instruits (16 %, contre 4 % des hommes de niveau secondaire ou plus).

## **12.4 CONNAISSANCE ET UTILISATION DU CONDOM**

Le condom demeure un des moyens les plus efficaces de protection contre le sida. Il est donc important de savoir dans quelle mesure les hommes et les femmes connaissent et utilisent ce moyen de protection. À la différence du Chapitre 4 (Planification familiale) traitant du condom en tant que méthode contraceptive, il s'agit ici d'évaluer la connaissance et l'utilisation du condom en tant que moyen contraceptif et en tant que moyen de protection contre les maladies sexuellement transmissibles. Les niveaux de connaissance et d'utilisation présentés ici diffèrent donc de ceux donnés précédemment.

### **12.4.1 Connaissance du condom**

Le tableau 12.15 montre que parmi les femmes qui connaissent le sida et qui ont déjà eu des rapports sexuels, 79 % connaissent le condom en tant que moyen de protection contre les MST/sida ou comme méthode contraceptive. Ce niveau de connaissance diminue avec l'âge (de 82 % à 15-19 ans, il passe à 70 % à 40-49 ans); il est plus élevé parmi les femmes célibataires (94 % contre 78 % chez celles actuellement en union). Le niveau de connaissance est, en outre, positivement corrélé avec l'urbanisation et le niveau d'instruction. Les femmes urbaines (98 %, contre 75 % en milieu rural), les résidentes de la région de Ouagadougou (99 %) et les femmes instruites (plus de 95 %) connaissent, en grande majorité, le condom. La région Est avec moins de 70 % se caractérise par la proportion la plus faible.

Bien que la proportion d'hommes connaissant le condom soit nettement supérieure à celle des femmes (95 % contre 79 %), les variations selon les caractéristiques socio-démographiques sont assez similaires pour les deux sexes. Ainsi les hommes les plus jeunes, les célibataires, les hommes vivant dans les villes et ceux ayant fréquenté l'école connaissent presque tous le condom comme contraceptif ou comme moyen de protection contre les MST.

**Tableau 12.15 Connaissance du condom**

Pourcentage de femmes et d'hommes qui connaissent le condom selon certaines caractéristiques, EDSBF-II Burkina Faso 1998-99

Caractéristique	Femmes qui connaissent le condom	Effectif de femmes <sup>1</sup>	Hommes qui connaissent le condom	Effectif d'hommes <sup>1</sup>
<b>Groupe d'âges</b>				
15-19	82,2	604	98,1	168
20-24	82,3	1 001	98,7	278
25-29	81,5	953	97,6	341
30-39	78,7	1 519	98,0	541
40-49	70,1	952	94,3	422
50-59	-	-	83,9	276
<b>État matrimonial actuel</b>				
En union	77,7	4 586	94,2	1 478
En rupture d'union	82,8	152	97,6	49
Jamais en union	93,5	292	98,4	499
<b>Milieu de résidence</b>				
Urbain	98,0	860	99,7	458
Rural	74,8	4 169	94,1	1 568
<b>Région</b>				
Ville de Ouagadougou	99,2	435	99,5	244
Nord	76,4	689	94,9	274
Est	69,0	1 317	89,4	544
Ouest	79,3	1 213	97,7	505
Centre/Sud	82,3	1 375	97,9	459
<b>Niveau d'instruction</b>				
Aucun	76,0	4 357	94,2	1 520
Primaire	95,1	401	97,8	273
Secondaire ou plus	99,6	271	100,0	233
Ensemble	78,8	5 029	95,3	2 026

<sup>1</sup> Femmes et hommes qui connaissent le sida et qui ont déjà eu des rapports sexuels.

#### 12.4.2 Utilisation du condom

Parmi les femmes qui connaissent le sida et qui ont eu des rapports sexuels au cours des douze derniers mois, 12 % ont déclaré avoir utilisé un condom à un moment quelconque (tableau 12.16); un pourcentage à peu près égal de femmes a utilisé le condom en tant que moyen de protection contre les MST (10 %) ou en tant que contraceptif (10 %).

Le niveau d'utilisation du condom varie selon l'état matrimonial : très faible chez les femmes en union (8 %), il est de 42 % chez les divorcées/veuves et de 64 % chez les femmes célibataires. Les femmes urbaines (36 %, contre 7 % en milieu rural), celles vivant à Ouagadougou (45 %) et celles de niveau secondaire ou plus (67 %) sont celles qui ont utilisé le plus fréquemment un condom, en tant que contraceptif ou en tant que moyen de protection contre les MST/sida.

Le tableau 12.16 montre que très peu de femmes (moins de 3 %) ont déclaré avoir utilisé un condom au cours de leur dernier rapport sexuel avec le conjoint. Avec une personne différente du conjoint, cette proportion est, par contre, relativement très élevée (42 %). Du point de vue des caractéristiques socio-démographiques, on peut noter que lors des derniers rapports sexuels avec un partenaire autre que le conjoint,

Tableau 12.16 Utilisation du condom par les femmes

Parmi les femmes qui connaissent le sida et qui ont eu des rapports sexuels au cours des 12 derniers mois, pourcentage de celles qui ont déjà utilisé le condom selon la raison de l'utilisation, pourcentage de celles qui l'ont utilisé au cours des derniers rapports avec leur conjoint, pourcentage de celles qui l'ont utilisé au cours des derniers rapports avec quelqu'un d'autre que leur conjoint et pourcentage de celles qui l'ont utilisé au cours des derniers rapports quel que soit le partenaire, selon certaines caractéristiques socio-démographiques, EDSBF-II Burkina Faso 1998-99

Caractéristique	Pourcentage de femmes qui ont déjà utilisé le condom			Effectif <sup>1</sup>	Utilisation du condom lors des derniers rapports sexuels avec:					
	Comme contraceptif	Pour éviter le MST/sida	L'une ou l'autre raison		Conjoint		Quelqu'un d'autre que le conjoint		N'importe quel type de partenaire	
					%	Effectif <sup>2</sup>	%	Effectif <sup>3</sup>	%	Effectif <sup>1</sup>
<b>Groupes d'âges</b>										
15-19	20,1	21,4	23,4	541	2,4	367	41,5	185	15,8	541
20-24	15,0	14,5	18,4	790	3,8	725	52,2	69	8,1	790
25-29	10,8	8,7	12,9	744	3,8	724	39,5	25	5,1	744
30-39	6,5	5,1	7,8	1 171	2,1	1 151	32,9	28	2,8	1 171
40-49	2,1	2,4	2,9	663	0,9	652	*	13	1,5	663
<b>État matrimonial</b>										
Actuelle. en union	6,8	5,7	8,4	3 621	2,6	3 619	33,4	33	2,9	3 621
En rupture d'union	33,8	41,5	41,5	39	-	0	27,5	39	27,5	39
Jamais en union	56,2	60,1	63,7	249	-	0	45,9	249	45,9	249
<b>Milieu de résidence</b>										
Urbain	29,6	29,8	36,3	727	7,0	579	56,3	155	17,6	727
Rural	5,7	4,9	6,7	3 182	1,8	3 040	29,4	166	3,2	3 182
<b>Région</b>										
Ville de										
Ouagadougou	37,9	36,0	45,2	356	10,4	278	64,8	80	22,7	356
Nord	6,8	6,9	9,0	583	2,6	552	28,7	38	4,4	583
Est	5,1	4,1	5,9	942	1,1	902	35,6	48	2,9	942
Ouest	6,3	5,8	8,3	1 028	1,6	959	21,8	73	3,1	1 028
Centre/Sud	11,0	10,4	12,4	1 000	2,8	930	49,0	83	6,5	1 000
<b>Niveau d'instruction</b>										
Aucun	5,7	4,7	6,8	3 344	1,9	3 201	28,4	165	3,2	3 344
Primaire	20,5	24,3	27,6	324	4,3	270	50,9	62	13,2	324
Secondaire ou plus	58,7	56,3	67,0	241	15,1	149	61,2	95	33,3	241
Effectif des femmes <sup>4</sup>	10,2	9,5	12,2	3 909	2,6	3 619	42,4	321	5,9	3 909

<sup>1</sup> Effectif de femmes qui connaissent le sida et qui ont eu des rapports sexuels au cours des 12 derniers mois.

<sup>2</sup> Effectif de femmes qui connaissent le sida et qui ont eu des rapports sexuels au cours des 12 derniers mois avec leur conjoint.

<sup>3</sup> Effectif de femmes qui connaissent le sida et qui ont eu des rapports sexuels au cours des 12 derniers mois avec quelqu'un d'autre que le conjoint (y compris les femmes non en union).

<sup>4</sup> Y compris les "non-déterminés"

\* Basé sur trop peu de cas

les femmes plus jeunes, les célibataires, les urbaines et les instruites ont plus fréquemment utilisé le condom que les autres.

Chez les hommes qui connaissent le sida et qui ont eu des rapports sexuels au cours des 12 derniers mois, 40 % ont déclaré avoir déjà utilisé le condom à un moment quelconque (tableau 12.17) : 37 % l'ont utilisé comme contraceptif et un pourcentage égal en tant que protection contre les MST/sida. La proportion d'hommes ayant utilisé le condom est donc trois fois plus importante que celle des femmes (37 %, contre 12 %) (graphique 12.3). Les hommes les plus jeunes, en particulier ceux de 20-24 ans, ont plus tendance que les plus âgées à utiliser un condom, quel qu'en soit le but (63 % à 20-24 ans contre 21 % ou moins à partir de 40 ans). Près de 70 % des célibataires et 62 % de ceux dont l'union est rompue ont utilisé le condom pour

Tableau 12.17 Utilisation du condom par les hommes

Parmi les hommes qui connaissent le sida et qui ont eu des rapports sexuels au cours des 12 derniers mois, pourcentage de ceux qui ont déjà utilisé le condom selon la raison de l'utilisation, pourcentage de ceux qui l'ont utilisé au cours des derniers rapports avec leur conjointe, pourcentage de ceux qui l'ont utilisé au cours des derniers rapports avec quelqu'un d'autre que leur conjointe et pourcentage de ceux qui l'ont utilisé au cours des derniers rapports quel que soit le partenaire, selon certaines caractéristiques socio-démographiques, EDSBF-II Burkina Faso 1998-99

Caractéristique	Pourcentage d'hommes qui ont déjà utilisé des condoms				Utilisation au cours des derniers rapports sexuels avec :							
	Comme contraceptif	Pour éviter MST/sida	Ensemble	Eff. <sup>1</sup>	Epouse(s)		Partenaire régulière		Quelqu'un d'autre		N'importe quel type de partenaire	
					%	Eff. <sup>2</sup>	%	Eff. <sup>3</sup>	%	Eff. <sup>4</sup>	%	Eff. <sup>1</sup>
<b>Groupe d'âges</b>												
15-19	52,5	54,4	55,8	143	*	10	56,4	69	32,0	65	42,0	143
20-24	59,9	62,0	63,3	234	3,7	66	69,2	88	58,1	80	46,8	234
25-29	53,2	55,1	58,0	298	14,3	176	75,1	67	61,3	55	36,7	298
30-39	36,2	34,8	39,2	474	9,5	430	*	23	*	21	14,0	474
40-49	18,9	17,4	21,5	379	4,4	368	*	8	*	4	5,6	379
50-59	13,2	10,5	14,3	221	2,4	217	*	1	*	3	3,2	221
<b>État matrimonial</b>												
Actuel. en union	26,3	25,7	29,6	1 305	7,2	1 255	55,3	26	*	24	9,4	1 305
En rupture d'union	61,5	61,5	65,9	27	*	6	*	7	*	13	37,8	27
Jamais en union	68,5	69,2	70,7	418	*	5	67,3	222	47,7	190	57,5	418
<b>Milieu de résidence</b>												
Urbain	71,6	69,1	74,2	398	14,5	210	83,3	121	82,0	66	46,7	398
Rural	26,7	27,1	29,9	1 351	5,7	1 056	49,0	134	38,5	161	13,9	1 351
<b>Région</b>												
Ville de Ouagadougou	79,8	75,8	82,0	209	21,3	101	80,7	74	84,9	34	52,8	209
Nord	30,9	34,9	36,3	244	6,6	182	*	19	49,1	42	17,9	244
Est	27,3	25,6	28,6	444	4,6	340	65,1	52	49,8	52	17,0	444
Ouest	29,4	28,9	33,2	459	5,0	358	54,8	57	41,3	44	14,7	459
Centre/Sud	37,6	38,4	40,7	394	8,1	286	58,4	53	41,0	55	19,5	394
<b>Niveau d'instruction</b>												
Aucun	26,1	26,8	29,4	1 309	5,5	1 035	50,7	130	37,5	143	13,5	1 309
Primaire	52,3	51,1	55,5	241	10,1	151	66,4	46	60,2	44	29,9	241
Secondaire ou plus	89,4	83,4	90,8	200	22,4	81	88,9	79	90,1	40	62,3	200
Ensemble des hommes <sup>5</sup>	36,9	36,6	40,0	1 749	7,1	1 267	65,3	255	51,2	227	21,3	1 749

<sup>1</sup> Effectif d'hommes qui connaissent le sida et qui ont eu des rapports sexuels au cours des 12 derniers mois.

<sup>2</sup> Effectif d'hommes qui connaissent le sida et qui ont eu des rapports sexuels au cours des 12 derniers mois avec leur(s) épouse(s).

<sup>3</sup> Effectif d'hommes qui connaissent le sida et dont les derniers rapports sexuels non conjugaux au cours des 12 derniers mois ont eu lieu avec une partenaire régulière.

<sup>4</sup> Effectif d'hommes qui connaissent le sida et dont les derniers rapports sexuels non conjugaux au cours des 12 derniers mois ont eu lieu avec une personne de rencontre ou quelqu'un payé ou quelqu'un d'autre (exclu l(es)épouses et partenaire régulière).


<sup>5</sup> Y compris les "non-déterminés"

\* Basé sur trop peu de cas

éviter les MST et le sida, contre seulement 26 % des hommes en union. Par ailleurs, les urbains (69 %, contre 27 % en milieu rural), ceux vivant dans la région de Ouagadougou (76 %, contre moins de 40 % dans les autres régions) et les hommes de niveau d'instruction secondaire ou plus (83 %) ont plus fréquemment utilisé le condom pour éviter les MST/sida.

Enfin, pour les derniers rapports sexuels ayant eu lieu dans les douze derniers mois, la proportion d'hommes ayant utilisé un condom, quel qu'en soit le but et quelle que soit la partenaire, est relativement faible (21 %). Ce niveau d'utilisation est plus élevé chez les hommes les plus jeunes, les non mariés, en particulier les célibataires (58 %), chez ceux vivant en milieu urbain et chez ceux de niveau d'instruction secondaire ou plus (62 %).

**Graphique 12.3**  
**Utilisation du condom à un moment quelconque**  
**comme contraceptif et/ou comme moyen de protection**  
**contre les MST/sida**



EDSBF-II 1998-99