

Mouton vendéen

Vendéen	
	
	
Mouton vendéen	
Espèce	Mouton (<i>Ovis aries</i>)
Région d'origine	
Région	Vendée, France
Caractéristiques	
Taille	Moyenne
Toison	Blanche
Peau	Grise
Prolificité	175 %
Autre	
Diffusion	Nationale
Utilisation	Viande
modifier ^[1] 	

Le **mouton Vendéen** est une très ancienne race de moutons. La population d'origine a été croisée à plusieurs reprises, au cours de son histoire, une première fois au XVII^e siècle lorsque les hollandais venus assécher les marais vendéens importèrent leurs moutons, et une seconde à la fin du XIX^e siècle avec des races bouchères anglaises. Ce mouton à la toison blanche et la peau grise est assez rustique et s'adapte à différents types d'élevage. Il est prolifique, et a surtout de très bonnes aptitudes bouchères, étant bien conformé et présentant une très bonne croissance. Les béliers vendéens sont d'ailleurs régulièrement utilisés en croisement terminal pour améliorer la conformation des agneaux de brebis rustiques. On compte aujourd'hui environ 250 000 brebis, principalement en Poitou-Charentes et dans les Pays de la Loire, mais aussi en Limousin et en région Centre.

Histoire

Les origines du mouton vendéen sont anciennes, et pourraient dater du Moyen Âge. Ainsi, la première mention connue à la race date du X^e siècle, dans le Bas-Poitou. Les moutons locaux ont ensuite été métissés avec des animaux venus dans un premier temps des Flandres au XVII^e siècle. Ces importations ont été réalisées lors de l'assèchement des marais vendéens par les hollandais, qui ont amené avec eux leurs moutons. Les animaux flamands étaient à l'époque réputés pour leurs aptitudes d'engraissement. Suite à l'exposition universelle de Paris de 1885, certaines races anglaises sont introduites en France comme le southdown. Cette deuxième vague d'importation d'animaux étrangers a beaucoup marquée le mouton vendéen, qui a abondamment été croisé avec le southdown. Ainsi, les moutons locaux voient leur croissance et leur conformation s'améliorer grandement, mais conservent tout

de même le grand format de la population d'origine, ainsi que leur bonne prolificité.

Le phénotype de la race est fixé au cours du XX^e siècle, et l'UPRA de la race est créée en 1974. Elle met rapidement en place une station d'élevage pour les mâles reproducteurs. Ses effectifs seraient d'environ 250 000 femelles mais en diminution.

Standard

1. *Tête* : front assez large, plat, bord du nez large, couleur grise sans taches. Yeux : gros, noirs. Oreilles demi-longues, obliques.
2. *Corps* : poitrine ample et profonde, dos bien allongé, large et uni jusqu'à la croupe.
3. *Gigot* : épais et descendu.
4. *Membres* : pattes fortes, droites, couleur grise comme la tête.
5. *Laine* : couleur blanche, toison étendue garnissant le front et l'arrière des joues, revêtant tout le corps et descendant sur les membres jusqu'aux genoux.
6. *Poids* : bélier de 85 à 110 kg, brebis de 60 à 70 kg.
7. *Taille* : moyenne



Mouton vendéen.

Aptitudes

Les brebis vendéennes sont prolifiques, avec en moyenne 1,75 agneaux par brebis et par an. Elle a ensuite une production laitière correcte, permettant d'assurer à ces agneaux une croissance de 220 à 230 g/j. Les agnelles vendéennes se caractérisent par leur précocité. La période de reproduction des brebis est assez longue, et permet une période de mise bas s'étalant d'octobre à juin.

Mais le mouton vendéen est avant tout une race réputée pour ses aptitudes bouchères. Les agneaux ont une bonne croissance entre 30 et 70 jours, d'environ 300 g/j. Ils sont bien conformés et donc bien valorisés. Les béliers sont régulièrement utilisés en croisement terminal sur des brebis rustiques pour améliorer la conformation de leurs agneaux.

Élevage

Le mouton vendéen est un animal rustique, qui peut s'adapter à différents types d'élevage, dans des systèmes extensifs basés sur la valorisation de terrains pauvres comme en systèmes intensifs avec valorisation de prairies riches de d'aliments concentrés en bâtiments. En Vendée, elle est traditionnellement élevée en plein air la majeure partie de l'année, étant rentrée en bergerie entre décembre et février pour agnelier, les agneaux étant engraisés en bergerie, ou en semi plein air, laissée au pâturage de mai à septembre. Les agneaux sont vendus à environ 38 à 40 kg vifs.

Sélection

Le schéma de sélection de la race est géré par l'UPRA Mouton Vendéen, qui travaille en collaboration avec l'INRA, chargée de calculer les index, et avec l'institut de l'élevage. Ce schéma est très complet. Il s'attache principalement à tenter d'améliorer les aptitudes bouchères des animaux comme leur conformation, leur croissance ou leur état d'engraissement et cela sans dégrader les qualités maternelles de la race. La race s'adapte aussi bien aux conditions de semi plein air que de bergerie. En effet, parmi la base de sélection qui comprend 60 élevages et 11 000 soumises au contrôle de performances brebis sur 17 départements différents, on sélectionne chaque année 200 jeunes béliers sur leur ascendance. On mesure ensuite précisément les performances de ces animaux, tant au niveau de leur

croissance que de leur morphologie ou leur proportion de muscle. Les 10 béliers qui affichent les meilleurs performances sont ensuite testés sur leur descendance, ce qui va permettre de mieux connaître leur valeur génétique, y compris sur des caractères non mesurables directement sur eux. Cela consiste à réaliser un certain nombre d'inséminations artificielles sur ces animaux, de façon à obtenir 25 filles pour chacun. Les performances de ces brebis sont ensuite mesurées, tant au niveau de leur croissance et leur morphologie que de leurs qualités maternelles. Ces performances permettent d'évaluer celles de leur père, qui sont connues ensuite avec une bonne précision. Ils peuvent ensuite être classés béliers améliorateurs pour les meilleurs. Quatre qualifications sont disponibles pour ces béliers : AMBO pour les béliers améliorateurs sur les aptitudes bouchères, AMVL pour les animaux améliorateurs vis-à-vis des aptitudes bouchères, AMPR pour les béliers permettant d'améliorer la prolificité et AMCR pour ceux qui permettent de travailler sur la croissance des animaux.

Diffusion

Les environ 250 000 que compte le pays sont principalement réparties dans les régions Pays de la Loire et Poitou-Charentes, non loin de son berceau en Vendée. Toutefois, la race est également présente dans les autres grandes régions herbagères productrices de moutons, comme le Limousin ou le Centre. La race a une influence bien plus large en fait, liée à l'utilisation des béliers vendéens en croisement terminal un peu partout dans le pays. C'est également une race qui s'exporte plutôt bien à l'étranger depuis quelques années, et on rencontre des animaux vendéens en Grande-Bretagne, en Italie, en Espagne, en Irlande du Nord, en Belgique et même jusqu'en Indonésie.

Notes et références

- [1] http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mouton_vend%C3%A9en&action=edit§ion=0

Sources et contributeurs de l'article

Mouton vendéen *Source*: <https://fr.wikipedia.org/w/index.php?oldid=96462237> *Contributeurs*: Ben23, Ediacara, Eponimm, LPLT, Leag, Lomita, MIRROR, Onial Khan, PANDA 81, Quentinv57, Reggissiera, Romelerfels, Rosier, Sebjarod, Sebleouf, Totodu74, Vlaam, 4 modifications anonymes

Source des images, licences et contributeurs

Fichier:Ombremouton.png *Source*: <https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Ombremouton.png> *Licence*: GNU Free Documentation License *Contributeurs*: Meuble_mouton.svg: Henrysalome derivative work: Ben23 (talk)

Fichier:Mouton vendéen02 SDA2011.JPG *Source*: https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Mouton_vendeen02_SDA2011.JPG *Licence*: Creative Commons Attribution 3.0 *Contributeurs*: Eponimm

Fichier:Flag of France.svg *Source*: https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Flag_of_France.svg *Licence*: Public Domain *Contributeurs*: Aaker, Adriaan, Akhristov, Arria Belli, Badseed, Bawolff, Bender235, Bibi Saint-Pol, Brian Ammon, Camptown, Chelin, Dbenbenn, Don-vip, Ericbarriere, Fspolonezcaro, Happenstance, Herbythyme, Homo lupus, Howcome, Huhsunqu, Jameswoodward, Jnpet, Kanonkas, Klemen Kocjancic, Korrigan, Kyle the hacker, Ludger1961, Madden, Mare Mongenet, Morio, Neq00, Nightstallion, Noaa, Nolanus, Odder, R-41, Reisio, Rhadamante, Rocket000, Roosa, SKopp, Sarang, Sasa Stefanovic, Scientus, SiBr4, Simetrical, Str4nd, Tabasco, The Evil IP address, VAIO HK, Verdy p, VovanA, Wwooter, Zhuyifei1999, Zntrip, ZooFari, Zscout370, 66 modifications anonymes

Image:Gtk-dialog-info.svg *Source*: <https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Gtk-dialog-info.svg> *Licence*: GNU Lesser General Public License *Contributeurs*: David Vignoni

Fichier:Mouton vendéen01 SDA2011.JPG *Source*: https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Mouton_vendeen01_SDA2011.JPG *Licence*: Creative Commons Attribution 3.0 *Contributeurs*: Eponimm

Licence

Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0
[//creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)